



This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + *Refrain from automated querying* Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <http://books.google.com/>

Cei
M58




CATALOGVS
PLANTARVM
HORTI CAESAREI FLORENTINI.

Q. 10

Q. 11



CL. PETRI ANTONII MICHELII
CATALOGVS PLANTARVM
HORTI CAESAREI FLORENTINI
OPVS POSTVMVM
IVSSV SOCIETATIS BOTANICAE
EDITVM, CONTINVTVM,
ET IPSIVS HORTI HISTORIA LOCVPLETATVM
AB IO. TARGIONIO TOZZETTIO FLOR. MED. D.
REI HERBARIAE PROF. PVB.
BIBLIOTHECAE PVB. MAGLIABECHIANAE PRAEFECTO,
ET S. R. I. ACADEMIAE NATVRAE CVRIOSORVM
COLLEGA.



FLORENTIAE. A. M.D.CC.XLVIII.
EX TYPOGRAPHIA BERNARDI PAPERINII.

CVM ADPROBATIONE.



CE
m58

IMPERATORI CAESARI FRANCISCO

PIO, FELICI, AVGVSTO,
PRINCIPI OPTIMO INVICTISSIMOQVE,
PATRI PATRIAE,
ADSSERTORI VIGILANTISSIMO QUIETIS
ET SECVRITATIS PVBLICAE,
GERMANIAE, ET HIEROSOLYMORVM REGI,
LOTHARINGIAE, BARRII, ET MAGNO
ETRVRIAE DVCI
cc. cc. cc.

IO. TARGIONIVS TOZZETTIVS
NVMINI MAIESTATIQUE EIVS DEVOTISSIMVS
PERENNEM INCOLVMITATEM.



*IU multumque exoptaveram
devotissimae subiectionis meae testimonium aliquod,
& gratissimi simul animi, ac fidelissimi servitii
speci-*

specimen ad Pulvinar Tuum deferre, CAESAR AUGUSTISSIME; sed ingenii mei tenuitatis conscius, non ausus sum rudibus meis lucubratiunculis Tua Tempora morari, & in publica commoda peccare. Voti tandem compotem factum me gratulor, quando a Societate Botanica iussus sum ad editionem parare, & CAESARAE MAIESTATI TUAE humillima veneratione offerre Catalogum Plantarum quibus modo confitus est vetustissimus, elegantissimusque Tuus Hortus Florentinus. Non indignum siquidem MAIESTATE TUA munusculum istud Societati visum est, eo potissimum quod Tuis Auspiciis, Tuaque Munificentia in lucem prodeat; quod Horti Tui decora exponat; quod plures Plantarum novas species Eruditae exhibeat; quod tandem Celeberrimi Michellii praecipua opera comparatum sit, qui Botanicis studiis incredibili diuturnoque labore excultis ita inclaruit, ut nemini secundus, plurimis ingenii laude, & inventorum gloria longe praestet.

*Haec igitur fiduciam mihi inspirarunt, ut provolutus ad Sacros Pedes Tuos, POTENTISSIME IMPERATOR, auderem venerabundus offerre exilia
etiam*

etiam studiorum meorum specimina Micheliano Operi adsuta, quae si Clementissima, Solitaque Tua Aequanimitate excipere non dedignaberis, CAESAR AUGUSTISSIME, quemadmodum humillima, qua par est, veneratione rogo, atque supplico, praecipuum laboris mei fructum consequutum me fuisse laetabor. Addidit illud etiam mihi audendi animum, quod innumeras inter sublimesque Animi Tui Dotes, summus ut in reliquas omnes Optimas Disciplinas, ita in iucundissimam quoque, & praestantissimam Rerum Naturalium Scientiam Amor excellat. Omnis profecto aetas, quae quidem Litteras amabit, meritis laudum praeconiis efferet. Comitatem illam Tuam Incomparabilem, qua summos quoslibet in Physicis studiis Viros excepisti, Diligentiam qua Philosophicis consessibus interesse voluisti, Jucunditatem qua Hortos Medicos, Musaea, & Bibliothecas visitasti in memorando illo Itinere per florentissimas Europae Provincias peracto, ut quaecumque ad Optimum Principem formandum prodesse possent observares. Profecto non sine voluptate mecum recolo quae Vir summus, & Fautor meus Hermannus Boërhaavius

ad

ad me perscripsit in Epistola d. ad d. 3. Kal. Aprilis A. 1738. qua mecum gratulatus est Etruriae sortem, cui Rex & Pater Divino Munere paulo pridem obtigeras; postquam enim Laudes Tuas iussissimo praeconio extulit: florebunt, ait, apud vos Rerum Naturalium cultus & studia, sub Principe cui a Natura, cultura, & affectu omnes Dotes insitae, quae Musageten perficiunt; subditque, coram stupefactus admirabar, quando SERENISSIMUS HEROS Domi meae ultra bihorium impendit spectandis & sapientissime considerandis Rebus Naturalibus. Verum quid externis testimoniis indigemus, quum Etruria nostra universa abunde experta sit, & satis depraedicare non valeat Paternum Tuum Animum in Optimas quasque Disciplinas, & praecipue erga Naturalem Historiam? Societas quidem Botanica erit Augustae Tuae Clementiae monumentum aere perennius, quod illam Gratosissimo Patrocinio nobilitaveris, & Munificentia fulseris; quodque illi Horti Tui Florentini curam commiseris, & praecellarum munus demandaveris conscribendae Historiae Naturalis Etruriae, unde maior semper (quod
unice

unice optamus) Sacratissimo Tuò Nomini Claritas & Celebritas, Etruriae splendor & fama, Populis tandem Tuis certum commodum atque emolumentum proficiscatur.

Quae quum ita sint, accipies spero, CAESAR POTENTISSIME, Sereno Vultu librum hunc, tamquam specimen sedulitatis Societatis Botanicae in Jussis Tuis implendis, ut ipsamet Societas Augusta Approbatione recreata alacrius in Horti sibi commissi curam & splendorem incumbat, brevique illum ceteris vel celebratissimis Hortis Medicis aequiparandum reddat.

Utinam vero Clementissima Aequanimitate excipere non graveris, INVICTISSIME IMPERATOR, studiorum quoque meorum exbiles has primitias, quas venerabundus Tibi offerro! Utinam non iniucunda Tibi accadat Dissertatiuncula, qua non sine labore Horti Tui Historiam Litterariam ab oblivione Hominum, atque ab interitu vindicavi! Atque utinam in Appendice ad Catalogum Michelianum probare digneris diligentiam meam in Rei Herbariae studiis pro iniuncto Publicae Professionis munere excolendis, & curam impensam in eodem Horto Caesareo cu-



studien-

studiendo ac locupletando, vel institutis tribus laboriosis excursionibus, tum ut Plantas rariores in ipsum Hortum deferrem, tum etiam ut Naturalem Etruriae Historiam melius addiscerem, & illustrare aliquando possem!

Si haec pro voto successerint, acriores mihi stimulos ad laudem & gloriam addi sentiam, & quum dedicata iam Tuo Iussu, Tuisque Auspiciis Bibliotheca Magliabechiana, cuius Praefecturam mihi benignissime commiseras, liberatus sim gravi labore quem per novennium impendi in digerenda, & ad publicos usus paranda ipsamet Bibliotheca, nil mihi erit antiquius, quam ut otia, quae mihi, CAESAR MUNIFICENTISSIME, fecisti, ponam omnia in studiis, & lucubrationibus. Conatibus itaque meis Benignus adspires, quemadmodum suppliciter & humillime rogo, ut Te Auctore, Te Auspice reliqua maiorisque momenti Micheliana Opera postuma, tandiu Eruditorum votis expetita, edere possim, & nonnullas meas commentationes de Etruriae Naturali Historia in ordinem redigere, inque Tui Populi utilitatem exhibere aliquando valeam.

Quod

*Quod superest, DEUM OPTIMUM MAXIMUM
ardentissimis precibus oro, ac per totius Christiani
Orbis salutem & tranquillitatem obtestor, ut
SACRAM CAESAREAM MAIESTATEM TUAM simul
cum AUGUSTISSIMA CONIUGE, & REGIA SOBOLE
salvam conservet & incolumem, omnique prosperi-
tatis genere in dies magis ac magis cumulet.*


Florentiae Cal. Sextilibus A. MDCCXLVIII.



Handwritten text on the left margin, possibly a page number or date.

Handwritten text in the upper middle section, appearing as a list or series of notes.

Handwritten text at the bottom right corner, possibly a signature or date.



IOANNIS TARGIONII TOZZETTII P R A E F A T I O

QUA CAESAREI HORTI MEDICI FLORENTINI
HISTORIAM COMPLECTITUR.



EL Herbariae studium in Urbe nostra, Bonarum quarumcumque Artium Matre vel Altrice, Fautores & Amplificatores eximios semper invenit. Facem ei praetulere *Angelus Politianus* ⁽¹⁾, & *Marcellus Virgilius* ⁽²⁾, exornarunt, ut de ceteris taceam, *Petrus Franciscus Paulius*, *Leonardus Iachinus*, *Iacobus Minius*, & *Athanasius Galenicæ Medicorum*

(1) V. Elegantissimam eius Sylvam quam *Rusticus* inscripsit in Hesiodi Virgilique Georgicorum enarratione pronunciatam, in qua magnam Agricolationis universae peritiam ostendit. Vide sis praeterea quae de Cisso, Cistoque Pliniana erudite

solideque cum Nicolao Leonicensio disputavit, & ea quae de Gnaphalio, Gallicaque Nardo ad Pandulphum Collentium conscripsit Lib. 2. & 7. suarum Epistolarum.

(2) Tournesfort *Isag. in Rem Herb. pag. 23.*

corum Sectae propugnatores acerrimi (3); at stabilem sedem, & domicilium certum delegit *Cosmus Medices Magnus Dux Etruriae Primus*. Hic enim inter ipsa Imperii primordia, difficillimisque temporibus, Pisanam Academiam instaurare aggressus (4), Rei Herbariae Cathedram in ea constituit, & Veneti Amplissimi Senatus exemplum sequutus (5), Publicum Hortum fundavit in quo sparsae per varia Terrarum loca, diffusaeque Stirpium species transferrentur, & colerentur, fieretque veluti quaedam universalis Plantarum epitome, atque conspectus. In ipso ornando construendoque usus est consilio *Lucae Ghinii* Forocorneliensis (6), quem idcirco A. MDXLIV. (7) in Pisanam, perhonorifice, amploque stipendio invitavit, e Bononiensi Academia, in qua iam inde ab A. MDXXVII. Botanici praestantissimi famam sibi comparaverat.

Paucis tamen post Annis probe perspexit *Cosmus* ex unico Pisano Horto Scholasticos eam, quam secum animo proposuerat, utilitatem capere nequaquam posse. Pisani siquidem Caeli & Soli genius Plantis Alpini, Frigidarumque Regionum propriis non faver; praeterea Anni Scholastici ratio paucarum tantummodo Plantarum integram observationem Studiosis concedit, illarum scilicet, quae Verno tempore florent; at reliquarum omnium invidet Aestate, & Autumno ad maturitatem pervenientium. Eapropter, oprimo sane consilio, magnoque discentium bono, alium Publicum Hortum Medicum Florentiae in Urbe Principe funda-

(3) V. Anonymi Dialogum qui *Barbaromastix* sive *Medicus* inscribitur, impressusque est primo loco inter Nova Florentinae Academiae Opuscula adversus Avicennam & Medicos Neotericos, qui Galeni disciplina neglecta Barbaros colunt.
(4) Gio. Bat. Adriani Ist. de' suoi tempi L. 3. pag. 183. ed. Ven. 1587.
(5) Thomasinus de Gymn. Patav. 34. & Papadopolus Hist. Gymn. Patav. T. 1. 13.

(6) Pet. Andr. Matthiolus Praef. in Dioscoridem suum Edit. Valgriff. in F. 1185.

(7) A. 1544. Ghino in Bononiensi Cathedra susceptus fuit, & praelectiones suas publicas auspiciatus est Caesar Odonus, quemadmodum per Litteras certiore me fecit Cl. idemque Humanif. Joseph Montius tantorum Virorum successor.

fundavit, elegantia paucis comparandum, in quo tamquam Naturae Vegetantis compendio, Regiis sumptibus colerentur Plantae variarum Regionum propriae, & quarum frequentior usus est apud Medicos. Ita Patriae suae ornamenta auxit, & Horti Pisani inopiam abunde supplevit. Medicinae siquidem Candidati per Férias Academicas in celeberrimo Florentino D. Mariae Novae Valetudinario Clinicae sedulam operam navantes, & Chirurghi, ac Pharmacopoei saluberrimarum Artium tyrocinia deponentes, per ocium, opportuno tempore, & magno laboris compendio Fruticum Herbarumque formas, variationes, & facultates in Horto Florentino addiscere possent, & deinde in publicam utilitatem illas usurpare.

Quonam Anno facinus id exorsus sit, nondum compertum habeo: illud solummodo certum est Hortum Florentinum absolutum fuisse ante Annum MDLVII. quo Senensium Rerum potitus est *Cosmus*, & *Florentiae ac Senarum Dux* appellari coepit. In Epigraphe siquidem in supero limine maioris Horti Portae, *Cosmus Medices Florentiae Dux II.* tantummodo nuncupatur.

In Horto Florentino extruendo, ornandoque *Cosmus*, quemadmodum & in Pisano fecerat, usus est consilio *Lucae Ghinii* (8) superius memorati, nullisque sumptibus pepercit, ut elegantioribus Etruriae Viridariis Hortus hic accenseri posset, quae tamen Viridarium per diversas Europae partes tunc temporis usitatorum elegantissima erant (9).

Architecton quisquis (10) Horti ornatui praefuit, sollers certe fuit: Topiariis enim Porticibus, Sylvisque inaequalitatem Areae laterum occultavit; Aream ipsam

(8) Leopoldo del Migliore Firenze Illustrata pag. 238.

(9) Bellonius de neglecta cultura stirpium Probl. 20. 21. & 22.

(10) Num fuit Nicolaus Tribolo nuncupatus, quo Cosmus in ornando Viri-

dario Regiae Villae Castellì usus est V. Vasari in eius Vita & Baldinucci Decen. 1. della P. 2. del sec. 4. num vero Bernardus Bontalentius, qui paulo post Regium Boboleum Viridarium instruxit? V. Baldinuc. in eius Vita:

ipsam in spatia, ac pulvillos daedaleos variis ambula-
cris distinxit; Colossaeis *Aesculapii*, & *Dioscoridis* mar-
moreis, ac porphyreticis Protomis decoravit; Hydro-
phylacium satis amplum, Insulamque in centro amoe-
nissimam fecit, quam Fonte, variisque Avium e rostro
aquam iaculantium marmoreis statuis ornavit, ab *Antonio*
Gini Laurentii Septimianensi ⁽¹¹⁾ affabre sculptis. Ut
aqua Plantis irrigandis opportuna, largaque copia ades-
set, *Cosmus* Mynionem fluvium ⁽¹²⁾, Lanariorum com-
moditati respiciens, intra Florentiam derivaturus, per
Hortum deduci curavit, idem quoque facturus de
Fonte uberrimo, quem e Fesulanis Collibus Floren-
tiam perducere aggressus est ⁽¹³⁾.

Nec exiguum Horto huic decus accedit, quod
haud obscuris indiciis coniecere licet ipsum constru-
ctum fuisse super aliqua parte soli, in quo immorta-
lis

(11) Giorgio Vasari Vite de' Pittori P.
3. 289.

(12) Inter Sanleolinii Actiones Cosmia-
nas pag. 53. recensetur Mynio Fluvius
intra Florentiam occultis canalibus de-
ductus. F. Agostino del Riccio Trattato
d'Agricoltura Ms. T. 1. 33. ait: Il Gran-
duca Cosimo volendo condurre una gran
copia d'Acque alla Città di Firenze, fece
fare una gran Pescaia sopra il Ponte alla
Badia in Mugnone, & in far questa Pe-
scia si tenne quest' ordine, che si tagliò
il Fiume a tagliaporro, e così si entra-
ne canti de dua Campi più braccia, &
fassi un Muro a traverso, e poi sopra detto
Muro profondo più che non è il letto del
Fiume, vi si fa una volta forte, che ad
ogni due braccia abbia una buca a uso di
coda di Rondine, come sono le feritoie
che si fanno agli Archibusi, ed Artiglie-
rie ne' Muri, che in verso i Muri sono
strette, e in bocca son più larghe. Così
son queste buche, che si fanno nel fondo
della volta, acciocchè l'Acque possin pas-
sare purgate, e entrare in quella Volta,
e di quella Volta poi si mandano al Con-
dotto. = Così facevano gli Antichi Ro-
mani, e così ordinò il suo Condotto il
Granduca Cosimo, con una Volta tanto al-

ta, che vi va un' Uomo, & ha due mu-
riccioli dove possono andare su su per il
Condotto due Uomini ritti, e per il mezz-
zo poi vi ha fatto murare le docce aperte,
che conducono per il Condotto un mezzo
braccio d'Acqua. Et pag. 25. de Horto
nostro ait: Quel che poi gli dà grand' or-
namento è che è abbondante d'Acque, che
vengono dal fiume Mugnone; ma molto più
sarà quando il Condotto sarà fornito, e
l'Acque Cristalline che verranno del fiu-
me sopraddetto Mugnone, che comincerà a
farlo venire la felice memoria del Gran-
duca Cosimo, e poi fu seguitato dal suo
Figliuolo il Granduca Ferdinando. Ma è
stato gran danno a i poveri Giardini di
Firenze, che detto Condotto non sia forn-
ito, poichè è sì appo la Città fatto, cioè a
tre Visti. Io sono stato dentro a detto Con-
dotto con molto mio piacere, poichè è sta-
to fatto con tanta grandezza e magnifi-
cenza, non perdendo a spesa, eccetto,
che molte braccia appresso a tre Visti, che
fanno certi che guastano quel bell' ordine
delle volte teneva Messer Jacopo Biondi
Fiorentino, ec.

(13) Baccio Baldini Vita del Granduca
Cosimo I. pag. 70.

lis *Nicolaus Uzzanius* ⁽¹⁴⁾ de Patria sua Florentia egregie meritis amplissimum Lycaeam construi supremis Tabulis iusserat ⁽¹⁵⁾.

Quamvis Hortus Florentinus quartum inter Hortos Medicos locum antiquitatis ordine sibi iure merito vindicet, post Patavinum nempe, Bononiense, & Pisianum; Nullam tamen de ipso mentionem invenies apud Scriptores Historiae Hortorum Medicorum. Contigit id fortasse quia Hortus noster alicui Lycaeum additus non fuit; Demonstratorem Botanicum assidue non habuit; eius Catalogum nemo edidit; vel tandem quia *Medicorum* Principum deliciis tantummodo inservire creditus est. Scriptoribus quidem externis succensere iniquum esset, si illum non norunt; at Nostrates, & ii praesertim plurimi, qui *Cosmi I.* gesta litteris consignarunt, culpa non vacant, quod inter praeclaras illius actiones Horti Florentini foundationem non recensuerint, quae tamen, si tempora respicias, Regium plane, & summa laude dignum facinus extitit. Fortasse Scriptores hi omnes ex illorum Censuram genere fuere, quos reprehendit *Augustinus Riccius* ⁽¹⁶⁾, qui per ea tempora floruit, & diserte foundationis huius gloriam *Cosmo* tribuit ⁽¹⁷⁾.

†

Parum

(14) Ab Uzzano Vallis Pefanae Pago nomen Patriciae huius Familiae deductum est.

(15) In Codice inscripto: *Stratto dal Libro de' Testamenti, e dal Quaderno de' Ragionieri fatto nel 1495. e da altri Libri dell'Arte de' Mercatanti detto di Calimala*, qui Ms. adservatur in Bibl. Pub. Magliabechiana, Pag. 18. sub die 17. Sept. A. 1430. legitur: *Niccolò di Giovanni de' Cattani da Uzzano per Testamento lasciò una Casa nominata la Sapienza accanto a' Servi; alla quale per finir la una entrata di Fiorini 1505. per anno in credito di Crediti di Monte del Comune di Firenze, per spedare i poveri Scolari; della qual Sapienza volse la cura esser commessa all'Arte e Università di Calimala, e che si facessero quattro Provveditori del Collegio di detta Arte, e che duri l'Officio loro a Vita.* De Hereditatis huius fato vide sis Leop. del Migliore Firenze Illu-

strata pag. 103. & Vasari Vita di Lorenzo di Bicci, & Vita di Filippo Brunelleschi, & Segni Istoria Fiorentina lib. 6.

(16) Trattato d'Agricoltura Ms. T. 1. 26. *E grand' errore di certi, che ragionano qualche volta, che questo Giardino delle Stalle non vende utilità, e che bisognerebbe mettervi Pianta da Ortolani: Questi tali non mostrano aver caro che il Padrone di questo Giardino, e d' altri Giardini, abbia lode, & onore nella Città e fuori; poichè detto Giardino è nominato, e quel di Pisa per tutto il Mondo, si di bellezza, si di abbondanza di Pianta &c.*

(17) Ibid. T. 2. 330. & 332. In particolare una specie di Ciliegie non guari di tempo che furono portate da Messer Giuseppe Bene in casa Fiammingo nel Semplicista delle Stalle Ducali, il qual fu fatto dal Granduca Cosimo, e poi abbellito da' suoi Figliuoli &c.

Parum autem erat constructioni & ornatui consue-
luisse, nisi cultui quoque & usui prospectum fuisset.
Eapropter *Cosmus* annuam dotem Horto largitus est;
rarissimas Plantas *Ghini* ductu e longinquis regionibus in
ipsum transferri curavit, ac expertis Viris stipendium
constituit, ut Studiosis Plantarum formas facultatesque
indicarent (18).

Quinam fuerint primi in Horto nostro Plantarum
Demonstratores, latet; sed quum nullum reperire con-
tingerit ad Annum usque MDLVII. quo nempe e vivis
excessit *Lucas Ghinus*, coniecere licet ipsum duplici Rei
Herbariae Professoris munere functum esse, Pisis scili-
cet, & Florentiae, adeunt Herbarium curriculum Pisis
incohatum in Florentino Horto per Férias Academicas
absolvere consueverit: scimus enim ipsum tunc tem-
poris Florentiae in Aula plerumque commorari soli-
tum fuisse (19).

Ghina e vivis sublato, unum tantummodo Horti Flo-
rentini Praefectum Regnante *Cosmo I.* detexi; *Aloysium*
nempe *Leonium* Bellunensem, *Ghini* fortasse discipulum.
Quandiu tali munere perfunctus ille sit, non liquet:
solummodo ab A. MDLVII. ad MDLXIII. eius nomen
in Albis Familiarium Magni Ducis legitur, adscripto
titulo, *Simplicistae*, seu *Simpliciarum Generalis* (20). Reti-
cendum non est in Albis quibusdam *Simplicistam Gene-
ralem Studii Pisani* appellari *Leonium*, quamvis dubio
procul non Horti Academici Pisani, sed huius Floren-
tini, & omnium fortasse Regionum Viridariorum cura
commissa ipsi fuerit. Certe inter Academiae Pisanae
Botanicos nullatenus a *Vigna* (21) recensetur, & an-
num

(18) Migliore, Firenze Illustrata pag. 239.

(19) V. Epistolam Io. Hessi ad Matthio-
lum editam in Lib. 3. Epistolarum Me-
dicinalium Petri Andr. Matthioli, Lugd.
1564. pag. 324.

(20) Estratto de' Ruoli de' Salariati del
Granduca Cosimo I.

1559. Messer Luigi Lioni da Belluno
Simplicista Generale Studi 200. l'anno.

1557 e 1559. Messer Luigi Lioni Ge-
nerale *Simplicista della Studia di Pisa &c.*

1563. Messer Luigi Lioni *Simplicista
Studi 16. il Mese.*

(21) Praef. in Animadversiones in Theophr.

num stipendium satis amplum, non ex Aerario quod Pisana Academia peculiare habet⁽²²⁾, sed ex Aerario Publico Florentino⁽²³⁾ ipsi persolvebatur. Quamvis nullam de *Leonio* mentionem factam invenerim apud Scriptores Botánicos; instar tamen omnium esse poterit luculentum quod de illo praebeuit testimonium ipse Magnus *Cosmus*: *Vincentio* siquidem *Fidelio* Reip. Venetae a Secretis, & apud se Ablegati munere fungenti, *Leonii* Herbariam peritiam splendido extulit elogio, subdiditque se illum in Indiam mittere constituisse ad perquirendas deportandasque Plantas, periculum facturus ipse, an Indicae Plantae aequales cum Italicis vires ad depellendos morbos fortitae essent⁽²⁴⁾.

Ab A. MDLXIII. ad dimidium & quod excedit *Francisci I.* Regnum, qui nam Horto nostro praefuerit, non liquet. *Franciscus* sane Patris exemplis insistent, peculiari erga Rem Herbariam amore flagravit, adeo ut Botanicum in Aula sua habuerit *Franciscum Mazzerangbium* Bargaenum, qui Plantarum conquirendarum gratia plura itinera suscepit, in quibus, praeter cetera, *Iaspidis Bargaei* celebratissimi Metalla detexit⁽²⁵⁾. Italicis tamen Plantis non contentus Magnus Dux, nullis impensis pepercit, ut ex omnibus fere

† 2

Terrae

(22) Vulgo Decime Ecclesiastiche.

(23) Vulgo Monte Comune.

(24) In Codice inscripto: *Relazione di Messer Vincenzio Fidele Segretario della Signoria di Venezia ritornato dal Duca di Firenze (nel 1561)* Ms. in Biblioth. P. Magliabechiana, sic de Cosmo Magno Duce legitur. *Or chi dirà delle Erbe, & de i Semplici ne have Egli una grandissima cognizione, e ne ha i Giardini pieni, facendone Egli tenere una particolar cura, con grandissima sua dilettazone in farli piantare, governare, & sperimentare, avendo appreso di se Huomini eccellentissimi di questa Professione, e tra gli altri uno di Ciudad suddito della Serenità Vostra, che in ragionare di queste cose me l'ha molto lodato, dicendo che per*

la grande Scienza sua lo voleva mandare nelle Indie, per riportare de i Semplici da quelle parti, per farne prova se sono dell'istessa virtù, e se ve ne sono altre sorti di maggiori che non sono nelle nostre bande, & in quelle di Levante.

(25) F. Agostino del Riccio Trattato delle Pietre Ms. Cap. 101. de Diaspri, inter caetera ait: *Diaspri di Barga son di color rosso buio, così vi si vede vene rosse accese con pezzi di Calcedonii bianchi, che gli danno gran bellezza. Si trovano pezzi grandi, come quelli che faceva condurre il Granduca Francesco in Firenze: pigliano gran lustro, e sono sodissimi. Detti Diaspri gli trovò Maestro Francesco Mazzeranghi da Barga Semplicista del Granduca Francesco.*

Terrae partibus stirpes vel florum elegantia, vel fructuum suavitatem, vel medicis facultatibus praestantissimas obtineret. Immensis propterea, & undique conquisitis Naturae muneribus non tantum elegantissima Viridaria sua mirifice illustravit, sed Floram, & Pomonam Etruscam splendida accessione primus locupletavit (26). Hortum quidem Medicum habuit cultissimum a latere septentrionali Regii Palatii, seu verius Musaei (27) quod ad D. Marci est, cuius curam *Dominico Boschia* Hortulano expertissimo commisit; nec diu post Hortum hunc, aliumque e latere eiusdem Palatii Meridionali, rarioribus Plantis ornandum commendavit *Iosepho Casabonae* Belgae Botanico eximio. Non tamen propterea Hortum Medicum cuius Historiam atteximus derelictui habuit, & sordere passus est; quinimmo annuam Dotem ei dixit ex Aesario Aedilium Florentinorum (28); *Casabanam* superius laudatum ipsi praefecit (29), & pristino splendori restituere eum meditabatur, nisi haec & alia tanti Principis incoepta, mors invida abruptisset.

Fra-

(26) Idem Trattato d'Agricoltura Ms. T. 2. 349. Messer Giuseppe Benincasa Fiammingo, il quale si pote dir con verità che è stato il Padre delle belle & utili Pianta, di di be' Fiori come di Pianta di Semplici, che egli ha fatti venire, e gli ha condotti per tutte le parti del Mondo dove ha potuto arrivare con gran favore del Granduca Francesco di felice memoria, il quale si dilettava de' Giardini e de' Semplici, come bene si può vedere in tutti i suoi Orti e Giardini Ducali, che ne sono ripieni. Et T. 2. pag. 40. Gelsomini pellegriani (lalapa) che venivano in Firenze al tempo che era vivo il Granduca Francesco; posciachè ognuno faceva a gara a portarli Pianta rare di Fiori e Frutti, sapendo che gli facevano cosa grata. Indi è che tanto Pianta gli furono donate; altresì Egli molte ne faceva venire d'altre Provincie, a tal ch'è ne abbiamo oggidì tutti noi partecipi, e ripieni i nostri Giardini di Firenze e di Campagna. Et T. 1. 123. Le prime Pianta d'Aranci della China che venissero in Firenze, furono presentate al Granduca Francesco, il quale si vedeva

essere molto diligente in far condurre assai Pianta nella Città. Tandem T. 2. 237. Castagna Cavallina: è per tempo che è stata portata la sua Pianta in Toscana. La prima Pianta fu presentata al Granduca Francesco, & egli la mandò alla sua sontuosa & spaziosa Villa di Pratolino — Questa Pianta venne da Pera, & ha fatto frutto — Poi vedeva una che sta nel Giardino delle Stalle Ducali appa in fine, fra inginocchiata, dove il Granduca Ferdinando sta per suo diletto a veder giocare, e maneggiare i suoi bei Cavalli.

(27) Raff. Borghini nel Riposo pag. 479.

(28) Rescritto di S. A. S. de' 7. Settembre 1587. Che la spesa del mantenimento del Giardino de' Semplici si aspetti all'Ufficio della Parte.

(29) F. Agost. del Riccio Tratt. d'Agricoltura Ms. T. 1. pag. 74. ait. Il Sig. Niccolò Gaddi favorì messer Giuseppe Benincasa Fiammingo appo il Granduca Francesco, & egli li fece avere il Giardino che è al Casino: non guari molto che egli ebbe il Giardino che è sulla Piazza di San Marco. Così lo pose & lo custodì molto bene.

Fraternos usus promovit *Ferdinandus I. Magnus* Dux elegantiarum quarumcumque Fautor. Eximius, & *Casabonae* Opera Horti sui cultum famamque mirifice amplificavit.

Quoniam vero Optimum *Casabonam* memoravi, cuius obscura sit mentio apud Scriptores Historiae Botanicae, facturum me operae pretium esse putavi, si in medium afferrem quaecumque reperire haecenus contigit ad eius vitam Doctrinamque spectantia, ut appareat quantopere Eximio huic Viro debeat non Hortus hic tantum, sed & Res Herbaria universa.

Ioseph igitur *Casabona*, vulgo *Benincasa* (30), natione Belga, cui nam Rei Herbariae notitiam debeat, & qua nam de causa Florentiam appulerit non liquet. Illud solummodo compertum est, usum primo cum fuisse familiaritate & hospitio *Nicolai Gaddi* (31) Patricii Florentini D. Iacobi Equitis, qui Genoris Nobilitati intimam pulcherrimarum Disciplinarum cognitionem coniunxerat, quique praecipua elegantissimae Domus suae ornamenta esse voluerat instrumenta ad adipiscendam sapientiam (32). Propterea domesticum Hortum rarissimis & elegantissimis Plantis ornare aggressus (33), nul-

lis

(30) Sic eum ubique vocat August. del Riccio saepius laudatus; at *Casabonam* Hieronymus Summarium in Schedis, & Catalogi Familiarium Francisci, & Ferdinandi Magnorum Ducum.

(31) F. Agostino del Riccio Tratt. d'Agric. Ms. T. 1. 74. Non è da tacere che il detto Sig. Cav. Niccolò Gaddi fu un Uomo diligentissimo, & amatore de' Virtuosi; posciachè egli fu quasi il primo che dessi principio a' Semplici; poichè teneva appo se il Virtuoso Messer Giuseppe Benincasa Fiammingo, che aveva cura di tutte le Pianta nobili, & de' Semplici.

(32) V. Iac. Gaddi Elog. XXIX. & Corol. Poet. 34. Baldinucci Vita di Dom. Passignano pag. 141. Negri Ist. degli Scrittori Fior. pag. 423. F. Agost. del Riccio Istoria delle Pietre Ms. cap. 11. Di questa Pietra (Occhiato d'Antiochia) particolarmente ne ho veduta nel bellissimo Tavolino, che ha lasciato il Sig. Cav.

Niccolò Gaddi nella sua bellissima Galleria a perpetua memoria, con altre nobilissime Anticaglie di singulare pregio, le quali egli lasciò che in perpetuo da i suoi Eredi nella sua Casa se ne facesse cortese mostra a coloro che vedere lo volevano, e massime a i Forestieri, Fufius de Musaco hoc aglt cap. 123.

(33) Idem Tratt. d'Agric. Ms. T. 1. pag. 168. ait. — Giardino del Sig. Cav. Niccolò Gaddi, che è appo Santa Maria Novella — Qui vi si veggono Frutti maturi buoni, che danno le Frutte abbondantemente alla Casa — vi sono Pianta nobili, come il Ciriegio a Grappoli, il Pezzo, il Lauro Regio, la Mortella Spagnuola, l'Uva Spina; doppo la Framula, lo Scatano, il frutto che fa le lacrime, l'Albero di Giuda, & altri frutti semplici che vi sono assai, posciachè di quel Giardino sieno uscite quasi tutte le Pianta che sono adesso negli altri Giardini & Orti. Et Alibi fufius V. Gaddi Elog. XXIX.

lis pepercit sumptibus, ut e diffitis quibusque Regionibus, & vel ipsa Aegypto, novas Stirpes flore fructu commendabiles nancisceretur, & eas inusitato molimine ab Aëris inclementia defendit, summoque studio propagavit, non oblectationis suae tantum gratia, sed ut cum Amicis communicaret, & Etruscos Agros locupletaret. Nil mirum igitur videri debet, si *Gaddius Casabonam* Plantarum notitia instructissimum facile in clientelam suscepit, eique Horti sui quem tantopere adamabat curam commiserit. Egregie functus est hoc munere *Casabona*, nullisque pepercit laboribus, ut Hortum illum novis plantis ornaret, utque *Gaddii* votis, & erga se beneficiis responderet. Iam vero *Gaddius*, ea qua erat animi magnitudine, in Hospite suo comparatum ad Rem Herbariam amplificandam ingenium admiratus, & tantam saluberrimae huius Scientiae peritiam bono publico impendendam ratus, *Casabonam Francisco* Magno Duci commendavit, quo beneficio alios quoque Eximios Sapiaientia vel Arte Viros cumulare consueverat (34). *Gaddii* precibus annuit *Franciscus*, & *Casabonam* Hortis quibus Regiae ad D. Marci Aedes instructae erant, deinde Horto etiam huic de quo agimus praefecit, uti superius diximus.

Memoratu dignum est A. MDLXXXVI. *Aloen folio in oblongum aculeum abeunte*, recens ex America advectam, primum in Horto nostro ingentem caulem floribus onustum protulisse (35), inque sui admirationem omnium oculos traxisse.

Fer-

(34) F. Agost. del Riccio Tratt. d'Agric. Mf. T. 1. 46. de Gaddio inter cetera ait — Era amato ancora dagli Oltramontani ingegnosi, perche era lor sostegno in far loro molte cortesie; & come egli aveva visto che erano virtuosi, gli dava avviamenti buoni, mettendogli ai Lavori di Sua Altezza, & ognun secondo l'Arte sua;

sicchè il suo nome si spargeva per il Mondo — era il sostegno e salvezza de' poveri Artesci, che ben sovente l'hanno pianto; posciachè egli colle sue Entrate manteneva tanti Virtuosi Artieri &c.

(35) Ioach. Camerarius in Horto Medico & Philosophico pag. 10.

Ferdinandus I. Rerum potitus *Casabanam* Botanici sui titulo decoravit, amploque stipendio fovit⁽³⁶⁾; nec diu post Hortum Medicum Florentinum pristino splendori restituere, ac in usus publicos ornare volens, provinciam hanc nulli melius se demandare posse ratus est, quam *Nicolao Gaddio*, sumptus omnes, & annuam Dotem ex Aerario Aedilium Florentinorum largitus⁽³⁷⁾.

Gaddius itaque expertissimi *Casabanae* opera usus, brevi temporis spatio, & Magno Duce probante, Hortum hunc nemini per ea tempora secundum reddidit, sive Plantarum numerum, sive dispositionem spectantes⁽³⁸⁾. Solum enim universum repurgari, ac probe subigi iussit, & Areas octo in quas distributum est, a prioribus octo Alphabeti Litteris distinxit, in pulvillos variae figurae dispescuit, stellatos nempe, cordatos, rhomboidales &c. lateribus circumscriptos, & perculia

(36) Buoli de i Salarjati del Granduca Ferdinando I. Sub A. 1588. legitur. A

Giuseppe Casabuona Semplicissima Scudi 10. il Mese. A. vero 1589. Scudi 8. il Mese.

(37) Rescritto di S. A. S. de' 4. Febr. 1587. ab Inc. che la spesa del mantenimento del Giardino si aspetti all' Uffizio della Parte.

(38) F. Agoſt. del Riccio Tratt. d' Agric. Ms. T. 1. pag. 74. Venendo la morte del detto Granduca Francesco, il suo Successore Ferdinando suo Fratello volse ampliare il detto Giardino de' Semplici per utilità e bellezza: Così impose al Sig. Cav. Niccolò Gaddi detta Opera laudevole, & egli con prestezza fece divverre il detto Giardino delle Stalle più volte nominato; altresì fece fare i bei scompartimenti in terra di mezzane campigiane con bellissimo ordine, poichè son' otto Quadri che egli divise in otto Lettere del nostro Alfabeto, cioè A. B. C. D. E. F. G. H. & così in ogni Lettera, vobbi grazia A, che era il primo Quadro, faceva fare i numeri, incominciando da uno, infino a quanti numeri erano i Quadri piccoli scompartiti; così faceva fare al quadro B. che faceva segnare i numeri tutti dalli Scarpellini sopra la Mezzane Campigiane, e cominciando da uno andava infino a ottocento e più, se più Ortisiani vi

fussero in quel Quadro del B. così faceva fare a tutti i detti otto Quadri. E poi aveva vamo creato un Libretto che era distinto come il Giardino, in otto Lettere A. B. &c. & in numeri ogni Quadro, e così v'era scritto in detto Libretto tutte le Pianta Pellegrine, e nostrali, e questo il feciono acciò non fusse tolto loro le Pianta; altresì per conto dell'ordine, per poter nominare il numero infinito de' Semplici che ci conduce messer Giuseppe Benincasa Fiammingo dal Regno di Candia, dove stette assai tempo, & così d'altre parti del Mondo condusse semplici e Fiori & Erbe di pregio, virtù, e bellezza T. autem 2. pag. 298. subiungit. Questa ti sia per regola ferma stabile e buona, quando vuoi avere buoni Erbaggi, dirtegli i tuoi Campi affondo due braccia, come si fa quando tu poni le Vigne; così per parecchi anni avrai Pomi, & Frutti &c. & altresì tutti gli Erbaggi Semplici, e Pianta di Fiori verranno di somma bellezza & grandezza, come s'è veduto nel bellissimo Giardino & insieme Semplicissima, che fece divverliere il non mai abbastanza lodato Sig. Cav. Niccolò Gaddi per ordine del Granduca Ferdinando; poichè ho visto tutte le Pianta a posto, o seminate, con prestezza venir grandi.

culiari numero scalpri ope notatos. Pulvillorum sane variantes Daedaleas formas repraesentat Tabula Horti Ichnographica A. MDCCXVIII. confecta iussu Societatis Botanicae: eorum item specimen habes apud Cl. *Tillium* in Tabula Ichnographica Horti Pisani ab ipso met *Casabona* digesti. Singula memorata spatia peculiaribus Plantarum classibus, Acanacearum puta; Ferulacearum, Bulbosarum &c. addixit *Casabona*, eo ni fallor ordine, quem in Pisano quoque Horto deinceps distribuendo servavit. Suis sedibus collocavit *Gbinianas*, & *Leonianas* Plantas quae supererant; earum autem quae perierant iacturam compensaturus, diversa per feraciores Etruriae Provincias Itinera suscepit, inter quae memoratu dignum illud est A. MDLXXXIX. cum *Ioachimo Iungermannio* per Tyrreni Maris Littora institutum (39). Semina in Horto, excursionibusque collecta, in eleganti Spermatophylacio (40) magna cura asservabat, ut cum Amicis communicare, & Exoticarum Plantarum Seminibus permutare posset. In summa totis viribus annitebatur, ut conceptae a Magno Duce de se spei responderet, & *Gaddii* Evergetae sui praeconiis par esset.

Instauratus Florentinus Hortus, & Italicis, vulgatisque illatenus Plantis satis instructus, non explevit immensam in *Ferdinando* cupiditatem amplificandi Rem Herbariam; quin potius extimulavit, ut novarum, & Exoticarum larga accessione Hortum ipsum locupletaret. Eapropter *Casabonam*, cuius peritiam & sedulitatem saepius probaverat, Regiis sumptibus in Cretam Insulam misit, ut Plantas elegantissimas, & Europae usque dum ignotas perquireret, ac Florentiam defer-

(39) Car. Clusius Rariorum Plantarum. Historia pag. 204.

(40) F. Agost. del Riccio Tratt. d'Agric. T. 2. 368. Si possono ancora conservare i Semi in uno studiolo fatto di legname, come aveva fatto messer Giuseppe Benin-

ca *Fiammingo*, che era alto sei braccia, e largo altrettanto, pieno di Cassette piccole, & ogni Cassetta aveva le Descrizioni e i numeri, & i millesimi che quei Fiori erano stati colti, per poter vedere se erano vecchi &c.

ferret (41). Nobile hoc propositum Magnitudinem Animi tanti Principis abunde exprimit, ea praecipue de causa, quod primus omnium talia ausus sit, nullius exemplum sequutus; sed potius exemplo suo excitaverit Moderatores Patavini Lycaeii, ut A. MDCXL. *Ignatium ab Agris* in eandem Insulam mitterent, Plantarum colligendarum, & in Hortum Patavinum inferendarum gratia; Magnos deinde Reges, summosque Viros, ut certatim Europaeos Hortos Stirpibus Novi Orbis ditarent. Caeterum Creticas prae reliquis optimo consilio delegit *Ferdinandus*, cum quia elegantissimas quasdam ex ea Insula acceperat olim a Fratre suo *Lucas Gbinus* (42); tum quia Creticae Plantae ob raritatem, virtutemque singularem, in tanta semper aestimatione Gentium fuisse, ut etiamnum *Galenii* aeo Imperatores Romani Herbarios suos in Creta aluerint, qui singulis annis ad nobilium Antidotorum compositionem Stirpes Urbi necessarias subministrarent (43), persuasionemque apud eosdem processisse fateatur *Plinius*, quicquid in Creta *Iovis* Patria nascitur, infinito praestare ceteris alibi genitis.

Memorabile Creticum hoc Iter a *Casabona* perfectum est A. MDLXXX., & insequenti; nam die III. Novembris A. MDLXXX. e Candia illius Urbe principe ad *Carolus Clusius* litteras dedit (44), & A. MDLXXXII. semina quaedam cum eodem *Clusio* communicavit recens a se collecta in Creta Insula (45). Plurium itaque mensium spatio universam ferme illam feracissimam Insulam peragrarare valuit *Casabona*, a Munificentissimo Principe praesidiis & commodis omnibus instructus, ac *Hieronimi Cappelli* Senatoris Veneti, Insulae-

† †

(41) Idem Aug. Riccius in Agricultura sua Ms. variis locis. Car. Clusius Rar. Plant. Hist. 265. & Prosper Alpinus de Plantis Exoticis in Epistola ad Lectorem.
(42) Barthol. Maranta in Methodo co-

gnoscendorum Simplicium pag. 87.

(43) Galenus Lib. 1. de Antid.

(44) Car. Clusius in Rariorum Plant. Hist. pag. 265.

(45) Idem ibid. XXV.

sulaeque Provisoris Generalis Patrocinio commendatus (46). Discrimina vero, & incommoda longae, difficilisque peregrinationis alacriter superavit Inventutis robore, & vehementissima qua flagrabat Plantarum observandarum cupiditate. Uberem propterea, lactumque laboris fructum tulit innumeras pulcherrimas ignotasque antea Stirpes, quas redux Florentiam advexit, quasque omnes in Horto Florentino satas fuisse, certissimus testis est *Augustinus Riccius* (47), non in Pisano, quem admodum perperam asserunt *Alpinus* (48), & *Vigna* (49). Non exiguum proinde decus Horto nostro accedit, quod ex ipso, tamquam e penu ditissimo, prodierint omnes fere Creticae Plantae, quas *Casabona* cum Amicis Botanicis communicavit, quasque ipsi in editis Libris Orbi Erudito proposuere.

Quum iam *Casabona* Horti nitore satis prospexisset, utilitati quoque Studiosorum consulere voluit: propterea Catalogum Plantarum omnium ibidem cultarum confecit in octo partes divisum, quarum singulas ab octo prioribus Alphabeti Litteris denominavit, singulis Horti Spatiis seu Areis respondentes (50). Dolendum maximopere est periisse, vel in Bibliotaphio aliquo latere Catalogum hunc, quem *Augustinus Riccius* vidisse, pluriesque manibus usurpasse se adfirmat. Utinam vero *Casabona Stephani Rosselli*, & *Augustini Ric-*

(46) Prosper Alpinus in Praef. ad Libros suos de Plantis Exoticis.

(47) Trattato d'Agricoltura Ms. T. 1. 74. & alibi passim.

(48) Loco superius laudato.

(49) Praef. in Animadversiones suas in Theophrastum.

(50) V. adnotata superius n. 38. Idem Aug. Riccius Agriculturae suae T. 3. pag. 14. ait: Chi fusse desideroso d'aver molti più fiori che io non ho nominato, vadia al bellissimo Giardino delle Stalle Ducali in Firenze, altresì al Giardino della Città di Pisa, quali Giardini furono ordinati dal non mai abbastanza lodato messer Giuseppe Boninsepa Fiammingo, possi e custoditi si-

no alla sua morte, e consideri i fiori che in quelli vi sono, e per saperne i nomi loro si faccia mostrare il Libro detto il Repertorio, che chiama ciascuna Pianta per ordine; poichè il Giardino tante volte nominato delle Stalle è diviso in otto Quadri — Et io ho più fiate avuta il detto Repertorio nelle mie mani con mia comodità. Et T. 2. 371. ma chi vuol vedere, si faccia mostrare al Giardiniere delle Stalle Ducali la Lista, o Libretto di Messer Giuseppe Boninsepa, e dal Figliuolo suo che sta al bellissimo Semplicista di Pisa; e potrà vedere quante siano quelle Pianta che non è molto che sono state condotte nella Città di Firenze.

Ricci (51) consiliis usus, Hodoeporicon suum Creticum Litteris consignasset, & typis edidisset! Quanta exinde Naturali Historiae accessio facta fuisset! Saltem Auctori suo inventorum gloria integra remansisset, nec Botanici quidam, Cornicis Aesopicae in morem, alienis pen- nis superbirent. Ego quidem veritatis, & illustrandae Historiae Litterariae studio, conatus sum undecumque decerpere Catalogum Plantarum fere omnium ab ipso inventarum, ac in Florentino primum, deinde in Pi- sano Horro cultarum, quem fortasse aliquando in lu- cem proferam. Inde profecto patebit eas fere omnes Creticas Plantas, quae a Scriptoribus Rei Herbariae Sae- culi XV. exeuntis, & XVI. incipientis exhibentur, *Casabonae* laboribus, & *Ferdinandi I.* Magni Ducis mu- nificentiae deberi, si aliquas excipias ab *Honorio Bello* Vicentino in Creta Medicinam faciente paulo pridem repertas, sed plerumque easdem cum *Casabonianis*.

Duobus circiter annis post *Casabonae* e Cretica Peregrinatione reditum, Magnus Dux Horti Pisani se- dem cum elegantiori, ac commodiori, in qua ad nostra usque tempora conspicitur, permutare decrevit, eique operi praeesse voluit *Casabonam* (52), qui brevi temporis spatio, summaque diligentia Hortum novum Pisanum ea methodo disposuit, qua adhuc dum viget, a Celeb.

† † 2

Michaële

(51) Idem Riccius T. 2. pag. 378. Postquam de Anemone, seu Ranunculo flore pleno rubro verba fecit, addit. Ma non dirò di che Provincia si sia; poichè quel virtuoso Semplicista che lo portò alla nostra Città, che fu Messer Giuseppe Benincasa, del quale si è fatta menzione spesso e meritamente, non volse scriver l'Inventario, che sarebbe stato tanto utile a tutti gli amatori delle Pianta nobili e belle. Imperocchè fu molte volte pregato da me, e da Messer Stefano Rosselli Fiorentino, & egli forse pensava di farlo; ma la malvagia Parca gli tagliò il filo, & così siamo restati privi di molti nomi di Pianta rare, sì nostrali, come pellegrine.

(52) Idem T. 2. pag. 75. Qui potrei dire che il detto Messer Giuseppe Benincasa fu

mandato dal Granduca Ferdinando alla Città di Pisa, a creare un bello e vago Giardino tutto di Semplici, e Pianta di gran Virtù; & egli il fece con gran prestezza, come si vede che oggi è. Et pag. 77. E tempo omai, che noi torniamo a ragio- nare di Messer Giuseppe, il quale dicevamo che aveva posto il Semplicista delle Stalle, e dopo questo fu mandato a porre il gran Semplicista alla Città di Pisa, il quale fu scompartito e posto con grand' ordine e diligenza, e in mentre andava in mano cercando di provvedere nuove Pianta, e Semplici vari, lì fu impedi- to il suo bel pensiero dalla morte, che cor- rendo a noi Fiorentini l'anno 1595. co- lo tolse.

Michael Aug. Tillio descriptus, & Horti Florentini Plantas nobiliores, Creticas praesertim, in ipso propagavit. Scientia propterea, & sedulitate sua promeritus est *Casabona*, ut a Magno Duce Custos Horti ipsius renuntiaretur; quo tamen munere, in Pisana Academia tunc primum instituta, non nisi ab A. MDLXXXIII. ad MDLXXXV. fungi potuit. Vehementi siquidem perquirendarum Plantarum amore incensus, ac corporis robore & aetatis vigore nimium abusus, nova itinera suscepit, inter quae memorabile unum est, quo ex Agro Tyburtino *Styracis* Arborem Pisas detulit (53): assiduis propterea exanthlatis laboribus, morbi vehementissimi labe suscepta, Morti succumbere coactus fuit A. MDLXXXV. Aerae Florentinae. Eius mors caelestis admodum fuit Rei Herbariae Studiosis; tum quod aditum ei obstruxit ad nova praeclara inventa; tum praecipue quod frugiferam aliquam eius Commemorationem nobis invidit. Credere siquidem fas est *Casabonam*, si senectutem adeptus esset, quum ob virium infirmitatem non ultra ipsi licuisset edita Montium iuga conscendere, & labores Botanicarum Peregrinationum comites tolerare, animum ad scribendum applicaturum fuisse. Quod autem secum decrevisset aliquid in posterum commentari, conicere licet ex eo, quod, teste *Augustino Riccio*, Pisas accersiverit *Danielem* quemdam Popularem suum Pictorem egregium, illique iusserit, ut Plantas Horti Pisani integras, & flore fructuque onustas, in Charta maxima nativis coloribus repraesentaret (54).

Ma-

(53) Dom. Vigna in Animadvers. in Theophrastum pag. 105.

(54) Trattato d'Agric. Ms. T. 1. 75. Messer Giuseppe Bonincasa per voler dare la maggior satisfazione all' onorato Studio Pisano, chiamò un suo compatriotto Fiammingo Messer Danello mio carissimo, e gli dette ordine che dipignesse, anzi miniasse tutti i Semplici, e Pianta rare del Giardino in fogli Imperiali, ma le dipignesse

quando erano fiorite, e colle foglie e Cipolle loro, acciocchè si cognoscessino da tutti quelli che erano in Pisa, e da altri per i tempi avvenire: Opera che, se si finisse, farebbe nominata, e meritamente per tutto il Mondo. Num Daniel iste Flosche cognomine fuit? quo usus est Riccius in Marmorum figuris repraesentandis, quemadmodum fatetur ipse in Istoria delle Pietre Ms. cap. 128.

Mores *Casabonae* quod spectat, nil aliud comper-
tum habeo, nisi quod nonnihil difficilis, & nimium
parcus fuit in scientia propaganda. Eapropter pau-
cos in Re Herbaria Alumnos reliquit Florentiae, per
quos tamen *Augustinus Riccius* plurimum se profecisse
fassetur (55). Perpetua atque constanti Principis Gratia
floruit, ab Eruditis Etruscis laudem, & favorem pro-
meritus est; extra Etruriam vero nominis sui famam
propagavit, & Amicos, admiratoresque sibi paravit
Botanicos quosque praestantissimos, quibuscum littera-
rium commercium coluit, & semina Plantarum a se re-
perrarum communicavit (56). Verosimile est *Casabonam*
Medicinae Doctorem renunciatum fuisse: *Vigna* liqui-
dem (57), & *Riccus* in eo nominando, honorificum *Ex-
cellentissimi*, aliumque vernaculum titulum, quo Do-
ctores indicabantur, usurpant. Saltem *Adrianus* (58) illorum
fuisse asserit in simplicium Medicamentorum studio
maxime versatum, & *Georgius Hieronymus Velschius* (59)
Quartanam *Ostrubio* a *Casabona* curatam refert.

Eius opera quod spectat, praeter *Catalogum Plana-
tarum Horti Florentini*, & *Icones Plantarum Horti Pisani*
a *Daniele* Belga expressas, *Riccus* subinvenire videtur
Catalogum quoque *Plantarum Horti Pisani* a *Casabona*
conscripsum fuisse (60), qui fortasse ille idem est, quem
Hieronymus Summarus in Bibliotheca sua asservabat
A. MDCXXIII., simul cum fasciculo *Epistolarum* eius-
demmet *Casabonae* (61); nullum tamen opus, quod
sciam,

(55) Idem Agric. T. 2. 378. de *Casabona*
ait. E' ben vero, che io ho preso molti
nomi da lui, e da' suoi Discipoli, ancora
che fussi alquanto tenece in comunicarli,
che più presto lo rendeva poco grato agli
Uomini virtuosi: ma se per sorte egli fusse
stato della mia natura, amarevole in palesa-
re i suoi segreti cogli altri a vicenda, sareb-
be stato più utile all'universale, & avrebbe
fatto più Discipoli che non ha fatto.

(56) Sunt hi Carolus Clusius, Ioachimus
Camerarius, Caspar, & Iohannes Bau-
hini.

(57) Animadv. in Theophr. pag. 105.

(58) Praef. ad Libros suos de Plantis
Exoticis.

(59) Exotericarum Curationum & Obser-
vationum chiliad. 1. 664.

(60) V. Adnotata superius n. 30.

(61) Hieronymus a Summaria Patric. Flor.
& Pisani Athenaei Moderator vigilan-
tissimus in Catalogo quodam Codicum
Ms. Bibliothecae suae, qui Ms. adservatur
in Bibliotheca Magliabechiana, inter ce-
teros Codices recenset: *Libro del Semplici-
sta Casabona del 1595. coperto di Cartape-
cora. Lettere del Casaboni in un mazzo.
Quaderno del quadro de' Veneti in bianco.*

sciam, typis editum prostat. Effigies tanti Viri conspicitur Pisis in vestibulo Horti Academici.

Liceat modo ab oblivione hominum, atque a silentio vindicare merita Optimi Viri, & praecipui *Cassabonae* Amici, cui Agricultura Etrusca, Hortusque noster plurimum debent. *Augustinus* is est e Florentina *Patricia Ricciorum*, vulgo *del Riccio*, Familia, qui Dominicanorum coetui sese addixit, & suavissimis moribus multiplicem Doctrinam coniunxit. Potissimum autem sese devovit Agriculturae Studio, in quod per triginta circiter Annos toto animo incubuit, latifundiis Coenobii sui D. Mariae Novellae praefectus. Iamvero praecepta theoretica, quae diuturna observatione collegerat, & crebra experientia comprobaverat, in publicam utilitatem proferenda ratus, vastum Opus Geoponicum conscribere orsus est A. MDLXXXV.; sed ad umbilicum perducere non valuit, & in adversariis reliquit, nam Aetatis A. LVII. e vivis sublatus est A. MDLXXXVIII. die XVIII. Decembris. In Monito ad Lectorem ait se Opus illud in quatuor partes secare proposuisse, quarum prima *Agriculturam Practicam*, altera *Theoricam*, tertia *Florilegium*, quarta *Pomarium*, complederetur. Prima, *Agricultura* nempe *Experimentalis*, seu *Pratica*, ad dimidium fere usque perducta, exhibet Alphabeti serie digesta Praecepta Geoponica universalia, historiam & rationem culturae plurimarum Plantarum, ac descriptionem instrumentorum, quibus Agrorum & Hortorum cultura nitorque procurari possit. Theoremata sane continet fecunda, praxes, & cautiones Etrusci Soli Coelique genio accomodatas; verum scriptionis genus adeo prolixum, adeo incomptum est, ut Lectoribus fastidium subinde creare possit. Accedit quod *Riccus* tam crebro dicendorum seriem parergis plerumque incongruis abruptit, & levissima qualibet occasione abrepta narrationes praelongas

gas interferit, quibus plurima sane scitu digna, nec adnotata uspiam alibi posterorum memoriae consignavit; sed de illis merito dici potest: non erat hic locus. Ego tamen parergis *Riccianis* plurimum me debere profiteor Historiae huius Horti Florentini causa, tum quod e *Riccio* tantummodo hauserim ea fere omnia, quae de Magnorum Ducum munificentia, de *Gaddii* vigilantia, & de *Casabonae* doctrina & laboribus superius retuli; tum etiam quod luculenter didici, maximos, & fere incredibiles progressus fecisse per ea tempora in Etruria nostra Rem Geoponicam, & Hortensem, quod peculiari Dissertationi olim fortasse usui erit. Altera pars operis *Ricciani*, seu *Agricultura Theorica*, est Catalogus & ratio Operum Rusticorum & Hortensium, per Anni Temporum, & Mensium seriem digestus, praeceptis & cautionibus optimis respersus. Harum duarum partium Antigraphum coevum, a Cl. *Michelio* olim comparatum, modo Bibliothecam meam ornat, simile Antigraphi alterius, quod in Bibliotheca Regii Nosocomii D. Mariae Novae adservatur. Utinam vero duas reliquas partes educere licuisset e tenebris Bibliotaphii cuiusdam, in quo, ut fama fert, delitescunt! Tertia quidem volumen erat in charta maxima, in qua *Riccus* a *Vincenzio Doria* ⁽⁶²⁾ pingi curaverat nativis coloribus Plantas omnes floribus venustate commendabiles, quae Magnorum Ducum Munificentia, & Optimatum Florentinorum sedulitate ex diversis Orbis parti-

(62) Riccius ipse Tratt. d'Agric. T. 2. 382. Qui potrei avvertire gli Amatori di bei & leggiadri fiori, che se vogliono questi Emblemi descritti da me, si deggino vedere il Libro che ho fatto dipignere di tutti i Fiori d'Italia, e qui vi vedrà tutti gli Emblemi coloriti bene con i propri colori — & questo Libro l'ha dipinto Messer Vincenzio Dori Fiorentino con grand' amore, e studio, e la spesa l'ha fatta il magnifico Sig. Girolamo Sommai, & il Libro è suo, e l'ha fatto per compiacere-

mi. Et T. 3. pag. 9. Nel Libro che ha dipinto Messer Vincenzio Dori Fiorentino per l'Illustre Sig. Girolamo Sommai, ove si scorgono tanti bellissimi Fiori, opera veramente degna d'un tal Signore, col quale tengo amicizia, e per mia soddisfazione e contento ha fatto dipignere tal ornato Libro, che in vero è il primo che si sia fatto nella Città di Firenze, sebbene tuttavolta si sono incominciate a dipignere più Carte da altri; e questo è fornito come debbe stare, che è l'Anno 1596.

partibus delatae, Hortos Agrosque Etruscos ornabant A. MDLXXXVI. Digesserat illas *Riccus* iuxta seriem mensium quibus singulae florere solent, adiunxeratque brevem descriptionem. Sumptus operi ministraverat *Hieronymus Summarius Ioannis* Fil. Patric. Flor. *Riccus* Amicus & Fautor, & apud ipsum adservabatur Liber iam absolutus A. MDLXXXVI. Quarta tandem pars complectebatur Icones Fructuum omnium, quibus Pomona Etrusca tunc temporis superbiebat: non tamen compertum habeo an perfecta, & ad umbilicum perducta ab Autore fuerit.

Florilegii memorati iacturam aliquatenus mihi supplevit aliud splendidissimum *Riccus* Opus, quod modo adservatur in Bibliotheca DD. *Del Turco-Rosselliorum* Patricior. Florent. repertum in Hereditate Familiae *Rosselliae*. Codex est Chartaceus Elephantinus paginis constans VICC., in quibus CCVI. Plantarum Icones nativis coloribus ab eodemmet *Vincentio Dorio* repraesentatae fuere, nullo tamen servato ordine, nulloque nomine adscripto, si CXVIII. priores excipias: *Riccus* idem pluribus locis Agriculturae suae superius memoratae⁽⁶³⁾, asserit se in hoc ipso Codice, sumptibus Amici sui *Stephani Rossellii*, repraesentari ad vivum curasse

Plan-

(63) Praesertim T. 1. pag. 76. ait. Così potrà esser messa in luce la bellissima Opera fatta da Messer Stefano Rosselli Uomo molto virtuoso, e la Città di Firenze gli ha da avere un grand'obbligo, poichè è stato la cagione della salvezza di molti co' suoi Segreti veri che ha fatti nella sua Bottega, che a volergli nominare farei troppo lungo, ma solo voglio dir qui un utile e bel suo pensiero, che egli ha desiderio che si faccia un'Orto comune, che sia abbondante di tutte le Piante onorate e utili e che ricercansi per un Semplicista per salvezza della Città — Voglio dir quattro parole in onor di Messer Vincenzo Dori Pittore Fiorentino, che molto laudevolmente s'è affaticato a dipignere le Piante Medicinali per Messer Stefano Rosselli: ha preso le Piante del soprannominato Giardino delle Stalle quando erano

serite, con le Barbe e Radici loro, & in ottimi fogli bianchi le ha ritratte co' suoi colori proprii — E nell'ultimo del Libro si farà un Repertorio a uso di Stratto, che nominerà tutte le Piante dipinte: Opera non men bella, che utile, e vaga. Similmente non sarà men bello e utile il Libro che ho fatto dipignere de' Fiori dal detto Messer Vincenzo Dori. Egli ha tenuto il medesimo ordine laudevole che ha fatto poi Messer Stefano Rosselli, posciachè abbi dipinto tutte le Piante, e i suoi Fiori, e Foglie verdeggianti; altresì con le Cipolle, e Barbe — Io non solo ho fatto ritrarre una Rosa, ma dieci sorte di Rose co' suoi colori proprii e naturali, & il detto Libro è quasi fornito, che sarà fra quattro Mesi in circa, lo porterò al Padrone che ha fatta sì laudevole spesa per compiacermi.

Plantas fere omnes, quae in Horto hoc Medico Caesareo colebantur, & eas potissimum quas *Casabona* e Cretica Peregrinatione attulerat. Quum A. MDCCXL. pretiosum hunc Codicem bis, at per sex circiter horas tantum contemplari mihi licuerit, non satis admirari potui pulchritudinem & veritatem Imaginum illarum, statimque venit in mentem facturum me operae pretium, si nomina Plantarum in ipso Codice repraesentatarum ab oblivione revocarem. Adnotavi igitur raptim quaecumque potui, & Catalogum attexui fortasse aliquando edendum. Futurum autem fore confido ut Aequi Lectores exinde colligant quantopere dives fuerit Hortus noster, & quatenam sint verae *Casaboniana* Creticae Plantae, quas varii Scriptores suppresso *Casabonae* nomine pro suis venditarunt; quamvis in hoc *Rosselliano* Libro non omnes prorsus contineantur, quemadmodum ex alio subnexo Catalogo apparebit. Nobilissimos tamen Cimelii huius Possessores etiam atque etiam rogatos velim, ut ausus meos aequi bonique consulant, praesertim quum e furto hoc nonnisi decus ipsis accedat. Ceterum reliqua *Augustini Riccii* opera ad Rem Herbariam, ad Lithologiam, & ad Mnemonicen pertinentia, quae Manuscripta apud me, & in variis Florentinis Bibliothecis adservantur, silentio praeteream, illa adnotasse contentus, quae ad Horti nostri Historiam illustrandam opportuna visa sunt.

Postquam *Casabona* Pisas sese contulit, incertum est quid Horto nostro contigerit, & quisnam ipsius curam adsumpserit. Compertum solummodo est, Regnante *Cosmo II.* Magno Duce, Horti Medici formam, famamque retinuisse (64). Equidem Magnus Dux die XXIV. Iunii A. MDCIX. illius curam commisit *Benedicto Punctae* (65)

+++

Se-

(64) V. Thomae Dempsteri *Etruriam Regalem* T. 2. pag. 366.

(65) Registro d' Arruolati di Palazzo dei Pitti 1609, *Messer Benedetto Pontani* in Ruolo per godere i Privilegi, e che abbia la cura del Giardino de' Semplici della Cavalleria

zia a San Marco, del quale al presente ha cura *Piero Giardiniere*, come per Patente. Copia autentica dal Signor Maiordomo Maggiore de' 24. Giugno. Ex Adnotatis Equitis Ant. Franc. Martii; quae in Biblioth. Pub. Magliabechiana adservantur.

Senensi, *Dominici* Filio, Equiti Aurato, Comiti Palasino, *Christianae Lotharingicae* Magnae Ducissae a Medicina. Mentionem de ipso inveni tantummodo in Epistola quadam *Cassiani a Puteo* ad *Marcum Aurelium Severinum* (66), & apud *Puccinellium* (67). Ceterum animi dotes, & virtutum praemia quibus inclaruit, luculenter indicat Elogium, quo eius Sepulchrum Florentiae in Templo D. Proculi ornatum est (68).

Hortulani munere interea fundus est *Petrus Maccetius* ab Anno usque MDCIX. (69), cui circa A. MDCXXV. successus est *Ioannes* filius, *Botanici* postmodum titulo decoratus (70). Retiendum non est reperisse me in *Albis familiarium Cosmi II.* descriptum A. MDCIX. *Franciscum Casabonam Botanicum*; sed nescire an *Iosephi* Filius fuerit. Certe *Riccus* (71) pag. 704. Agriculturae suae diserte asserit, Filium quemdam *Iosephi Casabonae* Horto Pisano praefuisse iam ab A. MDLXXXVI., quo *Iosephus* e vivis excessit. Praeterea *Hieronymus Summarius* Pisani Lycaeii Moderator, in Catalogo (72) Codicum manu exaratorum Bibliothecae suae, recenset Rationem quamdam impensi & expensi a *Casabona* A. MDCVII. Num hi *Casabonae* unus idemque sint *Iosephi* Filius, & num Pisani, num vero Florentini Horti curam habuerint, non liquet; praesertim quum inter Pisanos Botanicos a *Dominico Vigna* (73) coaevo nullatenus recensentur. Verosimile tamen est *Franciscum* superius memoratum Florentino solummodo Horto additum fuisse, quum stipendium non ex Aerario peculiari Academiae Pisanae, sed ex Regio Florentino perciperet.

Inter

(66) Extat apud Severinum in *Vipera Pythia* pag. 504.

(67) D. Placido Puccinelli, *Vita del Principe Ugo* pag. 63.

(68) V. Puccinelli, *Memorie Sepolcrali* pag. 52.

(69) Hieron. a Summaria Pisani Athenaei Moderator in Schedis variis, quae Mss. adservantur in Biblioth. Magliab. adnotavit inter cetera: *Pierre Maccetti Giardiniere alle Stalle di S. A. in Firenze* 1615. & 1618.

(70) Ruolo de' Salarjati del Granduca Ferdinando del 1625. Segnato R. *Giovanna di Piero Maccetti Semplicista*, Scudi 72.

(71) V. Adnotata superius N. 50.

(72) Adservato in Biblioth. Magliab. *Libretto di Conti del Casaboni* 1607.

(73) Praefat. in *Animadv. suas in Theophrastum*.

Inter rariores elegantioresque Plantas, quibus Hortus Noster per ea tempora superbiebat, memorandae sunt *Calamus Aromaticus Officinarum*; *Thymus capitatus*, qui *Dioscoridis*; & *Helleborus niger flore roseo*, e Creta & Belgio delatae, quae tamquam indubia exempla *Acori*, *Thymi* & *Hellebori nigri Dioscoridis* proponuntur in *Antidotario Florentino* editionis quartae A. MDCXXIII.

Ab excessu *Benedicti Punctae* nullum invenimus Horti Praefectum ad Annum usque MDCLIV., quo *Angelus Donninius* Flor. Med. D. illius, aliorumque Regionum Viridarium curam sumpsisse adparet, & ad Annum usque MDCLXVIII. ad minus continuasse. Anno sane MDCLIV., *Bocconius* Panormo ipsi transmittit semina *Tblaspeos Leucoii folio latifolii platycarpi Siculi semper virentis*, & *semper florentis*(74): Ab A. MDCLVII. ad MDCLXVI. in Albis Familiarium *Ferdinandi II. Magni Ducis* descriptus reperitur, titulo *Viridarium Praefecti Generati* (75). Immortalis *Franciscus Redius* in Epistola ad *Petrum Natium* data d. XXIII. Ianuar. A. MDCLXVII. (76) scribit misisse se ad *Donninium* plures radices *Solani Tuberosi esculenti* C. B. vulgo *Batate*, & *Glandes* aliquot *Quercus latifoliae*, quae Magno Duci ex Mauritania Tingitana missae fuerant, ut in Regio *Boboleo* Viridario, & in Horto Medico de quo agimus ferendas curaret. Tandem *Angelum Donninium* recenseret inter Fautores suos *Bocconius*, in *Epistola ad Studiosos Rei Herbariae*, impressa ad calcem *Catalogi* cuiusdam *Seminum Plantarum quae venui exposuit* A. MDCLXVIII.

Donninii igitur vigilantia, & *Ferdinandi II. Magni Ducis*, ac *Ioannis Caroli Principis Medicei* S. R. E. Cardinali Amplissimi Munificentia factum est, ut Hortus

† † † 2

Mc-

(74) Paolo Boccone Museo di Piantae Rare pag. 6.

(75) Giardinier Generale, Scudi 6. il Me- se. Ruoli in Segreteria Vecchia, e gli

Estratti di essi nell' Archivio Segreto.
(76) Impressa est inter Redii Epistolas Tom. 5. Operum omnium pag. 44.

Medicus Florentinus rarissimis, & undique conquisitis Plantis refertus, ceteris similibus Hortis longe praestaret. In eo siquidem primitus delatae sunt ex Indicis oris Plantae plures elegantissimae, & ex eo *Donninus* illarum semina cum Amicis, *Iacobo Zannonio* praefertim, *Io. Baptista Triumphetto*, *Paulo Bocconio*, & *Ant. Scarellio* (77) primus communicavit. Quasdam e Plantis in Horto nostro cultis recensuit ipsemet *Donninus*, in *Catalogo Plantarum Florentinos Hortos ornantium*, quem A. MDCLXII. typis edidit, Appendicis instar ad *Thomae Bellucci Catalogum Plantarum Horti Pisani*. Sed ex sterili Catalogo illo aestimari nolim cultum, & splendorem Horti Florentini per ea tempora. Si enim advertas plures e Plantis a *Zannonio*, *Triumphetto*, & *Bocconio* relatis, a *Donninio* praetermitti, facile colliges plurimas alias, non minus speciosas, in Horto cultas *Donninum* posteris invidisse. In infelicibus hisce Catalogis Plantas plures ab aliis Botanicis illatenus non descriptas, primi quidem *Belluccius*, & *Donninus* indicarunt; sed genericis, vel brevissimis tantummodo nominibus, adeo ut arduum modo sit in immenso Plantarum cognitarum numero eas expiscari. Si autem exactam ipsarum descriptionem subiungere, vel saltem praecipuas differentias nomine, seu definitione includere non detrectassent, Libellus ille utilitatem aliquam nobis adferret, & ipsi inventorum gloria non parum incla-
rassent.

Reticendum non est Anno circiter MDCLII. *Christianum Mentzelium* in ipso hoc Horto Florentino primum observasse (78) *Cannam vel Arundinem totam niveam & foliis, & caule; Urticam item minime urentem,*
quae

(77) V. Zannoni Ist. 20. 69. & 192. Bocc. Mus. P. I. 76. 148. 78. 111. 129. 137. 150. 151. Rar. 12. 31. 52. 73. Triumphett. Observ. 96. Scarelli Possille

ad alcuni capi della Storia Botanica di Giacomo Zannoni 17. 23. 36. 57.

(78) V. Eius Pugillum Rariorum Plantarum.

quae an *Donnini* solertiae debeantur, ignoro: Certe demonstrant per ea tempora Hortum nostrum magno in precio habitum fuisse vel ab Exteris Botanicis, qui longis peregrinationibus alios celebratissimos Europae Hortos inviserant.

In Albis Familiarium Magni Ducis A. MDLVII. descriptum inveni *Ferdinandum Donninium Regis Viridariis Praefectum, Angelo* fratri adiunctum. Vir hic multiplici doctrina ornatus, variis peregrinationibus per nobiliores Europae Provincias, in quibus militaverat non sine gloria, politioris Agrorum & Hortorum culturae praecepta addidit, & in Erruriae usus transtulit. Anno MDCLXXX. Instructionem quamdam Typis *Petri Matinii* edidit, de serendis, plantandis, atque putandis Moris, qui canon maioribus occultus, atque invisus fuerat (79).

In partem laudis cum *Angelo, & Ferdinando Donniniis*, venit tertius Frater *Philippus* Med. D. (80) & ipse Regionum Viridariorum Praefectus, qui plurimum novarum, & elegantissimarum Plantarum semina cum *Zannonio* (81) communicavit, praesertim vero e Perside & Syria delata ab *Augustino Tania* Flor. Ordinis Praedicatorum. Ceterum *Philippi Donninii* labores Botánicos fuscè inferius prosequemur.

Interim animadversione digni sunt Codices duo chartacei in folio, manu exarati, qui errori ansam praebere possent. Unus in Bibliotheca Pub. Magliabechiana adservatur, ab Anonymo quodam circa initium Regni *Ferdinandi II.* (ut videtur) concinnatus, mendacem titulum praeferebens: *Trattato di diverse Erbe che nascono*

no

(79) Dom. M. Mannius de Florentinis Inventis 35. & Mich. Ang. Tillius Catal. Horti Pisani.

(80) *Philippus Donninus Flor. Viridariis Regiae Cels. Praefectus, qui Plantas in Baldo Veronae Monte crescentes legit, & enumeravit.* Tillius Praef. ad Catal.

Horti Pisani. Iacobus Zannonius in Historia sua Botanica pag. 26. & 192. Philippum Donninium appellat *Superintendente delli Giardini del Serenissimo Granduca.*

(81) V. Giac. Zannoni Historia Botanica variis locis.

no nel Giardino de' Semplici di San Marco, e in altri Giardini di questa Città di Firenze, colle sue Figure. Tyronis cuiusdam labor improbus est, qui e Dalechampii, & Molinaei Historia Generali Plantarum Gallice edita Lugduni A. MDCXV. figuras omnes Plantarum, ipsarum quoque Marinarum, & Corticum etiam, radicum, ac fructuum exoticorum officinalium abscidit, chartae agglutinavit, singulisque subscripsit nomen, locum natalem, formam, & facultates, ea fere methodo, qua Cameraarius usus est in Matthioli Epitome. Eundem falsum titulum recentius additum, nempe: *Figure dell' Erbe tirate dalle naturali Piante, che sono in Fiorenza nel Giardino de' Semplici, detto delle Stalle, di S. A. S.* praefert Codex vetustior in folio, qui Ferdinandi Ughellii (edita Italia Sacra, aliisque doctrinae monumentis Illustris) dono accessit Bibliothecae Monasterii sui Florentini Cisterciensium A. MDCLIV. Revera continet infelices quasdam Plantarum figuras, in singulis paginis singulas, easque non e vivis in Horto cultis Plantis desumptas, sed e vetustiori aliquo Herbario descriptas, quorum plura saeculis XI. & XII. confecta in variis Bibliothecis adservantur. Rudium illorum temporum proculdubio fetus est, exhibetque Plantas monstrosas & chimericas, quales ferme in ineptissimo Horto Sanitatis Joannis Cubae spectantur, qualesque non Hortus noster, sed malesanum Auctoris cerebrum protulit.

Munificentiam Ferdinandi II. sensit etiam Paulus Bocconius Panormitanus, de universa Naturali Historia egregie meritis, qui aliquandiu in Etruria vixit Botanici Regii titulo decoratus (82), eamque ferme totam perlu-

stra-

(82) Ipse Bocconius in Epistola ad Cosmum III. Magnum Etruriae Ducem Nuntiatoria Libri sui inscripti *Recherches & Observations naturelles*, ait: *J'ay eu l'honneur pendant quelques années d'être l'un des Herboristes du feu Monseigneur Vostre Père*. In Epistola autem ad Studiosos Rei Herbariae, quae impressa habetur in cal-

ce Catalogi Seminum Plantarum venum ab ipso expositorum A. 1668. se Pisis Magno Duci intervenisse asserit, & Amicorum suorum Philobotanorum infinita humanitate animi, ac liberalitate, Botanici Magni Etruriae Ducis Lauream condecoratum fuisse.

stravit. Non quidem Horti nostri (Praefectis, ut diximus, instructi) curam peculiarem habuit *Bocconius*, sed pro iniuncti muneris ratione, ad ipsum locupletandum detulisse videtur Plantas quaslibet novas, rarioresque in Botanicis suis excursionibus repertas. Certe eius Epistolam quamdam se vidisse mihi retulit Vir Nobilis & fide dignus, qua *Bocconius* ad scribit, misisse se Plantas plures in usum Horti Medici Florentini, oratque ut expensas referri sibi curet ex Aerario IX. Virorum Florentinae Ditionis Conservatorum, quibus id oneris incumbere satis sciat.

Cosmus III. Magnus Dux, ut peculiari semper erga Rem Herbariam amore flagravisset, & Etruriam novis floribus fructibusque ornare studuit; ita quoque Horti sui Florentini cultum & nitorem cordi habuit. Propterea ipsum locupletari curavit rarissimis, novisque Plantis, petitis ex omni Regione, insignium eius aetatis Herbariorum opera usus, praecipue *Philippi Donni-
ni* Regionum Viridariorum Praefecti superius memorati, cui iussit ut Baldum Agri Veronensis Montem inviseret plantarum colligendarum gratia. Strenue *Don-
ninus* Principis iussa perfecit, quumque diu seduloque Montem illum feracissimum perlustrasset, plures rarissimas Plantas redux deportavit, ac ne laborum, inventorumque suorum memoria interiret, conscripsit Hodoeporicon absolutissimum, quod apud illius Heredes adservari aiunt (83). Fortassis autem luce publica indignum non esset, & Descriptionibus eiusdem Montis a *Calceolario*, *Pona*, *Passerinio*, & *Martinio* conscriptis, aequiparari posset.

Usus quoque est *Cosmus* in Horto suo locupletando opera *Pauli Bocconi*, qui tunc temporis Cisterciensium Ordini addictus in Florentino Monasterio degebat (84),
in

(83) Pet. Ant. Michelius in Epistola Nuncupatoria Partis I. Novorum Generum Plantarum.

(84) V. Boccone, Museo di Pianta Rare pag. 41.

in eoque A. MDCLXXXIV. peculiarem Hortum Plantis a se conquisitis instruxerat, ut Medicis ac Pharmacopocis ipsarum formas demonstraret. Pluribus sane novis per Etruriam Botanicis Excursionibus Hortum Regium Florentinum *Bocconius* auxit, & Libris, quos *Cosmi* Munificentia adiutus conscripsit, nova decora conciliavit.

Plantas rariores, quibus postremis *Ferdinandi II.*, & primis *Cosmi III.* Magnorum Ducum Imperii Annis, Hortus Florentinus nitescebat, describere constituerat *Petrus Natius* Iunior Flor. Med. D. *Petri Natii*, qui *Cosmo I.* Magno Duci a Medicina fuit, Abnepos, *Thomas Bellucci* Discipulus, & in Pisana Cathedra successor. *Erat animus* (sic ait ipse) ⁽⁸⁵⁾ *sub una Phytologica Observationis Epigraphe omnigenas Plantarum species in Hortis Florentinis repertas, diuque subscevis temporibus a me observatas, multorum ad exemplar, onomastico ordine recensere; & si quae simul paralipomena in eodem genere extitissent, cuncta in unum volumen reclusa publici iuris aliquando facere, non alium in finem, nisi ut Indigenae uno fere intuitu Stirpes, quas colere Florentia didicit, probe nossent, & Advenae illas, quae forent a nobis expetendae, numquam ignorarent. Hoc mecum dum commentabar Opusculum, & animo manus congruebant, Iconesque multas aere iam incisas, & huic rei comparatas reservabam &c.* Insignem hanc collectionem revera molitum esse *Natium*, & propterea figuras aliquot Plantarum aeri incidi curasse, testis ego esse possum, qui oculis usurpavi singularia exempla quindecim, ni male memini, Tabularum aenearum ad hoc ipsum *Natii* Opus pertinentium, in unum volumen formae quartae compacta, apud Cl. *Michelium* adservata. *Michelius* quidem ex archetypis *Natii* Tabulis exemplum hoc expressisse

con-

(85) Petrus Natius in Florentina Phytologica Observatione de Malo Limonia

—Citrata—Aurantia, Florentiae vulgo *la Bizzarria*, in Monito ad Lectorem.

contentus, illas transtulit in usum Libri sui *Novorum Generum Plantarum*, figurasque inibi suas incidendas curavit, abrais veteribus *Natii* figuris, eo potissimum quia Plantae illae novitatis gratia spectatoribus sese commendare non amplius valerent, a pluribus Scriptoribus dudum publici iuris factae; quod sane non contigisset, si *Natius* ipse supremam manum operi imponere, illudque edere prohibitus non fuisset a luctuosa caecitate, qua diu confictatus est. Ceterum inter Plantas a *Natio* representatas, memini tantummodo *Floris Cardinalitii*, seu *Rapuntii maximi coccineo spicato flore Col. in Rech. 888.* Fructus *Pyri* foliosi monstrosi, & *Convulvi* exotici cuiusdam; nequaquam enim volumen illud ad manus meas devenit cum reliquis Michelianis Libris. Notari tamen meretur, *Natium* in Iconibus hisce exprimendis usum esse Pictore, & Sculptore parum peritis, nec ullatenus comparandis *Baltasari Franceschinio* cognomento *Volaterrano*, & *Halluechio*, quibus Icon *Mali Limoniae-Citratae-Aurantiae* debetur.

Aliud praeclarum monumentum Plantarum Florentinum Hortum ornantium, vidi ego adhuc puer in Bibliotheca Viri Cl. *Brunonis Tozzii*, dum in Florentino Sancti Pancratii Monasterio degeret. Codex erat Chartaceus in folio maximo, seu Regio, ut vocant, exhibens plurimas figuras Plantarum, quas vivis coloribus, miraque arte exprimi curaverat *Ioseph Baldus* Flor. Med. D., qui exeunte Saec. XVII. multiplici doctrina, ac Rei Herbariae potissimum studio inclaruit. Cimelium hoc modo adservatur Londini in Bibliotheca *Guilielmi Sherardii* Botanici dum viveret praestantissimi⁽⁸⁶⁾.

Non ita pridem coemi Libellum formae quartae manu exaratum, & ita inscriptum: *Index locupletissimus Plantarum omnium, quae in Viridario Botanico, a Iosepho Baldio*

††††

(86) Pet. Ant. Michellius in Syllabo Auditorum, quorum nomina brevioribus

notis compendii causa citata sunt in P. I. Novor. Generum Plantarum.

Baldio Medico Pbyfico Florentino spatia 36. Annorum elaborato, continentur: Prior numerus paginam, secundus cuiuslibet Plantae appositum numerum demonstrabit: uberioris tamen doctrinae gratia, ad habenda omnium Plantarum Synonyma, indicabitur quo loci a Caspare Bauhino in Pinace Theatri Botanici ipsa Planta reperiatur, &c. Terminatum hoc opus A. D. MDCLXXXVI. &c. Adversaria haec sunt autographa ipsius Baldii, lituris scatentia, continentque Catalogum Alphabeticum Plantarum, nescio an Horti cuiusdam sicci, an vero Codicis Sherardiani superius memorati.

Duobus ab hinc annis coemi alium quemdam Catalogum Horti Nostri, Vernacula Lingua a Studio aliquo, circa *Philippi Donuini* tempora, conscriptum, & recensentem Plantas plures elegantissimas, praesertim Syriacas, Creticas, Montis Baldi &c. Sunt eae CXX. numero constae in Ficilibus intra, & circa Insulam dispositis; CXXII. in Area prope Regium Hippotrophium; LXI. in Area a Sambuco denominata; CXIX. in Area Hippocastani; V. in Area Plantarum Venenatarum; & XIX. in Ficilibus per Hortum sparsis.

Aliud tandem luculentum testimonium cultus Horti Nostri per ea tempora, esse potest ditissimus Hortus siccus, quem nuper vidi, inscriptus: *Erbario di Filippo Buontempi Speciale di Sua Altezza Reale*, in duo ampla volumina divisus, complectensque sceleta plurima Stirpium rarissimarum Chartae Regiae agglutinata. Volumen primum incohatum fuit A. MDCLXII. absolutum A. MDCLXXXV.; Alterum vero incohatum eo ipso Anno, absolutum fuit A. MDCCV.

Post *Donninos*, nullum peculiarem Horti Praefectum constitutum fuisse certum est; sed Hortulanos tantummodo ipsius curam habuisse. Hi sane Florilegio potissimam navantes operam, despiciatui habuere, & paulatim interire passi sunt reliquas omnes Plantas, quae

quae Floris venustate sese nullatenus commendarent. Talem labem frustra sustinere conatus est Vir in hoc studiorum genere summus *Petrus Antonius Michelius*, Magni Ducis Botanicus renunciatus d. XVIII. Octob. MDCCVI., & Plantas in Hortum hunc, Pisanumque deferre iussus.

Variis quidem ille per Italiam Botanicis excursionibus novas Plantas in Hortum transtulit, aliarum item exoticarum semina ab Amicis obtinuit; sed omnes ferme Cultorum socordia periere.

Ut varia, at breviora Italica *Michelii* Itinera, Magni Ducis sumptibus peracta, sileam, Horto Nostro immensam accessionem factam fuisse credendum est ex Itinere illo, quod peregit A. MDCCX. plurium mensium spatio per Agrum Romanum, perque Apuliam, variasque alias Regni Neapolitani Provincias, ut inter cetera, Plantas a *Fabio Columna* descriptas suis in locis observaret. Memini sane *Michelium* fateri solitum, plura se uno hoc Itinere addidicisse, quam decem aliis. Id autem hoc argumento confirmari potest, quod MCCCXLI. Plantarum species a se observatas recensuerit in descriptione primi istius Itineris Apuli, quam litteris consignavit, quamque publici iuris facturus ego sum, cum reliquis multis Michelianis Operibus Postumis, quum ocium, & aes suppetet. Non minori, nec minus splendida Plantarum peregrinarum messe Hortum hunc locupletavit *Michelius* A. MDCCXII. & insequenti, quibus per sexdecim menses, Magni Ducis iussu, Tyrolin, Austriam, Bohemiam, Borussia, Silesiam, Thuringiamque perlustravit. Verum praeclari isti omnes Regiae Munificentiae, & *Michelii* laborum fructus, tam multae, tam venustae Plantae, Cultorum socordia, ut aiebam, periere. Factum proinde est, ut Horti sui tantum dedecus indignatus Magnus Dux, *Societatis Botanicae Florentinae* precibus benigne annue-

++++ 2

rit,

rit, ipſique Hortum eundem priſtino nitori Regiſ ſumptibus reſtituendum commiſerit.

Quoniam vero *Societatis Botanicae* Magni Etruriae ornamenti mentio incidit, opportunum viſum eſt brevem Hiſtoriam originis, & inſtituti ipſius attexere, ut inde conſtet quam late modo pateat in Urbe noſtra: Naturalis Hiſtoriae Studium.

Praecipua inſtitutae *Societatis* laus debetur Io. *Sebaſtiano Franchio* ⁽⁸⁷⁾ Luſenſi Med. D., qui in Urbe noſtra, vel adhuc Iuvenis, praetantiſſimi Polyiatri famam exiſtimationemque ſibi comparaverat, & multa ac aſſidua familiaritate cum *Michelio* coniunctus, Rei Herbariae Studium ſummopere ſemper dilexit. Squallente, ut diximus, Horto Publico, *Franchius* Clinicae occupationibus detentus, nullibi melius obſervationes Botanicas inſtituere poterat, quam in Hortulo Medico Noſocomii D. Mariae Novae, qui ab ipſo *Marcello Virgilio* ⁽⁸⁸⁾ memoratus, proculdubio vetuſtiſſimus inter Hortos Medicos cenſeri debet. In hunc igitur *Franchius* a *Michelio* transferri curavit Plantas plures indigenas, auctorque fuit *Nicolao Gualterio* tunc Medicinae Candidato, poſtmodum Archiatro celebratiſſimo ⁽⁸⁹⁾, ut ex Horto Piſano Exoticas aliquot deportaret, quae tamen omnes Hortulanorum ſocordia citiſſime periſcere. Quum igitur illam, quam ſecum animo propoſuerant, utilitatem ex Horto Noſocomii non conſequerentur *Franchius*, *Michelius*, & *Gualterius*, cui ſeſe adiunxit amiſiſſimus *Ioſeph Caietanus Monilia* I. C. & Prof. Pub., Hortulum aliquem domiciliis ſuis proximiorẽ parare conſtituerunt, in quo tamquam in portu confugere, & ſuavioribus Muſis litare poſſent. Propterea die I. Octob. A. MDCCXVI. conduxerunt Hortum, & inferiore

par-

(87) V. Micheli N. P. G. P. 1. pag. 24.

(88) V. Marcelli Virgilii Comment. in. Dioſcor. Lib. 4. cap. 38. de Eupatorio.

(89) V. Novelle Letterarie di Firenze dell' A. 1744. Fog. 9. e 10. de' di 28. Febbr. e 6. Marzo.

partem Domus cuiusdam in ea Urbis Regione, quae *Boffi* vulgo nuncupatur, adscitisque in societatem *Iosepho Suaresio de la Concha* Pat. Flor. D. Steph. Eq. & Metrop. Ecclesiae Canonico, nunc Miniatiensium Praesule Meritissimo, ac *Cerchio Cerchio* Senat. Flor. & D. Steph. Eq., inter se convenerunt, ut *Michelius* Plantas in Hortulum deferret, & apta cultura educari curaret; ipsi sumptus omnes in eam rem suppeditarent. Paulo post Homileticen hanc Eruditam ad Academiae formam, evexerunt, adiunctisque in societatem Studiorum Viro Cl. *Philippo Bonarota* ⁽⁹⁰⁾ Senat. Flor., *Barthol. Gornia* Archiatro, & *Cypriano Antonino Targionio* ⁽⁹¹⁾ Polyiatro celeberrimo, constituerunt die X. Iul. MDCCXVII. *Franchium* Directorem, *Suarezium* Provisorem, *Monilium* a Secretis, *Gualterium* Custodem, *Michelium* tandem Rei Herbariae Professore, & Plantarum Investigatorem. Interea Horti solum probe expurgatum, ac subactum, & in quatuor spatia divisum, *Suaresii* & *Cerchii* munificentia aptatum, ac fistilibus plurimis augmentum, Plantis a *Michelio* delatis conferere coeperunt; Domum item universam conduxerunt, & erudita supellectile ornavit, Libris praecipue Philosophicis & Botanicis, quos *Monilia* e Bibliotheca Avi sui *Io. Andreae* Archiatri suppeditavit.

In Hortulo Aestate A. MDCCXVII. *Michelii* solertia iam satis culto, satisque instructo, Academici conveniebant quoties a muneribus quique suis vacarent, & vel eruditis colloquiis, ac Plantarum observatione animum recreabant, vel lectione, aut meditatione, prout cuique libitum esset, tempus fallebant. Ipsorum certe institutum collaudavit *Guilielmus Sberardus* Anglus, Botanicorum sui Aevi facile Princeps, quod novo conatu, Academicorum Studiorum materiam edidit-

(90) V. Io. Lamii Memorabilia Italicorum &c. T. 1. pag. 7.

(91) V. il F. 26. delle Novelle Letterarie di Firenze del 1748. 28. Giugno.

ditissimo Rei Herbariae penu delegerant. Smyrna ille redux, in Horto Boffiano plures Michelianas novas Plantas non sine voluptate observavit, Academicorum eruditae colloquiis, ac Symposiis interfuit, & stimulos ipsis addidit, ut propositum illustrandae Rei Herbariae alacrius urgerent. Summi itaque huius Viri approbatione freti Academici, maiores quotidie progressus habere, & brevi Civium suorum laudes promeriti sunt; adeo ut plures Viri Docti, & elegantiarum amatores, cum ipsis in partem studiorum & laudis venire postularint. Impetrarunt autem *Pandulphus Pandulfinius*, & Comes *Ferrantes Capponius*, Senatores Flor.; *Carolus Tb. Strozza* Patr. Flor.; *Benedictus Brescianus* ⁽⁹²⁾ Ser. M. Ducis a Secretis & Bibliotheca; & *Io. Bapt. Felicius* Comes, & Med. D. in *Barthol. Gorniae* demortui locum adscitus, qui omnes in Leges dudum sancitas iurarunt d. III. Febr. MDCCXVIII. Horum itaque omnium collata opera Hortulus Boffianus tanta Plantarum accessione locupletatus in dies fuerat, ut iam DXXV. diversas species studiosis exhiberet; quumque propterea locus novis Plantis deesset, Academici ampliorem studiis suis sedem quaerere coacti sunt.

Opportune interea, uti superius diximus, cogitaverat Magnus Dux Hortum suum Florentinum pristino splendori restituere, qui Cultorum socordia adeo squallebat, ut non plures LXXXIV. Plantarum species contineret, aut ad summum CLX. si Arbores fructiferas includas. Eapropter Societatis Botanicae precibus facile annuit Magnus Dux, & Clementissimo Diplomate d. XXXI. Octob. A. MDCCXVIII. ipsi Medicum Regium Hortum custodiendum, exornandumque annua dote CCCL. Aureorum concessit. Regia Munificentia recreati Academici, stimulos sibi ad laudem addi senserunt, & ut Principis iussa perficerent, varias Leges san-

(92) V. Lami Memorab. Ital. T. 1. pag. 47.

sanxerunt, quibus Horti culturae & nitori prospiceretur. Praeerat Societati Vir summus *Philippus Bonarota* electus d. VIII. Sept. & Director Culturae Plantarum erat *Michelius*, qui spartam sibi commissam strenue ornavit. Quatuor enim Horti spatia Camporum in morem squallentia subigi curavit, in pulvillos parallelogrammos Buxis tonsilibus circumscriptos dispescuit; duo alia spatia Arboreto destinavit pulvillis in quincuncem distributis; pulvillosque alios in Sylvula prope maiorem Horti portam Plantis Alpinis paravit.

Paucissimas deinde, quae supererant, Plantas Casabonianas, & Donninianas ab interitu vindicavit; illas quas in Hortulo Boffiano coluerat transtulit, ac permutatione sceletorum Plantarum a se in Italia primum inventarum, obtinuit A. MDCCXIX. a Cl. *Vaillantio* semina CCXXIV. Exoticarum, quibus praecipue Immortalis *Tournefortius* ex Orientali suo Itinere Regium Parisiensem Hortum ditaverat.

Rebus ita constitutis, Socii Botanici, suadente *Michelio*, decrevere non Exoticas tantum Plantas, sed rariores etiam Italicas, ac praesertim Etruscas in Horto colendas esse: Maxime siquidem proficuum Studiosis, & pergratum Advenis fore crediderunt, si uno in loco observare possent Stirpes quascumque pulchriores Itala Tellus profert. Accessit quod seminum ipsarum permutatione, facilius Exoticas Plantas, quibus Hortus locupletaretur, obtinere se posse sperarunt. Huic muneri destinarunt *Michelium*, qui perquirendarum Plantarum amore inflammatus libentissime impositum onus suscepit, & quaesitum ivit eas in nativis locis a *Caesalpino*, *Anguillara*, *Columna*, *Barrellerio*, & *Bocconio* indicatis, ut archetypas tantorum Virorum Plantas tuto nancisceretur. En brevem Catalogum Itinerum Botanicorum, quae *Michelius* iussu Societatis Botanicae peregit Regnante *Cosmo III.* Inter prima recensebo unum
insti-

institutum per Ilvam Insulam, per Montem Argentarium, aliaque Orae Maritimae Etruscae loca. Secundum per Mugellanam Praeturam, Alpes Iugi dictas, Agrum Bononiensem, rursus per Alpes Mugellanas, Pistorienses, Mutinenses, & Apuanas, Agrum Petrasanctanum, & Oram Maritimam Lucensem: in huius Descriptione ad CLXXX. Plantas a se observatas recenset. Tertium per Vallem Arni inferiorem, Agrum Paludemque Blentinatam, Montes Pisanos, Planitiem Pisanam, Oram Maritimam Liburnensem, Lucensem, & Massensem: in Descr. Obs. Pl. N. LXXXVI. Quartum A. MDCCXXII. per Urbem Romam eiusque Agrum, per Oram Maritimam Hostiensem, Centumcellanam, & Crassetanam: in Descr. Obs. Pl. N. LXIII. Quintum eodem Anno cum Cel. Io. Hieronymo Zannicbellio Amico suo per Venetorum Insulas, praecipue illam Pordelio dictam: in Descr. Obs. Pl. N. CCXIV. Semina collecta in Itineribus hisce *Michelius* permutavit cum Amicis, plurimaeque Exotica obtinuit a *Vaillantio* A. MDCCXX., XXII., & XXIII.; a *Boerhaavio* LVII. A. MDCCXXII., & a *Sberardio* CXL. collecta in Horto Fratris A. MDCCXXIII. Mirum proinde dictum est quam facile revixerit, & quantopere postremis Regni *Cosmi III.* Annis enituerit Hortus, Societatis Botanicae vigilantia, & *Michelis* laboribus, ut brevi antiquum decus famamque recuperarit. Vivunt sane plurimi oculati testes instaurationis huius, quae aestimari etiam posset ex variis Catalogis Plantarum Horti ipsius, quae inter *Micheliana* Manuscripta adservantur. Post *Bonarotam* Praesides Societatis fuere *Pandulphus Pandulphinius* Sen. Flor., & *Petrus Capponius* Marchio, qui nonnulla circa Leges pro opportunitate variarunt, & Societatem Viris omni doctrinae genere spectatissimis auxerunt.

Parum de splendore suo amisit Hortus Regnante *Ioanne Gastone* Magno Duce, Moderantibus Societatem

Bota-

Botanicam Viris Amplis. *Petro Franc. de Riccis* a San-
 ctioribus Consiliis S. C. M. Sen. Flor. Equestris Ordinis
 D. Steph. Praefide, ac Pisani Athenaei Moderatore, &
Scipione Capponio Marchione, quamvis plurimae sese
 obtulerint difficultates, quas referre non vacat. *Micheli-*
us solito investigandarum Plantarum amore incensus,
 praeter breves excursions per Agrum Florentinum,
 iussu Societatis libentissime perfecit Itinera sex Bota-
 nica, quibus Hortum mirifice locupletavit. Primum
 fuit Mense Octobri A. MDCCXXIV. Per Alpes Falte-
 ronae, Camalduli, & Alverniae: in Descr. Obs. Pl.
 N. LXXXXIII. Secundum A. MDCCXXV. cum D.
Io. Hieronymo Zannicbellio superius laudato, per Iapi-
 diam (93). Tertium A. MDCCXXVIII. a d. XX. Nov. ad
 XV. Dec. per Castrum Florentinum, Collensis Urbis, &
 Volaterrarum Agrum, Dynastiam Gheradescam, Oram
 Maritimam Populonensem, Plumbinatam, Campilia-
 nam, Vadorum Volaterranorum, & Liburnensem: in
 Descr. Obs. Pl. N. XLII. Quartum A. MDCCXXIX.
 Mense Julio diebus duodecim per Agrum Arretinum,
 Alpes Montis Acuti, Sextini, Saxi Simeonis, Carpi-
 nae, Alverniae, & Vallis Umbrosae: in Descr. Obs. Pl.
 N. LXII. Quintum A. MDCCXXX. per Apuliam, ut in-
 vestigationem Plantarum a *Fabio Columna* descriptorum
 absolveret, & observationes in alio Itinere per easdem
 ferme regiones habito A. MDCCVI. incohatas recen-
 seret. Alterum hoc Iter Apulum perfecit iussu, & sum-
 ptibus partim Societatis Botanicae, partim Moderato-
 rum Academiae Pisanae, comitem adsumpsit V. Cl. *Tho-*
mas Perellius Med. D. nunc in Pisano Lycaeo Astro-
 nomiae Prof. Pub., & immensa Plantarum accessione
 Hortum hunc Florentinum, & Academicum Pisanum
 ditavit. A die igitur VIII. Maii ad XXII. Iunii, ingenti
 ††††† labore

(93) V. Io. Hier. Zannicbelli Opuscula Botanica Postuma pag. 9.

labore perlustravit Vallem Arni superiorem, Agrum Arretinum, Cortonensem, Assisianum, Fulginatensem, Pedivallensem, Nursinum, Aquilanum, Sulmonensem, Populensem, Pettoranensem, Castropignolensem, Volturnariensem, Foggianum, Ciriniolensem, Hortanum, Montem Garganum, Agrum Manfredonensem, Sancti Ioannis Rotundi, Serranum, Campimarini, Tremitanum, Piscalancianensem, Piscariensem, Anconitanum, Ariminensem, Bononiensem, Apenninum, & Praetoram Mugellanam tandem; in Descr. Obs. Pl. N. CCCIII. Sextum iter illud est, quo Aestate eiusdem Anni a die XVIII. ad XXVIII. Aug. cum *Brunone Tozzio* Abb. Valumbrosi. Rei Herb. Prof. Cl. Agrum Pistoriensem, Alpes Apuanas, Agrum & Oram Maritimam Petrasanctanam ac Lucensem invisit; in Descr. Obs. Pl. N. XLIV. Silentio praetereundum non est *Brunonem* ipsum *Tozzium* Mense Sept. A. MDCCXXVII. Societatis Botanicae iussu, iter per Alpes varias Etruscas peregrisse, indeque LXXV. Plantarum species in Hortum deportasse. A. MDCCXXIV. *Michelius* nova Exoticarum Plantarum semina a *Vaillantio* accepit, & duobus insequentibus annis alia a Fautore suo summo *Herm. Boerhaavio*.

Feliciores illuxere dies Societati Botanicae A. MDCCXXXI.; Praeside namque *Ferrante Capponio* Comite, & Senat. Flor., amoti sunt obices plures, ipsique Hortum universum pro lubitu excolere licuit. *Micheli* igitur suasu Spatium Quintum, seu Orientale superius, rite subactum, distributum fuit in Areolas LVII. margine lapideo circumscriptas, ac peculiaribus numeris scalpri ope notatas; ipsis deinde Areolis *Michelius* Plantas sextae, & septimae Classis Tournesfortianae conscri curavit, & ut ipsarum Classium inopiam suppleret, tria Itinera peregrit. Primum fuit Mense Octobri A. MDCCXXXI. per Alpes Pistorienses; in Descr. Obs. Pl. N. LXV. Alterum A. insequenti, me sibi comite adsci-

adscito, a d. XXI. Oct. ad II. Nov. per Vallem Arni superiorem, Agrum Arretinum, & Cortonensem: Descriptionem ipse confeci. Tertium A. MDCCXXXIII. a d. XXII. Maii ad XXI. Iunii cum *Io. Bapt. Manna-
ionio* Med. D. per universam ferme Provinciam Senensem, Comitatumque S. Florae: in Descr. Obs. Pl. N. CCL. Silentio praetereundum non est, *Io. Dominicum Civininium* Med. D. die XIX. Aug. eiusdem Anni, in confesso Societatis pronunciasse Dissertationem suam de Natura & Viribus Malorum Limoniarum, Citriarum, & Aurantiarum, quam deinde publici iuris fecit (94).

Ferranti Capponio suffectus fuit d. IV. Sept. A. MDCCXXXIII. *Vincentius* e Marchionibus *Capponiis* Ecclesiae Metropol. Flor. Canonicus, qui incomparabili sedulitate Horti nitorem, & Societatis decus promovere annisus est. Sociorum etenim quorundam, *Micheli* praesertim, *Gualterii*, & *Ant. Cocchii* consiliis usus, quibus unica Horti cultura exiguum nimis, nec satis dignum munus Inclyta Societate visum est; materiem studiorum & exercitationum Academicarum ex universa Physica Scientia delegit, in qua tot Eruditorum Virorum ingenia expatiari libere possent, & Societatem, novis praeclaris Sodalibus auctam, non amplius *Botanicam*, sed *Philosophicam Florentinam* appellari maluit. Propterea novas Leges, quibus Studiorum & munerum ratio definiretur conscribi curavit, in quas intrarunt Socii d. XV. Ian. MDCCXXXIV. St. com.

Hanc suam Instaurationem solemnī panegyri celebrandam decrevit Societas, idque onus commisit suo a Secretis V. Cl. *Antonio Cocchio* superius memorato, Med. D. Phil. Nat. & Anatomes Prof. Pub. S. C. M. Antiquario, & Regiae Londinensis Societatis Sodali, qui strenue perfunctus est munere suo, & novum So-

+++++

cic-

(94) Della Storia degli Agrumi: Lezione
Accademica di Gio. Domenico Civinini

Socio dell' Accademia Botanica Fiorentina. In Firenze 1734. in quarto.

cietatis Institutum pro dignitate, laudavit Oratione publice pronunciata d. II. Sept. A. MDCCXXXIV. in Aula Veteris Palatii, in frequenti Civium Exterorumque confessu. Eam Orationem, quae Societatis propositum luculenter exprimit, ipse Cl. *Coccius* mecum perhumaniter communicavit, & ut in calce Praefationis huius ederem permisit.

Novis Legibus sancitum erat inter cetera, ut statis diebus publici Academici Confessus haberentur, in quibus Socio cuilibet nova in Physicis observata proferre, & Dissertationes de variis Physicomedicis argumentis perlegere liceret.

Primus itaque publicus Confessus habitus est die XX. Sept. A. MDCCXXXIV. apud *Io. Gualbertum Franceschium* Patr. Flor., eique praeter ceteros interfuit Vir Ampl. *Martinus Folkes* Anglus, modo Regiae Societatis Londinensis Praeses meritissimus. *Michelius* duas *Hippocastani* species distinxit, a Botanicis illatenus sub uno *Hippocastani vulgaris* nomine compraeensas. Prima fructum profert spinis raris, brevibus, & rectis armatum, ac seminibus fetum rotundis; Altera spinis crebris, longis, & uncis munitum, semina autem oblonga continentem: Utriusque specimina recentia obtulit ex Regio Castelli Viridario, & ex Horto de quo agimus. Obtulit quoque, & descripsit Folia, Flores, & Fructus *Yucae Indicae* in hoc Catal. descriptae pag. 101., notas características Generis *Yucae* ab Auctoribus propositas emendans. *Io. Bapt. Felicius* Comes & Med. D. ostendit & descripsit Calculos plures a se in Cystide Fellea Cadaveris Humani repertos. Ego exhibui figuram, & descriptionem Stratorum Argillaceorum & Arenaceorum, quibus Solum Vallis Arni superioris constat, & ex quibus deducitur feracissimam illam Etruriae Provinciam, quae modo ab Arno, Rivisque in ipsum defluentibus mire corroditur ac devastatur, donum olim fuisse ipsius

ipſius Arni, quū ſaxeo ingenti obice apud Rinianum, & inferiori apud Inciſam ſtagnare cogeretur. *Io.* tandem *de Baillou* Eques excitavit plures, mirasque Fermentationes, permixtione variorum Liqueurum Chimi-
cae exquisitioris ope educorum.

Secundus publicus confeſſus habitus eſt d. VIII. Junii MDCCXXXV. in Muſaeo V. Cl. *Nicolai Gualterii*. *Michelius* communicavit obſervata ſua varia circa nova Teſtaceorum Genera. Primum eſt *Crepidula*, Teſtacei Genus monotomum, non turbinatum, patellaeforme, thalamo quodam inſtructum, quod deinde ab ipſo *Gualterio* deſcriptum fuit nomine *Patellae ſtructure peculiari donatae*, & repraeſentatum in *Indice Teſtarum Conchyliorum Muſaei ſui* Tab. 9. 69. H. Alterum, *Tubulus Vermicularis polythalamus* ab eodem *Gualt.* Deſcr. Tab. 10. LL. Tertium *Pholas polytoma* *Gualt.* Tab. 105. Quartum *Balanoides*, ſeu Balani vulgaris ſpecies fundo mobili. *Cocchiuſ* perlegit Hiſtorias morbi, & ſectio-
nis Cadaverum trium Inedia ab Oeſophago occluſo mortuorum. In Femina quadragenaria, quae obiit die undecimo inediae, duae Piſcis Salmonis ſaliti verte-
brae cavitatem Oeſophagi obturarant, & acutis proceſſibus ipſius tunicae firmiter adhaeſerant. In Femina alia, quae duodecimo inediae die occubuit, Glandulae Dorſales tumefactae partim ſcirrhoſae evaſerant, partim ſuppuratae ulcus ſordidum fecerant, quod Oeſophagum & Aſperam Arteriam adhaerentem corroſit, & alimentis viam obſtruxit. In tertio tandem Aegroto, qui decimo-
tertio Inediae die occubuit, Glandulae eadem Dorſales, ſimul cum Oeſophagi portione contigua prope quin-
tam Dorſi Vertebram ſuppuratae, cicatricem duram & calloſam efformarant, quae cavitatem Oeſophagi penitus occluſerat. Omnes autem viribus gradatim immi-
nutis, pulſu minori & crebriori ſenſim facta, tandem tenui & frigido ſudore erumpente, mente integra,
placi-

placidissime extincti sunt. Cadavera dissecta, praeter occlusiones Oesophagi, ostenderunt viscera omnia arida, ramificationes venarum elegantissimas, & argenteos muscularium fibrarum fasciculos, quemadmodum *Redius* in Brutis fame enectis observaverat. Postremo *Io. Gentilius* Med. D. communicavit Historiam Februm Scarlatinarum, quae Florentiae A. MDCCXXXIV. populariter grassatae fuerant; & observationes plures recensuit circa curationem Leucophlegmatiae, quae Febribus hisce succedere consueverat.

In tertio confessu ibidem habito d. XI. Aug. insequentis, *Michelius* demonstravit Flores & Semina *Androsacis Marinae*, & *Caltbam* in hoc Catalogo descriptam pag. 20. & 122.. Cl. *Coccbius* perlegit elegantissimam Dissertationem de *Vermibus Cucurbitinis*, qui rarius quam ceteri Vermes in Humanis Intestinis vivunt, & propterea a Scriptoribus Pathologicis non satis accurate examinati fuere. Pluribus rationibus evicit Vermes hosce, figura plerumque semina Cucurbitae aemulantes, quandoque contractos, globosos, vel incurvos, fere semper solitarios, & discretos, una extremitate (vel capite nempe, vel cauda) firmiter adhaerere tunicae Ventriculi, vel Intestinorum, ea ferme ratione, quae *Hirudines* cuti (vel, si mavis, *Polypi minimi palustres* (95) variis

(95) Obiter adnotabo reperisse me duas horum *Polyporum* species, supra *Conservam* in Rivo Horti natam, Mense Aprili A. 1745. quarum una maiuscula, carnei coloris, altera minima, coloris elegantissimi smaragdini: ambae autem per Microscopium prorsus similes *Polypis* a D. *Backer* descriptis apparere, duplici brachiorum corona circa os instructae, quae Cochlearum oculos omnimoda, sed velocissima contractione aemulabantur. Animalcula haec, aliaque minuta in Aquis palustribus degentia, pluries, & multifariam secui; sed numquam tam felici mihi esse licuit, ut eorum membra dissecta viderim reviviscere, & in novum Animal integro simile evadere. Bis tantummodo mihi videor vidisse ex ovulis abscisso Matris membro, seu frusto pe-

nitus mortuo, & putrescenti adherentibus (utpote quae a vivente iam explosa fuerant, & mucro quo vestiuntur Matris cuti sese agglutinauerant, ut frequenter in *Ostracodermatis* accidit) & semel ex ovulo in interiori parte mortui membri Matris clauso, erupisse nova Animalcula Matris similia, a cuius tamen membris adhuc dum mortuis, & putrescentibus diversa erant. Pari ratione ex ovulis in *Pulicis* occisae diffracto Alvo remanentibus, vermiculos, qui deinde in *Pulices* mutantur, prodire vidi, & semina *Malorum Limoniarum*, & *Aurantiarum* in ipso fructu viventi & clauso germinant. Confer *Leewenboeckii* Epist. 1. & 6. ad *Ant. Magliabechium* a me editas in T. 2. *Epistolarum Clarorum Belgarum*, &c. pag. 349. & 359.

variis aquaticis Herbis) sese applicant; quemadmodum *Wepferus* in *Canum* tantummodo, & *Redius* in *Felium* Intestinis antea observant. Quotiescumque vero humor in Ventriculo, & Intestinis contentus, vel liquida in vasis tunicae ipsorum circulantia (ob Alimenti, vel Pharmaci alicuius miscelam) *Cucurbitinis* ingrata, vel noxia evaserint, putavit solere illos, vel escae salubrioris quaerendae, vel fuga se a molestia praeripiendi causa, aliis *Cucurbitinis* praelonga serie, seu catena coniungi, ut unus anteriori parte seu ore, posteriori seu caudae alterius firmiter adnectatur. Longissimas horum fugitivorum Vermium Catenas, quae peculiari nomine *Teniae* nuncupantur, in quibusdam Aegrotis se observasse referunt varii Scriptores Medici: Duas autem praelongas ostendit Cl. *Cocchi*, partim in Spiritu Vini adservatas, partim supra chartam caeruleam arefactas, quas per eos dies Aegroti duo excreverant, simul eam variis *Cucurbitinis* solitariis, vel binis. *Tenia* una sesquiulnalis, *Cucurbitinis* constabat fere CXX. maiusculis, & validioribus; altera minoribus & gracilioribus: utraque autem spectatoribus abunde monstravit *Tenias* nil aliud esse, quam Catenas plurimorum *Cucurbitinorum*, quemadmodum coniectura assequuti fuerant prisca aliquot Medici nostrates, *Thadaeus summus Physicus*, *Nicolaus Faluccius* cognomento *Florentinus*, ac *Antonius Benivenius*, & quemadmodum accuratis observationibus evicit Cl. *Vallisnerius*; non vero peculiare aliquod *Lumbrici* genus esse, ut perperam asseruit *Daniel Clericus*, deceptus a lacera portione corporis *Cucurbitini* unius, quam *Teniae* universae caput esse credidit. Praeter maciem, quam corporibus in quibus hospitantur producant *Cucurbitini* (ob meliorem Chyli partem subtractam) excitare plerumque solent Ventriculi spasmos, Cardialgiam, Globum Hysterico similem, Aphoniam, Stupiditatem, Lipothymiam, aliasque multiformes Ner-

vorum Affectiones. Has omnes oriri posse credidit *Corchi* a vellicatione, & irritatione, quam Bestiolae hae in magno saepe numero, excitant in Tunica nervosa Ventriculi, eiusque insignibus Nervis. Inter Remedia quum Tunicam Ventriculi obsident, commendavit portiones Vini meracioris, aut Spiritus Vini Aromatibus conditi; quia odor & contactus horum Liqueorum *Cucurbitinis* molestus, eos cogat e Ventriculo in Intestina praecipiti fuga secedere, & in Catenas, seu *Taenias* coniungi; quod ipsis exitio est, quum facilius, & maiori in copia sub *Taeniae*, quam solitariorum *Cucurbitinorum* forma excerni soleant. *I. D. Civinini* perlegit Historiam sectionis Cadaveris Feminae cuiusdam, in quo tumor pondo librarum XV. in Ovario sinistro repertus fuit, & ruptura Venae Pulmonaris, causa immediata mortis. *Felicius* tandem exhibuit Spiritum e Saccharo eductum, coloris obscuri, sapore acri empyreumatico, & Chemicam quamdam Sacchari praeparationem, quae incensa tota in flammam caeruleam avolabat.

In quarto denique publico Confessu ibidem habito die VII. Septembris insequentis, *Michelius* obtulit ac descripsit *Aurantium*, *Pomum Adami dictum*; *Limonem* seu *Pomum Paradisi Ferr. Hesp. 305.* & *Citreum Calyce longo, crassissimo, & quinquepartito* Catalogi huius H. Flor. 27. Lapides item duos Idiomorphos in Alpibus Saxi Simeonis repertos, ad Ferri venas reducendos, quorum unus Linguae Bovillae similis, alter granulis Lini seminum similibus compactus videtur. *Felicius* communicavit sectionem Anatomicam Cadaveris, in quo viscera situ contrario disposita erant; & *Gentilius* Observationes varias Medicas circa Molas. Ego tandem obtuli & descripsi *Silicem aculeatum Mercati Metallob. Vatic. 270.* Cornua item Cervorum, Dentes ignotorum Animalium, & Ossa Elephantum petrefacta, quae repereram in Valle Arni superiori, & per se satis ostendunt multo antiquiora

quiora Annibalis aetate esse, tum ratione profunditatis Stratorum Argillaceorum e quibus erui; tum etiam ob varias aetates, & diversam amplitudinem Ossium ipsorum, quae Maximos Elephantēs, seu Indicos, & Minores, seu Numidicos, plurium saeculorum spatio in his locis vixisse demonstrant.

Quamvis Societas Philosophicis hisce Exercitationibus potissimum sese devoverit, non tamen Hortum derelictui habuit; quinimmo ipsius splendorem & culturam provexit. Propterea *Michelius* tria Itinera peregit; primum A. MDCCXXXIV. a die XVII. ad XXIII. Iulii per Vallem Arni Inferiorem, & Umbronis, ac per Alpes Pistorienses: in Descr. Obs. Pl. N. CLII. Alterum Autumno eiusdem Anni per Agrum Bononiensem & Ravennatem, Oram Maritimam Piceni, & Alpes Cantiani. Tertium A. MDCCXXXV. a die X. ad XXI. Iunii per Oram maritimam Pisanam ac Liburnensem, & Montes Pisanos: In Descr. Obs. Pl. N. CVII.

Felicibus interim Societatis inceptis, & *Capponii* Praesidis conatibus averfus afflavit ventus, adeo ut vela statim contrahere necesse fuerit. *Capponius* propterea sponte abdicavit d. XXV. Sept. MDCCXXXV., eique successus fuit *Antonius* e Marchionibus *Niccoliniis*, qui cunctando rem restituere annisus est. Plantas igitur, quae in Horto tunc temporis colebantur servare studuit; & *Michelio* iniunxit ut ipsarum Catalogum conficeret typis edendum. Operi manus statim admovit *Michelius* & A. MDCCXXXVI. Catalogum conscripsit, quem modo publici iuris facimus. Continet hic, ut verum fatear, vix decimam partem Plantarum, quae ab eo tempore, quo Magni Duces Horti curam Societati Botanicae commiserunt, cultae inibi fuere, a *Michelio* assiduis peregrinationibus, vel permutatione cum Amicis Botanicis congestae; reliquae enim omnes ob Hortulanorum socordiam, vel ob propriae sedis, culturaeque

defectum perierant. Ingentem hanc tamen iacturam aliquatenus compensavit *Michelius* accurata ipsarum Plantarum descriptione in reliquis Operibus Postumis exhibita. Magna sane vis frigorum Plantas plures Orientales & Maritimas, & maximi Aestivi Calores Alpinas enecant quotannis in Horto nostro Hypocaustis, & Vaporariis, Umbraculis pariter, & crebris Hydrophylaciiis nondum instructo. Annua haec Horti detrimenta refarcire consueverat Societas frequentibus Michelianis Excursionibus; fecitque pariter A. MDCCXXXVI. sumptibus partim suis, partim Academiae Pisanae, & *Michelinum* a d. IV. Sept. ad XXX. Nov. peregrinatum misit per Agrum Bononiensem, Ferrariensem, Patavinum, Veronensem, Montem Baldum, & Venetas Insulas. Amplissimam inde messem retulit *Michelius*, & non Hortos tantum Pisanum, & Florentinum, sed & Opera sua Postuma mirifice locupletavit. Verum non ipsi solum *Michelio*, sed & Orbi quoque Erudito fatale fuit hoc Iter, tempestate nimis varia & frigidiuscula, ingenti velocitate, ac immenso labore peractum; utpote quod viam stravit dirae Pleuropneumoniae, qua magno Amicorum luctu occubuit d. II. Ianuar. MDCCXXXVII. St. Com.

Gravissimam sane iacturam passa est Societas Botanica praecipuo Parente orbata; & ut aliqua ex parte conceptum dolorem mitigaret, tanti Viri memoriam Funebri Laudatione consecrandam esse decrevit. Id operis libentissime suscepit Cl. *Cocchi*, & Amici merita laudesque pro dignitate prosequutus est Oratione, quam habuit die VII. Aug. MDCCXXXVII. coram leuissimo Civium Exterorumque Confessu; quamque postea Typis evulgavit⁽⁹⁶⁾.

Michel-

(96) *Elogio di Pietro Antonio Micheli Botanico dell' A. R. del Serenissimo Granduca di Toscana, e Fondatore della Società Botanica Fiorentina, letto pubblicamente nella Sala del Consiglio di Palazzo Vecchio il*

di 7. Agosto 1737. da Antonio Cocchi Mugellano, essendo Presidente della medesima Società l' Illustrissimo Signor Abate Marchese Antonio Niccolini. In Firenze 1737. in quarto.

Michelio in Horti Custodia Societas benigne subrogavit d. VII. Ianuar. MDCCXXXVII. me longo proximum intervallo, voluitque inter cetera, ut *Catalogum hunc Michelianum* ad editionem pararem. Non multum sane promovere potui Horti nitorem, minantibus adhuc adversis Societatis temporibus. Plantas solummodo quas inibi cultas repereram, magna cura servare annisum, & plurium Exoticarum accessione ipsas supplere, quarum semina variis temporibus obtinui a Viris Cl. *Io. Bapt. Lib. Barone de Baffand. S. C. M. Archiatro, & Botanico Eximio; Io. Jac. Dillenio* Rei Herb. Prof. P. Oxoniensi; *Io. Ammano* Prof. Petropolitano; *Iulio Pontedera* Prof. Patavino; *Angelo Attilio Tillio* Prof. Pisano; & *Petro Collinson* Philobotano Londinensi. Spatium praeterea tertium, quartum, & sextum, quae squallebant camporum in morem (quemadmodum in Tabula Horti Ichnographica in aes tunc temporis incisa apparet D. E. G.) in Areolas parallelogrammas distinxī, Buxis circumscriptas, aliorum ad instar, quae ibidem sub B. C. repraesentantur. Tandem quotannis Vere, & Aestate Plantas Officinales Studiosis demonstravi, & varia observata adnotavi, quibus *Catalogum Michelianum* Appendice supplere possem.

Illuxit tandem faustissimus Societati dies VI. Iul. MDCCXXXIX. quo FRANCISCI Caesaris Inviictissimi Paternus in Optimas quasque Disciplinas Animus, Graciosissimo Diplomate Societatem Botanicam ab interitu quodadmodo vindicavit, & Augusta Munificentia erexit. Clementissimo siquidem Patrocinio eam nobilitare dignatus est; Horti huius Caesarei curam, annuadote CCC. Aureorum, ipsi commisit; & praeclarum munus demandavit conscribendae Historiae Naturalis Etruriae suae.

Tantis itaque Auspiciis recreata Societas, alacrius in Horti sibi commissi curam incubuit, & ut Plantas su-

perioribus Annis deperditas suppleret, mihi iniunxit
 Autumno A. MDCCXLII. ut Etruriam Maritimam per-
 lustrarem, & non tantum Plantas in Horti usum per-
 quirerem; sed & in commentaria referrem quaecum-
 que ad illustrandam Naturalem Etruriae Historiam op-
 portuna obiter observare contigisset. Accesserunt Be-
 nigna Iussa Viri Amplissimi Nobilissimique *Emmanuelis*
Comitis de Richecourt S. C. M. a Sanctoribus & Etrusci
 Regiminis Consiliis, Regionum Vestigalium Praefidis &c.,
 qui me voluit una eademque opera investigare, atque
 examinare plurima & varia Metalla, quae in illis Re-
 gionibus Medio Aevo effodiebantur. Duorum itaque
 Mensium spatio, qua maiore potui diligentia, peragravi
 universas fere Provincias Pisauam, Liburnensem, Vo-
 laterranam, & Massae Veternensis. Pari consilio per-
 lustravi Mense Octobri Anni insequentis Alpes Barga-
 ses, Lucenses, & Apuanas, ac Provinciam Petrasanta-
 nam, non Plantis tantum, sed & Metallis, ac Lapidic-
 cinis celebratissimis refertam. Mense tandem Martio
 A. MDCCXLV. a superius laudato Patrono meo Sum-
 mo D. Comite *de Richecourt* iussus sum invisere, & ac-
 curate examinare Aluminis Fodinas quae in Agro Mon-
 tisrotundi prope Massam Veternensem paulo pridem
 reclusae fuerant. Tribus hisce Peregrinationibus non
 tantum Plantas plurimas in Hortum intuli; sed & in-
 numera ferme Physica Cimelia mecum reportavi. Ut
 autem pro virili symbolam ad illustrandam Etruriae
 Naturalem Historiam conferrem; praeter Descriptio-
 nes, & observata circa usum Metallorum, conscripsi
 Hodoeporica, Physicis, Medicis, Antiquariis, & Histo-
 ricis observationibus referta, & olim fortasse edenda,
 quorum ideam exhibui in Praefatione ad Tomum II.
Epistolarum Clarorum Belgarum ad Antonium Magliabe-
cbium nonnullosque alios (97).

Aca-

Academicas Exercitationes quod adtinet; d. XXXI. Aug. A. MDCCXL. *Ioseph M. Xaverius Bertinus* Med. D. in Consequu Societatis perlegit Historiam sectionis Cadaveris *Francisci* Marchionis *Puccii*, cuius epitome edita deinde fuit in *Novis Litterariis Florentinis* (98); in alio autem Publico frequentissimo Consequu habito d. . . Sept. MDCCXLIV. in Schola Magna *Lycæi Florentini*, perlegit elegantissimam Dissertationem *de Hydrargyri usu in Medicina*, quam deinde Typis evulgavit (99). Tandem *Io. Dom. Civinini* Med. D. Aestate Anni insequentis, in alio Consequu recitavit Historiam sectionis Cadaveris *Feminae* cuiusdam, in quo tumor insignis cerebri-formis in Ovario dextro repertus fuerat.

A. MDCCXLV. novae Leges sancitae fuere, in quas iurarunt Socii; & *Antonio Niccolinio* Praefidi, qui sponte abdicavit, successus fuit *Io. Gualbertus Franceschini* Patr. Flor.

Studioforum interea commoditati ego inserviens, & Horti nitori, ac utilitati prospiciens, Plantas ubi-
versas humi confitas in Arcolis sex Spatiorum B. C. D. E. F. G. iuxta *Tournefortianarum* Classium seriem distribuere orsus sum, methodo in Horti descriptione inferius adnotanda; opportunis locis *Hippocastanos*, & *Aceres Platanoides* interserens, ut Plantis subiectis, & exiliioribus, Solis ardores melius defenderent. Bibliothecae demum Pub. *Magliabechianae* Praefectura, & crescentes quotidie Clinicae occupationes ocium mihi ad accuratam, assiduamque Horti Custodiam ademerunt, & Botanicis Peregrinationibus vacare amplius non permiserunt, pedem Urbe efferre prohibentes. Accesserunt aliae quaedam causae, quae a suscepto munere abstinendum mihi esse monuere; quapropter honestam missionem a Societate postulavi Aestate.

A.

(98) Fog. 38. de 16. Sett. 1740.

(99) Dell' uso esterno, e interno del Mercurio:

Discorso di Giuseppe Maria Saverio Bertini
Firentino. In Firenze 1744. in quarto.

A. MDCCXLV., & vix Maio insequenti obtinui, meum in locum successit *Xaverio Ferdinando Manettio* Med. D., qui Autumno A. MDCCXLV. Botanicum Iter egerat per Provinciam Mugellanam, & aliud egit Autumno insequentis Anni per Alpes Vallisumbrosae, Camalduli, Alverniae, Montis Acuti, perque Provincias Perusinam, Cortonensem, & Arretinam; tandem A. MDCCXLVII. *Catalogum* edidit *Seminum Plantarum* quarundam *Horti huius*, cum *exteris Botanicae Cultoribus commutandorum* (100).

Ut finem huic nimis fortasse longae Historiae imponam, subiungenda est brevis descriptio Horti ipsius, quam illustrabit adnexa Tabula Ichnographica; Scenographia item Horti universi, expressa (non tamen satis feliciter) in fronte Praefationis huius; & Scenographia Insulae in centro Horti sitae, conspicua in fronte Catalogi Micheliani.

Universa igitur Horti planities, figurae ferme quadratae, in octo Spatia dividitur, & octogonam amplamque in medio Insulam A habet Piscina pariter octogona circumscriptam, & proceris Platanis, Cupressisque obumbratam. Amoenissima Ambulacra pressis tonsisque *Buxis*, & *Ficilibus Mala Limonia, Aurantia*, aliaque *Exotica* *Arbustula* subinentibus ornata; Pergulae item *Laurocerasis, Myrtis*, aliisque perpetua fronde vi-
rentibus Plantis contextae Spatia distinguunt. Spatium quodlibet in Areolas plures dividitur plerumque parallelogrammas, margine lapideo, vel *Buxis* circumscriptas, & intervallis, seu femitis distinctas. In marginis fronte insculptus est numerus, quo Areola ipsa a ceteris eiusdem Spatii differt: singulae vero Areolae octo plerumque diversis Plantis consistae sunt, peculiari numero
mero

(100) *Catalogus Plantarum nonnullarum Horti Academiae Physico-Botanicae Florentinae, quarum semina hoc Anno 1747. ad publicam utilitatem collecta, exteris Botanicae Cultoribus in commercium exponun-*

tur, ut totidem novis, ac exoticis permu-
tentur, a Xaverio Manetti Medicinae, &
Botanices Professore, eiusdemque Horti Cu-
stode. In 4. expanso.

mero margini inculpto indicatis. Ipsa inter se Spatia situ distinguuntur; Primum scilicet Occidentale inferius *B.* Plantis consitum Classis Tournefortianae I. II. & III. Secundum Occidentale superius *C.* Plantis Cl. IV. V. & partim VI. ornatum; Tertium Boreale dextrum *D.* Plantis Cl. VI. reliquis, & Cl. VII. consitum; Quartum Boreale sinistrum *E.* Plantis Cl. VIII. IX. X., & XI. destinatum; Quintum Orientale superius *F.* Plantis Cl. XII. XIII. & XIV. replendum; Sextum Orientale inferius *G.* Plantas Cl. XV. XVI & Graminifolias, eorumque affines expectat; Tandem Septimum Meridionale dextrum *H.*, & Octavum meridionale sinistrum *I.* Arboribus & Fruticibus in quincuncem dispositis consita sunt. Quatuor Horti Anguli Silvulas (7) *Illicibus*, *Lauris*, similibusque Arboribus constantes, & Plantis Alpinis, Frigidarumque Regionum propriis destinatas habent. Horti Parietes *Malis Aurantiis*, *Citreis*, *Limoniis*, aliisque Pomiferis Plantis; scandentibus item, ac praesertim *Vite quinquefolia Canadensi*, *Periplocis*, & *Clematitibus* variis vestiuntur. Iuxta Occidentalem Parietem fluit largus ac perennis Aquae Rivus (4) a Mynione deductus, qui Piscinam uberi proventu supplet, & Plantis irrigandis inservit. In interiori & exteriori Piscinae margine, quemadmodum & in subselliis secus Rivum (4) & Borealem Parietem (5) ad MCC. Vasa Fictilia digesta sunt peculiaribus numeris notata, variisque Plantis consita, praeter alia plurima & maiora secus Ambulacra, perque Insulae solum sparsa. Tandem in Insulae, totiusque Horti centro *A.* Fons est perennis, quem circum Plantae plures Palustres in Fictilibus non perforatis dispositae sunt. Numerus 1. Maiorem, N. 3. minorem Horti Portam indicat; 2. Custodis domicilium, & Seminarium, quod olim *Malis Citriis* consitum erat. In extremitate Ambulacri 5. situm est Hibernaculum nimis amplum, adeoque non satis tepidum.

His praemissis, quae ad Horti historiam pertinent, aliqua modo subnectenda sunt ad Michelianum hunc Librum spectantia. Prima eius pars, Catalogus scilicet Plantarum quae in hoc Horto colebantur A. MDCCXXXVI a *Michelio* conscriptus, iam ab A. MDCCXXXIX. typis expressa iacet. En vobis, Rei Herbariae Studiosi, unam e magno Naufragio Tabulam, en Vobis, opusculum quod Cl. Auctor praepropera heu! nimis morte interceptus absolvere non potuit. Quum enim quotidie immensis, & maioris momenti Operibus insudaret, ut Publico prodesse quae privatus invenerat, & ut fidem Orbi Litterario datam persolveret, in Aestatem insequentem distulerat observationes plurimas, sine quibus Catalogus hicce perfici non poterat. Hoc Vos scire oportuit, ut aequius iudicium ferre possitis de Viro Optimo, cui Urbs nostra, & Resp. Litteraria universa plurimum debent.

Hoc Ego Opusculum ad editionem parare iussus a Societate Botanica, perpauca tunc Libris instructus, & Clinicae Studiis, ac Bibliothecae Magliabechianae cura distractus, operam omnem impendi, ut minus squalleus, minusque incomptum in publicum prodiret. Subsecivis itaque horis lacunas plures, quibus antigraphon scatebat, complere conatus sum, institutis, continuatisque iisdem observationibus, quas memineram Immortalem *Micheli* sibi met proponuisse perficiendas. Nomina item CL. circiter ex iis Plantis, quibus in ultimo suo Itinere per Venetam potissimum Ditionem instituto collectis Hortum ditaverat idem Praceptor meus Amantissimus, suis locis subinde inservi; ac nonnullas rariores Plantas descripsi, & in aes incidi curavi. Commodis denique Tyronum inserviens, adieci nomina in Officinis Pharmaceuticis, & apud Vulgus usitatiora. Consului potissimum Opus Botanicum Celebris *Caesalpini*, qui Etruscas Plantas in natali sede a
se

se observatas graphice describit, multa ad Philologiam & Medicinam pertinentia eleganter discutit; Plantas a *Dioscoride*, ceterisque Veteribus Botanicis memoratas illustrat; tandem nomina in Officinis nostris adhuc dum trita subnectit. *Antidotarium Florentinum*, & *Petri Andreae Matthioli Commentaria in Dioscoridem* Edit. Italic. Valgrif. in f. cum magnis figuris, quae Pharmacopoeorum nostrorum manibus teruntur, evolvenda mihi necessario fuere, ut suis Plantis manca illa, & vaga nomina adiungerem.

Haec autem nomina (lubens fateor) fortasse non omnino propria nonnullis Plantis erunt, in quibus praesertim minutas, at constantes, & aeternas differentias *Michelius*, ea qua praeditus erat oculorum acie, observavit. Huic incommodo mederi non poterimus, nisi quando, magno Reip. Litterariae emolumento, edita sint reliqua Micheliana Opera Postuma, in quibus Vir ille Eximius, inter cetera, Plantas a *Caesalpino*, & reliquis Italis Botanicis descriptas illustrare conatus est, diuturna observatione, & sedula natalis loci inspectione. Interim frui tuto potestis hoc qualicumque labore in eum tantum finem a me suscepto, ut Plantas indicarem, quarum frequentior est, aut esse potest usus in Medicina: Repetita siquidem observatione compertum est minutas hasce, & technicas differentias, parum aut nihil mutare vires Medicas, quae plerumque aequales sunt in omnibus fere Speciebus Generis alicuius Plantarum.

Reliqua Officinalia, & Communia nomina, ex variis Scriptoribus decerpta, si cui minus congrua videantur, & pluribus toto genere diversis Plantis communia, is non fidem, diligentiamque meam repraehendat, sed potius Scriptorum incuriam, qui fecundam minus, & minus constantem Naturam existimantes, non adeo solliciti fuere in exacta Plantarum ab ipsis obser-

veterum descriptione conficienda, insignes quasdam differentias culturae varietati, & Naturae oscitantiae tribuentes. Altera, & potissima ratio est, quod iis temporibus, quibus reviviscere Bonae Artes coeperunt, Clarissimi Rei Medicæ & Herbariæ Scriptores in eo potissimum insudarunt, ut Plantas circiter septingentas ab *Hippocrate*, *Theophrasto*, *Galeno*, *Dioscoride*, *Plinio*, ceterisque veteribus Botanicis nomine plerumque tenus descriptas, seu potius adumbratas, pervestigarent, hasque se reperire posse putarent in ipsa Europa, & eius præsertim regionibus, quæ nullam soli, vel Coeli temperiei similitudinem habent cum locis, in quibus prisci Materiae Medicæ Descriptores Medicinam fecerunt, vel peregrinati sunt. Quam recte ex voto res hæc illis cesserit, ignorare non potest quicumque Celebriorum Botanicorum, qui Saec. XV. XVI. & XVII. inclarnere, scripta pervolverit. Hinc acres illae, & ingloriae disceptationes magno Medicinae detrimento subortae sunt, singulis toto Caelo diversas Plantas pingentibus, & singulis illas quas pingunt, veras, genuinas, & legitimas *Dioscoridis* ostendantibus. Tertiam, & potissimam ambiguitatis huius causam esse puto, quod Veteres illi Scriptores in censum familiamque Vocabulorum Medicorum assumpserunt vaga quaedam, & absurda nomina ab imperitis Agriculis, Mulierculisque superstitiosis temere imposita.

Fateor quidem in his congerendis aptandisque, molestissimi laboris pertaesum fuisse me, præsertim aliis curis distractum; propositum tamen urgere placuit eo potissimum nomine, ut ostenderem Rei Medicæ Candidatis, quantopere necessarium sit Plantas nominibus technicis, propriisque addiscere, & aequivoca illa atque absurda nomina, maiore Generis Humani commodo, oblivioni tradere. Verum Cl. Praeceptoris Scripta interpolare, & pannum purpuræ adsuere religio mihi

mihi fuit; quapropter ea quae ipse adieci asterisco distinguenda curavi.

Unum adhuc monendi supersunt Aequi Lectores, quod nempe si videant *Michelium* in conficiendo Catalogo hoc, exactissimas Clarorum Botanicorum recentiorum, *Vaillantii* praesertim, *Boerhavii*, ac *Dillenii* observationes sequuntur, in nonnullis Plantis describendis a novis eorumdem Methodis discessisse, & vetustiora *Tournefortii* nomina usurpasse, id non *Michelii* inconstantia quadam admissum putent, vel quod ipse parvi fecerit labores Doctissimorum Virorum, quibus plurimum se debere lubens fatebatur; sed potius properandi studio tribuant, ac spei cuidam ultimae manus operi admovendae. Ego autem de iis variandis non adeo sollicitus fui, tum ut quam minima mutatio in antigrapho fieret; tum etiam quia non plane tunc meminera, an aliquid super his peculiariter observasset ac adnotasset *Michelius* in reliquis suis Operibus, in quibus characteres etiam Novorum quorundam Generum Plantarum in hoc Catalogo subinde constitutorum graphice descripserat; quemadmodum in *Appendice* fusius adnotavi.

Quum interea A. MDCCXXXIX. *Michelii* universam Physicam supellectilem, Bibliothecam, & Manuscripta coëmerim, ac evolvere inceperim, facile animadverti Catalogum hunc *Michelianum*, typis paulo pridem descriptum, mendis nonnullis scatere, veritusque sum ne macie sua Lectoribus parum sese commendaret, & Auctore suo minus dignum videretur. Quapropter recensendum, & rursus ad incudem revocandum ratus, *Appendicem* ei attexere constitui A. MDCCXL., qua vulnuscula sanarem, & inopiam supplerem; & qua, fateor, sperabam posse me specimen aliquod dare profectus, quem habueram in Rei Herbariae studiis *Michelio* duce. per octo Annos excultis. Obstitit tamen votis

meis dira Arni Inundatio, quae Florentiae contigit d. III. Decemb. eiusdem Anni, & Bibliothecam meam misere vastavit, quemadmodum in Dissertatiuncula de *Ephemervis* ⁽¹⁰¹⁾ narraui: corruptis siquidem Sceletis varia Plantarum accuratius examinanda, & Schedas plurimas, in quibus Vere & Aestate praegressa, assiduo labore, adnotaveram nomina, descriptiones, & analyses microscopicas aliarum Plantarum. Accesserunt plures aliae causae, quibus *Appendicis* editionem ad hunc usque diem differre coactus sum, & quas fusius exposui in Praefationibus ad Tom. I. & II. *Epistolarum Clarorum Belgarum ad Magliabechium nonnullosque alios* ⁽¹⁰²⁾ ut Crambem recoquere opus non sit. Utrum vero officio & proposito meo fecerim satis, iudicium esto penes Benevolos Lectores, quos ut ausus meos aequi bonique faciant etiam atque etiam rogatos velim.



(101) Lettera di Giovanni Targioni Medico del Collegio di Firenze, e Professor Pubblico di Botanica, all' Illustrissimo Sig. Barone Gio. Batista de Balfand Archiatro dell' Altezze Reale del Serenissimo Francesco III. Duca di Lorena e Bar, Granduca di Toscana, Re di Gerusalemme &c. &c. sopra una

numerossima specie di Farselle vedutasi in Firenze sulla metà di Luglio 1741. In Firenze 1741. nella nuova Stamperia di Gio. Batista Brusagli e Compagni. In 4.
(102) Prodicunt Florentiae A. 1743. ex Typographio Io. Bapt. Zannonii ad insigne Apollinis in 8.

DISCORSO
DI ANTONIO COCCHI
MUGELLANO

SOPRA L'ISTORIA NATURALE

LETTO DA LUI PUBLICAMENTE IN FIRENZE
IN OCCASIONE DEL RISTABILIMENTO

DELLA

SOCIETÀ BOTANICA FIORENTINA

IL DI II. DI SETTEMBRE MDCCXXXIV.



*OBILE ed antica questione fu
sempremai ed è tuttavia tra' fi-
losofi, se l'uomo per la sola
sua naturale inclinazione sia
portato a bramare la compa-
gnia degli altri uomini, ovvero
se solamente di se medesimo in-
namorato ed altrui invidioso e
molesto goda della solitudine e della contenzione e della rapina.
Io confesso che essendo avvezzo a sciogliere i dubbi che mi si
presentano colla sperimentale osservazione, mi sento costretto
a riconoscere nel cuore umano un certo senso di benevolenza
dal quale dipende il diletto che noi veggiamo che la maggior
parte ha nel giovare altrui ove il proprio interesse non s'in-
ter-*

terponga. Dal vigore e dalla delicatezza del qual senso interno di sponanza benevolenza par che misurare si debbano e non d'altronde i piccoli ed i grandi eroi.

Un illustre argomento di questa natural forza che senz'altro motivo conduce l'uomo a procurare il bene di molti da lui nemmen conosciuti, e la cui gratitudine ei non ispera talora, sicuramente può trarre il mondo da quest'istessa vostra adunanza, poichè non per altro avete voi voluto celebrare con essa questo giorno ed a me comandato avete che da questo augusto luogo io parli, se non per render palese a tutti l'eroica intenzione vostra di formare una Società filosofica per ampliare ed accrescere e spargere quanto si possano comunemente le più recondite verità delle scienze che an per oggetto la contemplazione dell'eternie immutabili leggi della natura. E poichè questo nobil pensiero nato in voi dal solo natural genio benefico può aver molte utilissime conseguenze e per voi medesimi e per tutta la città nostra, non dee parere inopportuno il considerarle ora alquanto, non solo acciocchè voi dagli stimoli della prudenza incitati con maggiore alacrità conduciate a fine una sì nobile impresa, ma acciocchè espostane alla riflessione d'ognuno l'importanza, più facilmente da voi s'ottenga la comune approvazione, la quale suol essere più d'ogni altro premio bramata dall'anime grandi.

Per ben comprendere quanta influenza aver possa nella pubblica felicità questa vostra generosa risoluzione, pare necessario primieramente il riflettere che gli uomini colla sola natural forza della loro mente non sono abili a far lor pro od a fuggir lor danno, senza l'aiuto de' materiali strumenti non solo del corpo loro, ma degl' innumerabili altri corpi che gli circondano. Le potenze poi e le operazioni dell'uno sopra l'altro di tutti questi corpi ubbidiscono con maravigliosa costanza ed esattezza alle medesime leggi sempre invariabili, le quali perciò an dovuta gli uomini con diligentissimo esame intraprendere ad indagare. Ed essendo i sensi nostri deboli ed
ottusi

ottusi e la composizione della materia infinitamente varia, è stato necessario il raccogliere istoricamente le osservazioni e le scoperte particolari sopra ciascun differente genere di corpi, onde resulta l'esperienza, sulla quale tutte l'arti nostre sono fondate.

Dalla molteplicità e dall'eccellenza delle quali arti dependono principalmente i comodi tutti e le delizie della vita, e quella beatitudine di cui l'uomo s'osserva esser tanto bramoso, e che consiste nella facoltà di eseguir buona parte delle sue voglie. Onde è manifesto che le naturali e scientifiche ricerche le quali discuoprono le necessarie affezioni della materia e le forze di ciaschedun corpo contribuiscono più di tutti gli studi all'umana felicità, e che moltissime e pubbliche e private sventure non d'altronde bene spesso an potuto aver origine che dall'ignoranza di qualche fisica verità. E siccome le combinazioni delle cose sono infinite alcuna verità naturale peravventura non vi è cotanto minuta e particolare che d'innumerabili prodigiose conseguenze non possa esser feconda.

Chi mai per esempio creduto avrebbe che il non osservare una per altro facilissima a conoscersi semplice e costante proprietà d'una pietra che in moltissimi luoghi si truova comunemente, e di cui alcune altre forze più potenti erano state con diligenza grande scoperte e celebrate dovesse privare gli antichi del commercio colle più remote nazioni e della sperimentale cognizione della grandezza e figura e parti ed abitanti della terra, onde i loro scritti ripieni sono di tante false e ridicole relazioni ed ipotesi favolose? Ognun s'accorge che io intendo di quella insigne efficacia della calamita, per cui ella dimostra il settentrione e'l mezzogiorno, e che essendo stata felicemente osservata da' moderni diè loro l'ardire di mettersi per l'ampio mare aperto and'ei poterono al più remoto termine dell'Africa navigando intorno riconoscere i lidi orientali dell'Asia di così dubbia fama, e dirigendo a ponente il lor corso poterono ritrouare le affatto ignote terre d'America. Le
confe-

conseguenze delle quali navigazioni come ancora di quelle ai lidi settentrionali dell' istessa nostra Europa che prima erano cotanto oscuri voi ben le sapete, e forse non passa giorno che qualche godimento o ne' cibi o nelle vesti o nella varia suppellettile non ne sentiate.

Perniciosa sembra essere stata in ogni tempo al genere umano la guerra, ma pure chi ha bisogno di difendersi con essa, di vincere e d'espugnare, e d'acquistarsi con sì efficace mezzo la pace, non potrà non riconoscere l'immenso vantaggio che all'arte militare ha prodotto l'uso di quella polvere di potentissima esplosione che quel Tedesco contemplativo come dicono vi applicò il primo, e non potrà s'io non m'inganno senza qualche maraviglia riflettere come una così importante invenzione aver potesse origine da una particolare esperienza che due secoli avanti innocentemente e per suo diletto fece sopra le facoltà del nitro il sommo naturalista de' secoli barbari il Francese Bacone, imitando coll'accendere quella sua nota mescolanza nell'aria aperta l'effetto del tuono e del fulmine.

E chi può mai ridire tutte l'utilità di quell'unica e bellissima osservazione del moto circolare del sangue negli animali? Del qual moto qualche confusa idea sembra che avessero ed Empedocle ed Ippocrate, come si vede in quell'insigne frammento che del filosofico poema del primo ci ha conservato Aristotele, ed incontrandosene alcuni indizi negli scritti del secondo. E benchè molto più chiaramente l'indovinarono in parte servendosi più che d'altro del loro ingegno e Michele Villanovano, e il Colombo, e il Cesalpino, tutti però inutilmente ne parlarono finchè non ne diede al mondo intera sicurezza l'Harveo servendosi delle sezioni de' cadaveri e de' vivi animali, e dell'osservazioni degl'insetti col microscopio, e portandosi in quel suo ingegnoso libro da sagace ed accuratissimo naturalista. La quale scoperta ha tra gli altri quel sì grand'effetto prodotto ch'ella ci ha costituiti abili a distinguere tutto ciò che

*che di buono e di vero si ritruova nelle memorie di ben due-
mil' anni sopra la medicina dal molto falso e fantastico che in-
sieme vi fu mescolato. Onde al presente rigettando tutto ciò
che ne' libri degli antichi risguarda la spiegazione de' feno-
meni del corpo umano, che per mancanza di quella sola noti-
zia totalmente è fallace, possono i dotti e savi medici ritrarre
ed usare le istoriche osservazioni sul corso de' mali e sugli ef-
fetti de' rimedi delle quali osservazioni moltissime pur ci sono
state fin da' secoli più remoti da quei buoni e valenti uomi-
ni trasmesse.*

*Degna altresì di somma lode fu la diligenza usata prin-
cipalmente dal nostro Redi sulla generazione degl' insetti la
quale ha spogliato il mondo di quella ridicola e vanissima
opinione, che i corpi organici dell' innumerabili razze di quelli
animali tanto più maravigliosi quanto più son minuti non se-
guitaessero come gli altri le loro specie, ma che da poca e ina-
nimata materia senza veruna costante legge con istrana mu-
tazione si formassero, e da un non inteso moto che putredine
chiamavano vita prendessero. Opinione che oltre all' essere
assurda teneva ognuno nel continuo dispiacere di credere im-
possibile il difendere o i cibi o le vesti od altre cose fatte in
uman uso dall' invasione di quelle minutissime bestie immaginate
di spontaneo nascimento, e i medici fanno di quanti altri er-
rori nell' esercizio della lor arte ell' era cagione. E tanto era
difficile il non lasciarsi preoccupare o per semplicità o per
inavvertenza da questa allor comune credenza ch' io non so che
alcuno anco eccellente filosofo fuori di Pitagora s' accorgesse
mai della sua falsità, onde non senza compassione s' osserva che
non ne furono esenti nemmeno l' Harveo ne il Galileo che fur
del mondo sì gran maliscalchi.*

*Uopo non è ch' io parli di quell' altra pur singolare os-
servazion naturale che nobilita molto la nostra patria ov' ella
per la prima volta fu fatta, io intendo la scoperta della
gravità dell' aria, poichè tali ne sono state le conseguenze,*

§ § §

che

che per mezzo di essa anno gli uomini appresa l'arte non solamente d'intendere ma in molti casi ancora di regolare i moti occulti che si fanno dentro la nostra atmosfera. Che se all'utilità d'alcune poche sciolte e nuove cognizioni s'aggiunga quella che producono le diverse serie di esse innumerabili e coll'esperienza di più secoli stabilite onde resultano le varie parti della fisica, voi ben vedete che nulla forse può tanto meritare la pubblica gratitudine quanto il promuovere e coltivare le scienze naturali. Il che facendosi vengono per necessità a renderli comuni le matematiche, la meccanica, l'astronomia, l'istoria naturale, l'anatomia, e la chimica, e molti altri bellissimi studi, nella non curanza de' quali principalmente consiste la barbarie delle nazioni.

Ed al contrario ove i lumi di queste scienze discendono fino agli artisti, quindi necessario è che si trovi l'abbondanza la magnificenza e l'erudito lusso e che vi si creino le ricchezze di tutti gli altri beni produttrici. Io parlo de' maestri principali dell'arte più ingegnosa, non della servil condizione de' subalterni ed infimi operarii, i quali dovendo sempre ciecamente altrui ubbidire, la stupidità e l'ignoranza, come osservò leggiadramente Omero, è a loro dono di Giove.

Ma se all'eccellenza di tutte l'arti contribuiscono principalmente le cognizioni naturali, come ne ha mostrato l'esperienza in questi ultimi secoli, la medicina che tralle arti tiene senza contrasto il primo luogo, deve anninamente a questa sorta di studi quella chiarissima luce nella quale ella si trova al presente collocata, nulla volendo in contrario l'esempio di quei che pur medici sono e che tutto giorno introducono nel sangue de' miseri mortali tante stranissime materie, non solo senza sapere quali mutazioni elle debbano soffrire ed a quali termini pervenire nel lunga e da lor non inteso viaggio de' canali del corpo umano, ma senza averle nemmeno mai vedute, ne lettane la minima descrizione negli storici naturali, non che indagarne la natura colle proprie ricerche.

Quan-

Quando poi oltre agli artefici e a' medici le naturali notizie pervengono, come non è impossibile, fino alle menti de' grandi, a' quali la fortuna suol porre in mano il governo de' popoli, è manifesto che ei fanno allora molto meglio giudicare della pubblica felicità ed opulenza, e stabilire i mezzi di mantener l'erario e il commercio, e possono per se medesimi più comodamente fare le prudenti osservazioni ne' loro viaggi, e dirigere con maggiore applauso la loro magnificenza, difendendosi così dalla sazietà e dalla noia, per mezzo della rara e sommamente stimabile arte del godere. Nè fuorchè godimento alcuno par che esser vi possa per chi è privo del bene dell'intelletto, cioè della facoltà di conoscere il vero.

E perchè la verità e l'assurdità di qualunque cosa proposta si conosce dalla coerenza o contradizione colle precedenti certe e sicure notizie, nè nulla vi è di più certo tra gli uomini dell'esperienza, è manifesto che è più idoneo a scoprire le fallacie altrui e perciò meno soggetto all'inganno e all'errore chiunque di maggior numero di sperimentali verità è fornito, e questi se ben si considera altri esser non può che l'ingegnoso naturalista. Quindi è, che in quelle nazioni ov'è più scarsa e più negletta la natural sapienza, quivi più frequenti s'incontrano anco in questo lucidissimo secolo gli esempi di quelle vergognose e sventurate illusioni che prodursuole non solamente nel piccolo e stolido volgo, ma tra i nobili ancora, la vanità de' cabalisti, degli astrologi, degli alchimisti, de' cavatefori, de' ciarlatani, e se altri vi sona simili perniciosi impostori.

Meno dannosa è per lo più ma non però senza qualche vergogna e senza biasimo la semplicità di coloro che pieni d'errori popolari dan fede a tutte le favole di cui abbondano i libri de' filosofi plebei, che ad ogn'ora propongono esperimenti che non succedono, del qual vizio infetti sono molti istorici ed oratori e poeti per altro assai riguardevoli, e solamente liberi ne sono coloro che qualche perizia anno della

vera naturale istoria, e della sperimentale filosofia. Della quale altresì bisogna essere affatto privo per lasciarsi vincere dagli ingannevoli discorsi d'alcuni tanto più pericolosi quanto ci son propagati con qualche apparenza d'ingegno e di dottrina, che spargono negli animi de' giovani semi di disprezzo per gli studi più belli.

Creda pure altri che inutil sia lo studio del Greco nol crederà già il dotto naturalista il quale non solamente vede che quasi tutti i nomi che s'adopra nelle scienze anco i modernamente imposti sono di quella lingua, ma si è di più accorto che dall'esatta e critica intelligenza de' passi difficili che s'incontrano ne' più antichi osservatori che Greci furono, infinite bellissime notizie dell'uso d'alcune materie ci sono state scoperte dal Colonna, dal Salmasio, dal Raio e da alcuni altri, e molte ancora vi restano a scbiarirsi, senza le quali la vecchia tradizione nell'istoria naturale di quel popolo si glorioso e sì grande sarebbe stata interrotta.

E come non potrà maravigliarsi il fisico sperimentatore che un simil fato d'esser predicata inutile da alcuni de' nostri creduti sapienti abbia avuto l'analisi, quale ella oggigiorno per tutto s'adopra per mezzo dell'arimetica universale i cui metodi anno prodotto i maravigliosi progressi che l'età nostra ha fatti nelle matematiche e nella fisica sopra le antiche?

*Ed altri studi pur vi sono che tanto meno meritavano d'essere vilipesi quanto più avevano contribuito alla fama e alla fortuna di chi gli depresse, e per esser eglino diretti alla conservazione della sanità e al prolungamento della vita principal fondamento dell'umana felicità. Io intendo di quegli studi che costituiscono la medicina, la quale non posso dissimulare che tra di noi riceve non piccolo oltraggio da una sparfa tra molti incredulità della sua efficacia. Non voglio qui ricercare l'origine di questa opinione, potendo ella forse non essere altro nella nostra città di parlare avida, come osservò
il*

il nostro istorico, che una mera repetizione del particolar parere d'alcuni spiegato con fasto d'ingegno e di lettura contra questa a loro mal nota professione. Sarebbe facile il dimostrare le loro fallacie se or fosse opportuno, poichè l'esercizio castrense ed urbano di quest'arte tra numeroso popolo e principalmente ne' più insigni spedali, l'apertura frequente de' cadaveri, le cognizioni anatomiche e fisiche, la lettura de' libri antichi e moderni, e le scienze del moto, fanno toccar con mano la verità di queste due proposizioni. La prima si è che vi sono alcune infermità di lor natura incurabili, di cui però l'accorgersi al primo loro apparire è effetto della somma eccellenza nell'arte. La seconda che molte altre infermità possono con sicuro metodo curarsi, e neglette e abbandonate al natural corso senza verun discreto aiuto finiscono per lo più nella morte o passano in altre peggiori od incurabili.

A questa erronea incredulità dell'efficacia della medicina non si può sperar che si oppongano se non gli amanti della naturale istoria e filosofia, i quali veggono l'insufficienza delle opposizioni, ed insieme conoscono che togliendosi quest'arte, bisogna rinunziare al pensiero di mantenere non che di porre in più florido stato le parti tutte della fisica, dal complesso delle quali resulta il pregio de' medici non volgari. Io non nego che vi possano essere e matematici e filosofi insigni senza esser medici, ma è noto altresì che finora la molto maggior parte di loro, qualunque ne sia stata la cagione, o medici furono o del tutto o in parte o essere lo volevano.

A' soli naturalisti dunque appartiene come effetto del lor metodo di studiare e della multiplice lor cognizione il possedere quella principal parte dell'umana sapienza che consiste nell'esser privo d'errori, evitando non solamente la troppo facile credulità, ma la non meno erronea troppo ritrosa diffidenza de' nostri sensi e della nostra ragione. Nè sembra esser l'ultimo tra' vantaggi che la scienza naturale può apportare al nostro ingegno, quella rara e perciò stimabilissima unione

ne delle critiche e delle scientifiche dottrine poichè non solo io credo che gli studi che molti di voi fate con tanta lode intorno alla nostra volgare eloquenza, della quale omai niun popolo Italico vi contrasta l'impero non possano ricevere alcuno oltraggio dalle fisiche ricerche, ma sono affatto persuaso che elle vi daranno materia onde congiugnere alle scelte parole i profondi pensieri, ed illustrare la vostra Greca e Latina erudizione colle bellissime moderne scoperte. Massime avendo l'esperienza mostrato che non è impossibile in questo secolo così abbondante d'aiuti per ogni sorta di studio il trapassare i troppo angusti confini ne' quali erano tenuti per l'addietta molti de' grandi ingegni, cioè nell'infanzia del solo volgare o del Latino scolastico e ne' pochi frammenti dell'antica fisica onde è composta la non più tanto celebrata filosofia d'Epicuro, di cui non è gran tempo che alcuni erano tanto fastosi, e però non sarebbe vanità il credere che dopo tanti progressi delle varie scienze potesse omai farsi quel fortunato innesto d'elegante facondia colla sublime sapienza al quale par che indarno aspirassero i vastissimi ne' tempi loro e per altro sommamente stimabili ingegni d'Aristotele, e di Platone.

Ma perchè non basta a render l'uomo felice la chiarezza dell'intelletto senza la bontà e pace del cuore conviene considerare alquanto se anco per questo bene aver possano qualche efficacia le naturali cognizioni. Bene tanto stimabile che ad esso solo par che sieno state sempre dirette le mire de' più savi filosofi di tutti i secoli e di tutte le nazioni. Poichè non per altro che per ottenere la tranquillità dell'animo che è l'ultimo scopo della morale filosofia tanto si applicarono alla fisica gli antichissimi sapienti collocando gran parte della felicità nello scoprire le vere cagioni delle cose.

E certamente l'indagare quali sieno i legami che tengono i grandissimi corpi degli astri sempre in regolari distanze ed in moto uniforme per l'immenso universo ed il vedere che non altra è la forza che produce l'operazioni delle minime

nime parti della materia sopra la terra, deve rapir l'animo dello spettatore naturalista in una tranquillissima e dilettevole contemplazione della serie connessa ed ordinata delle cagioni subalterne, ed in una quieta ammirazione dell'unità e semplicità della cagion somma e primaria, la quale fu perciò dalla nostra maggior musa chiamata quel punto dal quale dipende il cielo e tutta la natura. Onde ne' dispiacevoli eventi nulla può mai tanto facilmente domare il cuore umano come disse divinamente Omero quanto la considerazione della necessità, cioè della dipendenza degli effetti dalle loro cagioni.

Quindi è che i naturalisti per quella loro innocente abitudine d'osservare e d'intendere le proprietà delle cose senza detestarle quando elle riescano incomode, sono perciò i più atti di tutti gli uomini a soffrire pacificamente l'altrui odio, l'ira, l'invidia, la vanagloria e le altre passioni che vizi chiamansi dell'umana natura. Ove al contrario coloro che il genio sperimentale non anno e della natural filosofia sono affatto ignoranti, il mondo riempiono di satire e di querele, e colle loro chimeriche immaginazioni non d'altro parlano che di riformare le repubbliche, e togliendo gli abusi cioè mutando i sensi e gli affetti credono che ridar potrebbero gli uomini al secol d'oro.

Ma considerando che innumerabili libri sono stati scritti da' filosofi per migliorare i costumi degli uomini inutilmente, credo che meriti la vostra deliberazione il pensare se non forse sia meglio che voi vi propongiate un contrario vanto a quel famoso di Socrate e che tentiate di ricondurre la filosofia dagli uomini al cielo, ov'è la sua sede più gloriosa. Certo è dall'istoria che alcuni di quella scuola sì poco moderati furono che giunser fino ad occupar la tirannide delle lor patrie, e se esser non si voglia troppa timidi amici del vero, negare non si potrà che per contentare la mente umana mai furono costituiti alle ricerche ed osservazioni d'Anassagora e di Talete
le

le fantasme ed i folletti di cui son piene le socratiche carte, e le tanto famose idee colle quali si confondono alcuni malamente filosofi trattando l'ombre come cosa salda.

Se dunque vi può essere beatitudine tra i mortali ella deve principalmente consistere nella quiete e perfezione del cuore e dell'intelletto, la quale non può nascere se non dalla cognizione delle verità naturali. Della curiosità delle quali e delle osservazioni necessarie per acquistarle non dovete voi vergognarvi essendo nobili e grandi, poichè il sapere non altro essendo che una potenza e producendo autorità, non può se non accrescer nel popolo l'ossequio e l'ammirazione verso di voi che è il solo bene reale della nobiltà e della grandezza.

Ne v'importi la non curanza che alcuni in altre cose assai dotti dimostrano delle cognizioni naturali ch'eglino ignorano, anzi godete internamente del paragone, e rammentatevi piuttosto gli esempi d'Alessandro che tant'oro profuse per l'istoria degli animali, di Mitridate che tante esperienze fece, de' Tolomei a' quali tanti bei libri degli antichi naturalisti furono dedicati, e appresso i Romani voi ben sapete di quali casate erano quei che scrissero dell'agricoltura, e le grandi cariche e la confidenza de' principi che ebbe Plinio, per non dir nulla di quell'Iuba Re di Numidia che vinto e condotto da Cesare a Roma, negli studi naturali passò tranquillamente la sua avversa fortuna, i quali studi non punto gli nocquero per guadagnarli il favore d'Augusto e per decorosamente sostenere e trasmettere anco al figliuolo la sua condizione reale.

Ma senza cercare le antiche memorie, non ha forse la Toscana veduto il suo sovrano avo paterno del felicemente regnante GIOVANGASTONE far le sue delizie degli studi naturali? onde tanta fama ne venne a questa città per le grandi scoperte fatte co' suoi auspici. E non è forse famoso per simile filosofica magnificenza anco l'avo suo materno Gastone di Francia? Molti di voi an conosciuto e conversato il Conte Lorenzo Maga-

Magalotti, e l'erudita sua delicatezza, e la vasta dottrina anno ammirata, il cui sapere nelle più recondite e più minute particolarità dell'istoria naturale anco dell'Indie e dell'America non par che punto diminuisse il pregio dell'altre grandi e rare sue qualità. Nè debbo io tacere del senator Filippo Buonarroti uno certamente de' maggiori uomini che prodotto abbia il nostro paese, la cui perdita fatta, non ha molto, fu deplorabile a tutti per la sapienza e probità sua singolare, ma principalmente alla Società nostra della quale ei fu uno de' fondatori e per la quale mostrava grandissimo zelo approvando molto il pensiero che fin d'allora da alcuni di voi formato s'era di comprendere ne' vostri studi non solo la botanica ma tutta la fisica. Voi vi ricorderete quanto egli era e perito ed amante della naturale istoria e quanto sagace nel giudicare dell'altrui ipotesi e de' racconti, nel non credere ai quali troppo buonamente, consistono come disse quel Greco i fondamenti e gli articoli della sapienza. La qual mia rispettosa menzione di sì grand' uomo io brama che insieme sia un tenue monumento della mia privata venerazione del suo merito, e della nostra amicizia, e servami d'autorità per provare che lo studio delle cose naturali non disconviene ne alla nobile condizione ne alle occupazioni del governo e può unirsi ad una vastissima erudizione e d'istoria e d'antiquaria la quale ognun sa che ei possedeva sopra ogn' altro mortale.

Tra' viventi poi se il solo esempio di molti di voi medesimi non bastasse, che adorni delle dignità più illustri non avete sdegnato per questo d'essere ascritti nella nostra società, io saprei scegliere tra' più insigni personaggi dell'Europa alcuni nomi famosi non meno per l'arti del governo e della guerra che per l'istoria e filosofia naturale ch'ei non solo amano ma interamente posseggono.

Dietro a sì bella scorta applicando voi o nobili e virtuosi ascoltatori i vostri sensi e l'vostro intelletto allo studio delle cose naturali, e congiugnendo il sagace e solido ragio-

namento del Galileo, del Torricelli, del Neuton alla diligenza e facilità maestosa ed ingenuo candore del Malpighi e del Redi, voi potrete molto giovare a voi medesimi e altrui colle vostre scoperte, le quali purchè sien vere non saranno mai sterili di buone conseguenze, e potrete insieme svegliando in voi la filosofica curiosità molto accrescere i vostri diletti, e più che con qualunque altro studio contribuire alla tranquillità dell'animo vostro, ed alla perfezione del vostro sapere, e così potrete più godere delle vostre ricchezze. Occupazione non solo innocente ma gloriosa e che vi renderà imitatori degli eroi più illustri. A questo così nobile scopo non era mai possibile di pervenire altramente, che prendendo la valorosa risoluzione che ora io vi veggo pronti ad eseguire cioè di far risorgere nella nostra città, una conversazione filosofica da alcune leggi diretta. Se la famosa accademia del Cimento si fosse mantenuta, e la successione di quei grandi ingegni che la fondarono non si fosse interrotta, voi non avreste dovuto avere il pensiero di formar queste leggi. Ma poichè io non so per qual fato quella gloriosa adunanza fu poco durevole, benchè coll'operato da lei in pochi anni si sia acquistata fama immortale, tempo era omai che i gentili spiriti vostri punti dal desiderio della lode e dall'amore della verità, non più si contentassero della sola botanica, ma giacchè per lo studio di essa voi vi trovavate uniti in un corpo, il vecchio nome di società botanica con prudente modestia ritenendo, nè quello studio utilissimo però abbandonando, molto opportunamente avete ora estese le vostre intenzioni a tutta la naturale istoria e a tutte le parti della fisica, soggetto molto più confacevole alla varietà degl'ingegni e per la multiplicità delle osservazioni molto ancora più utile.

Io per dir vero negar non voglio che anco in solitario studio possa alcuno diventar gran filosofo e far di belle e importanti scoperte, ma l'esperienza ha mostrato che avvenendo ciò molto di rado per produrre notabil progresso vi ab-

biso-

-bisogna il lento corso di molti secoli, ove al contrario l'abilità congiunte di molti e dirette ad un sol medesimo scopo per volta anno in meno di cent'anni oltre ogni paragone moltiplicate le notizie scientifiche e condotta con mirabile prontezza la natural filosofia in questo presente floridissimo stato.

Ma perchè l'aumento del sapere nell'intelletto di pochi privati non contribuisce tanto al pubblico bene quanto il rendersi comuni a tutto il popolo se possibil fosse le palpabili verità, non altro che male potendo nascere dalla falsità e dall'errore, ardisco asserire che l'ottimo modo di sparger le cognizioni naturali, giacchè le altre accademie che adornano questa città sono ad altro scopo diretta, si è la stabilire una società come questa vostra che con generosa accoglienza ammetterà allo spettacolo delle sue ostensioni ogni dilettante del vero. Del qual vero essendo invincibile la forza e l'attrattiva su gli animi umani mi giova il presagire che tutti vi daran lode per questo e vi averan gratitudine.

Ne sembra essere questa vostra una molto difficile impresa poichè non vi mancano prudentissime leggi le quali avete già fatte, ne manca a queste leggi l'autorità essendo elleno state approvate di comune vostro consenso, e sperandosi ch' elle sieno per essere confermate e protette dal nostro real sovrano che d' ogni autorità e d' ogni impero è appresso di noi principio e cagione. E poichè secondo l'ingegnosa riflessione di Demostene a tutte le cose vi bisognano denari, godendo la società un assegnamento dal sovrano per mantenere il giardino, non è impossibile che eseguendo le disposizioni intorno a ciò fatte, e per la prudenza e integrità di chi l'amministra, ella abbia dal suo proprio erario onde fornir talora a qualche esperienza da farsi. E benchè la privata contribuzione de' socii per disposizione delle nostre leggi debba essere affatto spontanea, non dee però crederfi che molti di loro che ricchi sono vedendo il progresso ed il bisogno de' nostri studi non sieno per benignamente promovergli.

Non vi manca nemmeno l'ingegno e la dottrina e l'industria de' socii che intraprendano colle loro esperienze o col solido ragionamento ad illustrare vie più l'ampilissimo studio della fisica. Ed a questo fine si propone la società di ricevere con istima e gratitudine tuttociò che piacerà a' belli ingegni fuori di essa di comunicarle purchè sia coerente col suo già noto disegno.

Ma siccome le nostre leggi lasciano anco sopra il numero delle produzioni da farsi una intera libertà a ciascheduno è molto probabile che la maggior parte delle osservazioni ed esperienze saranno comunicate da coloro, o sien socii od estranei, che per la loro mediocre fortuna costretti sono a professare popolarmente qualche parte della natural sapienza. A i quali poichè la società ancor nascente non può dare altro premio voi ben vedete che giusto è che almeno per voi non manchi loro la lode, della quale i buoni ingegni più che d'altra ricompensa sogliono essere avari. Ed è giusto altresì che mentre ei si applicano a preparare le filosofiche dimostrazioni che devono essere il principal negozio delle vostre adunanze, voi non permettiate che occupino intanto il vostro favore, con arti lusinghiere coloro che mai virtù non conobbero ne vollero, e che anzi cercano d'insinuare nelle menti dell'incanta moltitudine, che all'esercizio delle arti e principalmente della medicina nuoca il sagace ingegno, il lungo studio, e quell'amore che fa cercare con tanto tedio la verità nella non fallace reiterata esperienza.

Al quale falso e malefico sentimento se voi non vi opponete efficacemente bisogna tralasciare ogni speranza di stabilir giammai tra di voi una filosofica famiglia, poichè è stato sempre uno de non ultimi pregi della nobilissima arte della medicina, che i suoi alunni come osserva un nobile e famoso politico, abbiano sostenuta in gran parte la buona e bella letteratura, e totalmente la naturale scienza, che senza di loro si sarebbe certamente perduta. Io non so poi
con

con quanta vostra lode seguirebbe, che mentre le accademie delle scienze con tanto fervore si coltivano, io non dirò solamente ne' beati regni di Francia e d' Inghilterra e tra' potenti popoli del settentrione, ma in alcune Italiche città ancora, alle quali forse la nostra in altri pregi non cede, in lei sola onde avuta anno origine tante insigni scoperte nella terra e nel cielo, non potesse condursi a fine una sì onorata e per tanti capi sì laudevole impresa.

*L'onore che voi m' avete destinato di tessere l' istoria delle produzioni della vostra diligenza e dottrina negli studi naturali, e di pubblicare per comune utilità ciò che sarà più nuovo e più considerabile, e quella cortese fiducia che voi vi degnate avere nelle mie tenui forze, per contribuire al vostro pensiero, mi costituiscono al presente nel dovere di promettervi, che per me nessuno sarà defraudato della sua lode, e che alle fatiche vostre unirò sempre le mie, per quel poco di spirito che mi possono aver dato le Attiche e le Britanniche scuole, dalle quali io non mi vergogno d' aver cercato alcuna cosa apprendere, non altro scopo avendo che di poter-
vi piacere.*



*Syllabus AUCTORUM, quorum nomina in hoc Opusculo
brevioribus notis compendii causa citata sunt.*


- A**CT. *Ac. R. Sc.* Acta Academiae Regiae Scientiarum Parisiensis, seu Histoires, & Memoires de l'Academie Royale des Sciences, a Amsterdam in 12.
- Adv.** Petri Ponae, & Mathiae de Lobel, Adversaria nova Stirpium. Antwerp. 1575. in fol.
- Alp.** Exot. Prosperi Alpini de Plantis Exoticis Libri III. Ven. 1636. in 4.
- Ambros.** Hyacinthi Ambrosini Phytologiae, Partis Primae, Tomus Primus. Bon. 1666. in fol.
- Barr.** Iacobi Barrelieri, Plantae per Galliam, Hispaniam, & Italiam observatae: Opus post. edente Antonio de Jussieu. Paris. 1714. in fol.
- Barr. Ic.** Barrelieri Icones.
- Barr. Obs., & Inf.** in Barr. Barrelieri Observationes a D. Jussieu digestae.
- Bellucc.** H. Pis. Thomae Bellucci, Plantarum Index Horti Pisani, & Appendix Plantarum Florentinos Hortos ornantium Angeli Domini cura descripta. Florentiae 1662. in 8.
- Bocc. Mus. P. I.** Paolo Boccone, Museo di Fisica, e d' Esperienze. Ven. 1697. in 4.
- Bocc. Mus. P. II.** Paolo Boccone, Museo di Pianta rare. Ven. 1697. in 4.
- Bocc. Rar.** Pauli Bocconii, Icones, & Descriptiones Rariorum Plantarum, &c. Oxonii 1674. in 4.
- Boerb. Ind. Alt.** Hermannii Boerhaave, Index alter Plantarum, quae in Horto Academico Lugduno-Batavo aluntur. Pars I. & II. Lugduni Bat. 1720. in 4.
- Bot. Monsp.** Petri Magnol, Botanicon Monspelienſe; cum Appendice. Monsp. 1686. in 12.
- Bot. Monsp. Ap.** Appendix Botanicon Monspelienſis supradicta.
- Bot. Par.** Sebastien Vaillant, Botanicon Parisienſe, A Leide, & a Amsterdam 1727. in fol.
- Breyn.** Prodr. 1. Iacobi Breynii Prodrum primus Fasciculi Rariorum Plantarum. Gedani 1680. in 4.
- Brunf.** Othonis Brunfels, Herbarium, Tomi III. Argentinae 1539. in fol.
- Buxb. Cent.** 1. I. C. Buxbaum, Plantarum minus cognitarum Centuriae. Petropoli 1728. in 4.
- C. B. P. n.** Caspari Bauhini Theatri Botanici. Basil. 1671. in 4.
- C. B. Prodr.** Caspari Bauhini, Prodrum Theatri Botanici. Basil. 1671. in 4.
- Caes. & Caesalp. & Caesalp.** in Op. Andreae Caesalpini, De Plantis Libri XVI. Florentiae 1583. in 4.
- Caesalp. H. Sic.** Andreae Caesalpini, Hortus siccus, quem Ipse Alphonsus Tornabonio Episcopo Biturgienſi paravit; nunc vero apud DD. Pauli d'Alphonsi Patr. Flor. aservatur.
- Cam. Hort.** Ioachimi Camerarii, Hortus Medicus, & Philosophicus. Francof. ad Moenum 1588. in 4.
- Cast.** Castore Durante, Herbario nuovo. Ven. 1667. in fol.
- Clarici.** D. Bartolomeo Clarici, Istoria, e Cultura delle Pianta, &c. Op. Post. Ven. 1726. in 4.
- Clus. Hist.** Caroli Clusii, Rariorum Plantar. Historia. Antwerp. 1601. in fol.
- Col. Part. I.** Fabii Columnae, Minus Cognitarum Rariorumque, &c. Plantarum Florentinos Romae 1616. in 4.
- Col. Part. II.** Fabii Columnae, Minus Cognitarum Stirpium, Pars altera. Romae 1616. in 4.
- Comm. Rar.** Io. Commelini, Horti Medici Amstelodamenſis Rariorum Plantarum Descriptio, & Icones Op. Post. Amstel. 1697. fol. Item Caspari Commelini, Horti Medici Amstelodamenſis, Rariorum Plantarum Descriptio, & Icones, Pars altera. Amstel. 1701. fol.
- Cord. Hist.** Valerii Cordi, Historiae Stirpium Libri IV. Argentinae 1561. in fol.
- Coroll. Inst.** R. H. Iosephi Pitton Tournefort, Corollarium Institutionum Rei Herbariae, ad calcem Institutionum R. Herb.
- Dill. Cat. Gif.** Io. Iacobi Dillenii, Catalogus Plantarum sponte circa Giffam nascentium; cum Appendice &c. Francof. 1719. in 12.
- Diosc.** Pedacius Dioscorides Anazarbaeus in Libris de Materia Medica. Significat autem Plantas, quas recentiores Botanici sibi visi sunt reperisse ex descriptis a Dioscoride.
- Dod. Pempt.** Remberti Dodonaei Stirpium Historiae, Pemptades sex. Antwerpiae 1616. in fol.
- Donn. Cat. Plant. H. Flor.** Angeli Domini, Appendix Plantarum Florentinos Hortos ornantium. Ad calcem

- cem Plantarum Indicis Horti Pisani Thomae Belluccii.
- Ferr. Flor. Cult.* Io. Baptistae Ferrarii e Soc. Ies. De Florum cultura, Libri IV. Romae 1633. in 4.
- Ferr. Hesp.* Io. Baptistae Ferrarii e Soc. Ies. Hesperides sive de Malorum Aureorum cultura, & usu, Libri IV. Romae 1646. in fol.
- Flor. Altdorf.* Mauricii Hoffmanni, Florae Altdorfinae Deliciae Sylvestres, sive Catalogus Plantarum in Agro Altdorfino sponte nascentium. Altdorf. 1677. in 4.
- Fuchs. Hist.* Leonh. Fuchsi, de Historia Stirpium Commentarii. Basil. 1542. in fol.
- Ger. Emac.* Iohn. Gerarde: The Herball, or generall Historie of Plantes very much Enlarged, and Amended by Thomas Iohnson. London. 1636. in fol.
- Hermann. H. L. Bat.* Pauli Hermannii, Catalogus Horti Academici Lugduno-Batavi. Lugduni Bat. 1687. in 8.
- H. Cathol.* Francisci Cupani, Hortus Catholicus cum Supplemento I. Neap. 1696. in 4.
- H. Cathol. Suppl.* Francisci Cupani, Horti Catholici Supplementum alterum. Panormi 1697. in 4.
- H. Mauros.* Antonii Titae, Catalogus Plantarum Horti D. Io. Francisci Mauroceni Sen. Ven. Patavii 1713. in 8.
- H. Pis.* Michaelis Angeli Tillii, Catalogus Plantarum Horti Pisani. Florentiae 1723. in fol.
- J. B. 1.* Historia Plantarum Universalis Auctoribus Iohanne Bauhino, & Io. Henrico Cherlero, a Dominico Chabraeo illustrata. Pars I. Ebroduni 1650. in fol.
- J. B. 2.* Ejusdem Operis, Pars altera. Ibidem 1651.
- J. B. 3.* Ejusdem Operis, Pars tertia. Ibidem 1651.
- J. B. 3. App.* Ejusdem Operis Appendix ad calcem Tom. III.
- Just. R. H.* Iosephi Pitton, Tournefort Institutiones Rei Herbariae, cum Appendice, & Corollario. Paris. 1700. in 4. Vol. 3.
- Just. in Barr.* Vide Barr. Obs.
- Lael. Triumf.* apud Fratrem. Vide Triumf. Obs.
- Lob. Ic. & Lob. Icon.* Icones Stirpium (ex Mathiae Lobelii, & Petri Perna Operibus desumptae, curante Christophoro Plantino Typogr.) Antuerpiae. 1581. in 4. transv.
- Lugd.* Historia Generalis Plantarum ab Io. Molinaeo, & Iacobo Dalecampio elaborata. Lugd. 1586. in fol. Vol. 2.
- Marc. Pedacii Dioscoridis Anazarbaei,* de Medica Materia Libri sex, Interp. Marcello Virgilio Secretario Florentino, cum eiusdem Annotationibus. Florentiae 1518. in fol.
- Matth. Valgrif.* 1559. Pietro Andrea Matthioli, Discorsi nelli sci Libri di Pedacio Dioscoride Anazarbeo della Materia Medicinale. Venezia appresso Vincenzio Valgrisi 1559. Fogl. Vol. I. Ital. cum parvis figuris.
- Matth. Valgrif. Cum Magnis Fig.* 1568. & *Matth.* 1568. Idem Opus. Venezia appresso Vincenzo Valgrisi 1568. cum magnis Fig. Vol. 2.
- Matth.* 1585. Idem Opus, ibidem apud Eundem in fol. pariter, & cum magnis fig. Vol. 2.
- Mem. Ac. R. Sc.* Vide Ac. Ac. R. Sc.
- Mentz. Pug.* Christiani Mentzelii Pugillus Rariorum Plantarum, ad calcem Indicis nominum Plantarum multilinguis. Berolini 1682. in fol.
- Michel.* Petrus Antonius Michelius. Significat Plantas quas variis Amicis communicavit, Vaillantio praefectum, Boerhaavio, & Tillio.
- Michel. Nov. Plant. Gen.* P. I. Petri Antonii Michelii Nova Plantarum Genera Pars I. Florentiae 1729. Typis Bernardi Paperini, in fol.
- Mont. Cat. Stirp. Agr. Ben. Prodr.* Iosephi Montii Catalogi Stirpium Agri Bononiensis Prodrum. Bon. 1719. in 4.
- Mor. H. R. Bles. & Mor. Prael. Bot.* Roberti Morison, Hortus Regius Blesensis auctus, sive Praeludiorum Botanicozum, Pars I. Lond. 1669. in 12.
- Mor. Umb.* Roberti Morison, Umbelliferarum Distributio nova. Oxonii 1672. in fol.
- Mor. Hist. Oxon. Part. 2.* Roberti Morison, Plantarum Historiae Universalis Oxoniensis, Pars Secunda. Oxonii 1680. in fol.
- Mor. Hist. Oxon. Part. 3.* Ejusdem Operis Pars tertia. Opus Post. Oxonii 1699. in fol.
- Munting. Phytograph.* Abrahami Muntingii Phytographia curiosa. Amstel. 1713. in fol.
- Park Theatr.* Iohn. Parkinson Theatrum Botanicum. London 1640. in fol.
- Plin.* C. Plinii Secundi, Historia Naturalis. Notat Plantas, quae eadem creduntur cum descriptis a Plinio.
- Pluk. Alm. Bot.* Leonardi Plukenetii, Almagestum Botan. Lond. 1696. in fol.
- Pon. Bald. Lat. Plantae,* seu Simplicia in Baldo Monte, & in Via ab Veroha ad Baldum a Io. Pona Pharmacopaeo

- paço Veronensi reperta, & edita. Basil. 1608. 4.
- Ponted. Anthol.* Iulii Pontederæ, Anthologia. Patav. 1710. 4.
- Raii Syll.* Io. Raii, Stirpium Europæarum extra Britannias nascentium Sylloge. Londini 1694. in 8.
- Raii Synops.* Ed. 1. Io. Raii, Synopsis Methodica Stirpium Britannicarum, Editio secunda. Lond. 1696. in 8.
- Raii Synops.* & *Raii Synops.* Ed. 3. Io. Raii, Synopsis Methodica Stirpium Britannicarum, editio tertia auctior, & emendatior. Londini 1714. in 8.
- Raii Meth. Plant.* Io. Raii Methodus Plantarum emendata, & aucta Londini 1703. in 8.
- Raii Hist. Tom.* 1. Io. Raii Historia Plant. Tomus prior. Londini 1686. in fol.
- Raii Hist. Tom.* 2. Eiusdem Operis Tom. II. Ibidem 1688. in fol.
- Raii Hist. Tom.* 3. Eiusdem Operis Tom. III. Ibidem 1704. in fol.
- Scheuchz. Agrost.* Io. Scheuchzeri, Agrostographia. Tiguri 1719. 4.
- Scheuchz. Agrost. Prodr.* Io. Scheuchzeri, Agrostographiæ Prodrômus. Tiguri 1708. in fol.
- Schbl. Bot.* Ios. Pitton Tournefort, Schola Botanica. Amstel. 1699. in 12.
- Tab. Ic.* & *Tabern. Icon.* Icones Plantarum (ex Iacobi Theod. Tabernæmontani, Historia Plantarum Idioma Germanico conscripta desumptæ) curante Nicolao Bassæo Typ. Francof. ad Moenum 1590. 4. transv.
- Theophr.* Theophrasti de Historia, & de Causis Plantarum. Significat autem Plantas, quæ eadem videntur cum descriptis à Theophrasto.
- Tournef. in Ab. Ac. R. Sc.* Nova Plantarum Genera ab Ios. Pitton Tournefort instituta, dans les Memoires de l'Academie Royale des Sciences.
- Trag.* Hieronymi Tragi, de Stirpibus Libri III. Argentor. 1552. in 4.
- Triumph. Obs. & Lael. Triumph.* apud Fratrem. Io. Baptistæ Triumphetti Observationes de Ortu, & Vegetatione Plantarum, cum Novarum Stirpium Historia Iconibus illustrata. Romæ 1699. 4.
- Triumph. Prael.* Io. Bapt. Triumphetti, Praeludium ad publicas Herbarum Observationes; & Novarum Stirpium descriptiones, & Icones. Romæ 1700. in 4.
- Vaill. in Ab. Ac. R. Sc.* & *Vaill. Nova Plant. Gen.* Nova Plantarum Genera à Sebastiano Vaillant instituta, dans les Memoires de l'Academie Royale des Sciences.
- Vign.* Dominici Vignae, Animadversiones in Libros de Historia, & de Causis Plantarum Theophrasti. Pisis 1625. in 4.
- Vir. Lust.* Gabrielis Grisley, Viridarium Lusitanicum. Ulyssip. 1666. in 4.
- Volk. Hesper. Norimb.* I. C. V. (Volkmæri) Hesperidum Norimbergensium Libri IV. Norimbergæ. 1700. in fol.
- Voyag. du Levant.* M. Pitton de Tournefort, Relation d'un Voyage du Levant fait par ordre du Roy. A Amsterdam 1718. Tom. II. Vol. I. in 4.
- Zannich.* & *Zannich. Hist.* Gio. Girolamo Zannichelli, Istoria delle Piantæ, che nascono ne' Lidi intorno Venezia, Op. Post. accresciuta, e pubblicata da Gian-Iacopo Figlio dell' Istesso. Venezia 1735. in fol.
- Zannich. Opusc. Bot.* Io. Hier. Zannichelli, Opuscula Botanica. Venet. 1730. 4.
- Zann.* Giacomo Zannoni, Istoria Botanica, Parte Prima. Bologna 1675. in fol.

Explicatio aliarum Notarum quibus quandoque usi sumus.

- D**escript. & Descript. Quod Descriptio nem tantum. Significat autem Plantas illas, quibus adiicitur, easdem videri eam descriptis ab aliquo Auctore, non vero eum depictis sub eodem nomine.
- Ic.** & **Icon.** Quod Iconem tantum. Significat Plantas illas, quibus adiicitur easdem esse eam depictis ab aliquo Auctore in Tabulis æneis, vel ligneis, non vero eum descriptis sub eodem nomine.
- Off.** & **Offic.** Officinarum. Significat autem nomina illa Plantarum, quibus apposita est, apud Scriptores Medicos, & Pharmacopocos usitatiora esse.
- Tab. Tabula.** Indicat Plantas, quæ ab aliquo Auctore pinguntur in Tabulis æneis.
- V.** & **Vulge.** Indicat nomina apud Vulgus communia, quorum pleraque à Scripturibus Medicis adoptata sunt.
- Quor.** Quorundam. Significat nomina illa à quibusdam Rei Medicæ Scripturibus usurpata.



CATALOGVS PLANTARVM HORTI FLORENTINI



ABROTANVM incanum & tomentosum maius, folio Delphinii reflexo, segmentis tortuosis, capitulis cernuis uno versu dispositis per basim acuminatis brevi petiolo appensis & squamis longioribus testis. *Abrotanum mas maximum Col. Part. 1. 54*

2. Idem minus, folio tenuiore, capitulis rotundis longiusculo petiolo appensis, squamis brevioribus & confertioribus testis

3. Abrotanum maius subincanum Camphoræ odorem spirans, Delphinii foliis surrectis, capitulis rotundis cernuis & unum latus spectantibus. *An Abrotanum mas angustifolium maius Inst. R. H. 459. * An Abrotano maschio Matth. 728. An Abrotanum Casalp. 478. Abrotanum mas usitatus Offic. Abroine vulgo*

4. Idem minus odoratum, foliis reflexis, segmentis crassioribus, capitulis maioribus. *An Abrotanum mas angustifolium minus Inst. R. H. 459*

5. Abrotanum Lini folio acriori & odorato *Inst. R. H. 459. * Dragone vulgo, aliquibus Targone Casalp. 563. Dragoncello Matth. 626. Dracunculus Hortensis Cast. Draco Herba Dod. Tarchon Gesn.*

ABSINTHIVM Ponticum seu Romanum officinarum seu Dioscoridis, foliis latioribus, capitulis maioribus. *Absinthium vulgare* Fuchf. Hist. 1. * Hoc & sequens in off. promiscue usurpantur pro *Absinthio* vulgari, communi, Romano, Pontico vero, & *Herba Medica*

2. Idem foliis & capitulis minoribus. *Assenzo* Matth. 723

3. *Absinthium* Ponticum tenuifolium incanum Inst. R. H. 457. * *Assenzo di Ponto* Matth. 724. *Absinthium Santonicum* Casalp. 476. *Assenzio Pontico* vulgo

ABSINTHIVM. vide **SERIPHIVM**

ABVTILON Inst. R. H. 99. * *Altea* ovvero *Abutilo* di *Avicenna* Matth. 976. *Altea Theophrasti* Casalp. 561. & 576

ACACIA Indica Farnesiana Inst. R. H. 605. * *An spina ex semine peregrino nata* Casalp. 322. *Gaggia* vulgo

2. *Acacia Americana* non spinosa, foliis *Viciae* multiflorae, floribus pallidis in spicam triunciale dispositis, siliqua palmari compressa & intorta. * *Ad arboris proceritatem excrevit hac Acacia, biemis incommoda perfectens. Eius folia* (Fig. 1.) *umiam plerumque longa, sesquilineam. lata, quamvis duplo vel triplo duplora, laeta splendentia, superne saturatius vibrantia, inferne dilutiora, in ambitu obscure dentata, costae simplici subirsuta alterno fere ordine innascuntur, nullo impari seriem claudente. Hae folia composita e sinu ramorum vetustorum prodeunt tria aut quatuor ut plurimum una cum florum spicis, in ramis autem recentibus alii costae simplici ex alternis nodis prodeunti adnectuntur decem ut plurimum, vel etiam quatuordecim, alterno pariter ordine, foliumque aliud maius componunt. Flores* (Fig. 2.) *e luteo virescentes, sesquilineam longi infundibuliformes stellae instar in sex lacinias obtusas divisi, quarum tres angustiores tribus latioribus interpositae, staminulis brevibus concoloribus, apicibusque citrinis donati, odore gravi, axi cuidam* (Fig. 3.) *triunciali viridi affiguntur nonnihil inter se distantes, & spicam laxam constituunt Salicis seminiferas spicas non male representantem, & e ramulorum nodis pendentem. Ex innumeris floribus, qui quotannis erumpunt, duo vel tres tantummodo fecundi sunt, siliquam nempe proferunt* (Fig. 4.) *palmarem compressam sesquilineam latam in maturitate fuscam. Anagyridis fatide siliquarum instar intortam & pendentem. Semina* (Fig. 5.) *Siliqua edulis seminibus similia sunt. Caudicis & ramorum vetustorum cortex rufus est, recentium vero viridis ut foliorum. Rami ipsi praelongi sunt, parum divaricati, ad terram incurvati & veluti depluentes, nullisque spinis armati. Figura 2. florem maiorem vero per microscopium representat. Siliquam (a tribus enim annis nullam Arbor ad maturitatem perduxit) pingendam nobis perhumaniter communicavit D. Nicolaus Gualterius ex immensa fructuum collectione quam in instructissimo suo Musco inter alia plurima pretiosaque cimelia asservat*

ACANTHVS sativus vel mollis Virgilii Inst. R. H. 176. * *Acantho* Matth. 710. *Acanthus vulgo Brancaursina* Casalp. 333

2. *Acanthus aculeatus* pinnis angustioribus ac venis albicantibus distinctis, floribus albis

3. *Acanthus minus aculeatus*, brevioribus & mollioribus spinis H. Pis.

ACER Platanoides Inst. R. H. 615. * *An Acer* Casalp. 42

2. *Acer*

2. Acer maior folio ampliore, fructu cum alis semiclausis
3. Idem folio & fructu minore
4. Acer maior, folio rotundiore minus laciniato (fructu cum alis semiclausis) an Opulus Italicorum. Inst. R. H. 615
5. Acer Campestre & minus Inst. R. H. 615. * *An Opulus Casalp. 42.* Pioppo. Oppio. Loppio *vulgo*
6. Acer trifolia Inst. R. H. 615

ACETOSA arborescens, subrotundo folio, ex Insulis Fortunatis Inst. R. H. 503

2. Acetosa montana maxima glabra, longo lato Ari folio, auriculis integris, flagellis ramosis, capsulis feminalibus breviter coronatis
3. Acetosa Hispanica maxima Munting. Phytograph. Fig. 7
4. Acetosa tuberosa radice Inst. R. H. 503
5. Acetosa pratensis Inst. R. H. 502. * *Oxalida Matth. 474. Hæc, & tres sequentes Acetosa in Offic. promiscue usurpantur pro Acetosa, Oxalide, & Oxalida*
6. Eadem serotina, foliis amplioribus, flagellis ramosis
7. Eadem foliis brevibus subrotundis glabris, flagellis ramosis seminiferis tantum
8. Acetosa hortensis, longo viridi angusto folio
9. Acetosa rotundifolia hortensis Inst. R. H. 503. * *An Oxalis tertia Casalp. 166. Acetosa Romana vulgo*
10. Acetosa arvensis lanceolata (repens, auriculis longioribus acutis) Inst. R. H. 503. * *An Oxalis prima, vulgo Acetosa Casalp. 166. Hæc, & due sequentes promiscue vocantur in Offic. Acetosa minor, lanceolata, sylvestris, & Oxalis ovina*
11. Eadem auriculis brevioribus. * *An Oxalida minore Matth. 475*
12. Eadem Alpina frutescens, foliis lanceolatis angustis, semine nudo exiguo & rugoso
13. Acetosa scutata repens Inst. R. H. 503
14. Acetosa Ocimi folio, Neapolitana Inst. R. H. 503

ACONITVM lycoctonum luteum Inst. R. H. 424. * *Aconito II. Matth. 1142. An Napelli alterum genus folio Platani Casalp. 585. Luparia. Napellus. Aconitum Offic.*

2. Aconitum cæruleum seu Napellus I. Inst. R. H. 425. * *Napello Matth. 1151. An Napelli genus alterum Casalp. 585*

ADATHODA Zeylanensium Inst. R. H. 175

AGRIMONIA Officinarum Inst. R. H. 301. * *Eupatorio Matth. 1068. Agrimonia Casalp. 319. Agrimonia. Eupatorio de' Greci Ric. Eupatorium veterum Offic.*

2. Agrimonia odorata Inst. R. H. 301. * *Pianta, che è la stessa in ogni sembianza, che l'Agrimonia volgare: ma ha odore, e sapore aromatico, e grato, come è l'Eupatorio de' Greci Ric. 38. Eupatorium odoratum, & Aromaticum Offic.*
3. Agrimonia Orientalis humilis, radice crassissima repente, fructu (crassiore) in spicam brevem & densam congesto Coroll. Inst. R. H. 21

AGRIMONIOIDES Inst. R. H. 301

ALATERNVS Inst. R. H. 595. * *An Phyllirea mas Theophrasti vulgo legno puzzo, & Putine Casalp.* 74

ALCEA Cannabina Inst. R. H. 98. * *Alcea Offic.*

2. *Alcea folio rotundo laciniato Inst. R. H. 98*

3. *Alcea Virginiana Ricini folio Boerh. Ind. Alc. Part. 1. 270. num. 9*

ALCHIMILLA vulgaris (præcox) floribus herbaceis C. B. Pin. 319.
* *An Stellaria Matth. 1236. Alchimilla, & Per Leonis Casalp. 557. Hac & sequens eius varietas in Offic. promiscue vocantur Alchimilla, Per Leonis, Stella herba, Stellaria*

2. *Eadem serotina*

3. *Alchimilla Alpina pubescens minor Inst. R. H. 508*

ALKEKENGII Officinarum Inst. R. H. 151. * *Solatro Halicacabo Matth. 1126. Vescaria Casalp. 213. Alchebengi Ric. Solanum Vescarium. Solanum Halicacabum Offic.*

2. *Alkekengi fructu parvo, verticillato Inst. R. H. 151. * Solanum somniferum Casalp. 214*

ALLIVM an montanum, capite rotundo Inst. R. H. 384

2. *Allium angustifolium, foliis intortis Inst. R. H. 385*

3. *Allium latifolium glabrum, floribus umbellatis albis, petalis subrotundis quinque lineas longis & tres latis*

4. *Allium pratense, radice Iridis, flore purpurascens Zannich. Hist. An Allium montanum maius foliis Narcissi splendentibus viridibus, floribus purpurascens C. B. Pin. 75*

ALNVS glutinosa folio viridi subrotundo ampliore leviter sinuato & dentato, fructu crassiore brevi. *An Alno Matth. 157. Ontano vulgo*

2. *Alnus non glutinosa, folio viridi subrotundo serrato*

ALOE folio in oblongum aculeum abeunte Inst. R. H. 366. * *Aloës alterum genus nuper ex India Occidentali advectum Casalp. 418. An Aloë Ric. Aloe nobis vulgaris. Fico d' India vulgo*

2. *Aloe vulgaris Inst. R. H. 366. * An Aloe Casalp. 417*

3. *Aloe caulescens, foliis spinosis, maculis ab utraque parte albicantibus notatis H. Pis. Tab. 10*

4. *Aloe Africana caulescens, foliis (magis) glaucis caulem amplectentibus (& in mucronem obtusorem desinentibus.) Comm.*

5. *Aloe Africana, floribus rubris, tenuissimis pediculis, folio plano, margaritifera H. Pis. Tab. 8*

6. *Aloe Africana brevissimo crassissimoque folio, flore candido H. Pis. Tab. 5*

ALSINANTHEMVM annuum subhirsutum maius, foliis brevioribus ex rotunditate acuminatis, floribus albis pentapetalis, petalis subrotundis & integris semilineam longis, capsula duriori. *Alsine minor Lini capitulis C. B. Pin. 151. An Alsine petraea minima Tabern. Icon. 710*

2. Idem

2. Idem minus petalis trientalibus, capsula molliori. *Alsine multicaulis* C. B. Pin. 250. *Alsine minima* I. B. 3. 364. *descript.* Ic. vero *vid.* pag. 348. *sub flore Cuculi.* *Alsine minor* Tabern. Icon. 708

- ALSINE altissima nemorum Inst. R. H. 242. * *Morsus Gallinae maior* Brunf.
 2. *Alsine montana latifolia*, flore laciniato Inst. R. H. 242
 3. *Alsine media vulgaris*, calyce villosa. *Alsine media* C. B. Pin. 250. Inst. R. H. 242. *Alsine vulgaris*, sive *Morsus Gallinae* I. B. 3. 363. *Morsus Gallinae* Trag. 385. *Alsine maior* Fuchf. 21. *Alsine* Matth. 1172
 4. Eadem calyce glabro. *Alsine media* Tabern. Icon. 707. *Alsine minor* Dod. Pempt. 29. *Alsine Matthioli* Lugd. 1212. *Alsine minor recentiorum*, sive *Hippia minor* Lob. Icon. 460. *Alsine* Cast. 19
 5. *Alsine media*, foliis minoribus * *He tres Alsinæ media species promiscue usurpari possunt pro Alsine & Morsu Gallinae.* Offic.
 6. *Alsine pratensis* Gramineo folio ampliore Inst. R. H. 243
 7. *Alsine pratensis* Gramineo folio angustiore Inst. R. H. 243
 8. *Alsine an aquatica media* Inst. R. H. 243
 9. *Alsine annua rotundifolia* glabra multicaulis & multiflora, floribus pentapetalis fugacibus & vix conspicuis, petalis lanceolatis semilineam longis, calycis foliolis introrsum cucullatis, extrorsum in costam elevatis. *Paronychia altera* Matth. 1096. Lugd. 1213. * *Paronychia* Offic.
 10. *Alsine maritima*, sive *Spergula marina* maior perennis, foliis angustis succulentis unum latus spectantibus, flore pentapetalo purpurascente, petalis subrotundis & integris, semine fusco compresso, margine foliaceo aucto. * *Spergula* Offic.
 11. *Alsine Spergulae facie media* Inst. R. H. 244
 12. *Alsine Alpina repens*, capillaceo folio, floribus solitariis albis pentapetalis pediculo longo fultis, petalis subrotundis & integris
 13. *Alsine tenuifolia* Inst. R. H. 243
 14. *Alsine minima*, flore fugaci Inst. R. H. 243
 15. *Alsine minima perennis repens* glabra, capillaceo folio non ita angusto, flore herbido maiusculo tetrapetalo, petalis vix conspicuis & integris, fructu orbiculato. *Alsine pusilla*, Graminea, flore tetrapetalo Inst. R. H. 243
 16. *Alsine quæ saxifragia Bavarica* Pon. Bald. Lat. 60

ALTHÆA Dioscoridis, & Plinii Inst. R. H. 97. * *Althæa* Matth. 975. *Vismalva quasi Malva viscida* Casalp. 561. *Altea* Ric. *Althæa*. *Bismalva*. *Ibiscus*. *Malvaviscus* Offic.

2. *Althæa Dioscoridis & Plinii*, folio magis angulato Inst. R. H. 97
 3. *Althæa subincana*, caule præalto imbecilliori seu vix se sustinens, foliis magis laciniatis ac serratis, flore purpureo parvo, segmentis obtusis veluti cordatis, capsula seminum crassiore glabra & rugosa. *An Althæa profunde serrato seu dentato folio* I. B. 2. 955

ALYSSOIDES incanum, foliis sinuatis (flore luteo, petalis bifidis, fructu rotundo) Inst. R. H. 218

2. Idem fructu oblongo
 3. *Alyssoides alpinum fruticosum sempervirens*, folio Leucoii viridi ad margines piloso aut barbato, floribus spicatis luteis, calyce auriculato, fructu

8u subrotundo, semine latissimo. *Alysson alterum* Cæsalp. H. Sicc. pag. 201. num. 555

ALYSSON Creticum saxatile foliis undulatis incanis Corollar. Inst. R. H. 15

2. Alysson perenne incanum Leucii folio, flore luteo, fructu obtuso & veluti cordato D. Leonardi Sesler Medici, & Philobotani Veneti

3. Alysson vulgare, Polygoni folio, caule nudo Inst. R. H. 217. * *An Humilis quedam herbula affinis Bursæ Pastoris* Cæsalp. 366. *Paronychia vulgaris* Dod.

4. Alysson Veronicæ folio Inst. R. H. 217

AMARANTHOIDES Lychnidis folio, capitulis argenteis maioribus Inst. R. H. App. 654

2. Amaranthoides Lychnidis folio, capitulis purpureis Inst. R. H. App. 654

AMARANTHVS folio variegato, colore hilariori, qui fœmina Inst. R. H. 236. * *Maraviglie di Spagna vulgo*

2. Amaranthus folio variegato, colore obscuriori, five mas Inst. R. H. 236. * *An Bliti peregrini alterum genus* Cæsalp. 162

3. Amaranthus Indicus spinosus spica herbacea Inst. R. H. 236

4. Amaranthus panicula incurva lutea Inst. R. H. 236

5. Amaranthus simplici panicula Inst. R. H. 235. * *Amaranto. Sciamatro. Fior velluto vulgo*

AMBROSIA maritima Inst. R. H. 394. * *An Ambrosia Herbariorum* Marc. 205. *Ambrosia* Cæsalp. 158. *Ambrosia. Ambrosiana* Offic.

AMMI maius Inst. R. H. 305. * *Ammi* Offic.

2. Ammi perenne Inst. R. H. 305. * *Cribamo* III. Matth. 521. *Eryngium arvense* C. B.

AMYGDALVS Indica nana Inst. R. H. 627

ANACAMPSEROS maxima, suaverubente caule, foliis coniugatis latissimis longioribus subcinereis & circumrosis, floribus umbellatis pallidis. *An Anacampseros maxima* Inst. R. H. 264. * *Hæc, & sequens in Offic. vocantur Crassula maior, Telephium, Herba S. Ioannis*

2. Eadem atrorubente caule, foliis viridibus. *An Anacampseros Lusitanica Hematodes, maxima* Inst. R. H. 264

3. Anacampseros minor, rotundiore folio, sempervirens Inst. R. H. 264. * *Telephium minus* Offic.

ANAGALLIS phœniceo flore Inst. R. H. 142. * *Anagalide Mascbio* Matth. 656. *Anagallis flore puniceo* Cæsalp. 262

2. Anagallis cæruleo flore Inst. R. H. 142. * *Anagalide femina* Matth. 657. *Anagallis flore cæruleo elegantissimo* Cæsalp. 262. *Anagallide, che fa il fiore azzurro* Ric.

ANAGYRIS fœtida Inst. R. H. 647. * *Anagyris* Cæsalp. 112

AN-

ANDROSAEMVM maximum frutescens (foliis maioribus subrotundis) Inst. R. H. 251. * *Androsamum a recentioribus Chirurgis Matrisylva appellatum Casalp.* 395. *Herba Siciliana Tab. Clymenon Plinii Ang. Periclymenon Dioscoridis C. B.*

2. Idem foliis oblongis minoribus. * *An Androsamo Matth.* 988

ANEMONE Geranii rotundo folio purpurascens Inst. R. Herb. 276

2. Anemone Virginiana Inst. R. H. 277

3. Anemone latifolia, Pavo dicta, major, prima Inst. R. H. 275

4. Anemone tenuifolia, flore amplo sanguineo hexaphyllo Inst. R. H. 278

5. Anemone tenuifolia, flore niveo Inst. R. H. 278

6. Anemone tenuifolia, flore simplici phœniceo Inst. R. H. 279

7. Anemone tenuifolia, floribus dilute violaceis, viridi colore & rubore perfusis Inst. R. H. 281

8. Anemone tenuifolia multiplex rubra Inst. R. H. 282

9. Anemone tenuifolia multiplex, magno flore violaceo & rubente colore mixto Inst. R. H. 283

10. Anemone foliosa, flore suaverubente multiplici Inst. R. H. 283

11. Anemone sylvestris alba maior Inst. R. H. 277

ANEMONOIDES. vid. RANUNCULVS

ANEMONOSPERMOS Afra folio & facie Taraxaci incani Boerh. Ind. Alt. H. L. Bat. Part. I. Pag. 100. n. 5

ANETHVM hortense Inst. R. H. 318. * *Anetho Matth.* 799. & *Ric. Anethum sativum Casalp.* 283. *Anethum Offic.*

2. Anethum verum Pernambuccense Boerh. Ind. Alt. Part. I. pag. 65

ANGELICA sylvestris minor, sive erratica Inst. R. H. 313. * *Hac & sequens, Angelica erratica seu sylvestris, Herba Gerardi, & Podagraria in Officinis promiscue vocantur*

2. Eadem latifolia

3. Angelica Alpina ad nodos florida Inst. R. H. 313

4. Angelica montana perennis, Paludapii folio Inst. R. H. 313. * *An. Levistico vulgare Matth.* 815. & *Ric.* 46. *Ligusticum. Levisticum. Libyflicum Offic.*

ANONIS legitima antiquorum Coroll. Inst. R. H. 27. * *Ononis Marc.* 164. *Anonide Matth.* 711. *Ononis vulgo Bonaga & Bulimaca Casalp.* 243. *Resta Bovis Trag. Remora Aratri Ambr. Anonis Offic. Bulimacola vulgo*

2. Anonis non spinosa, caulibus procumbentibus Inst. R. H. 408

3. Anonis viscosa minor flore pendulo C. B. Pin. 389. Prodr. 156. * *Anonis odore Theriacæ Bellucc. H. Pis.*

ANTHEMIS Italica arvensis annua maior vulgatissima, flore maximo, disco pungente Michel. Nov. Plant. Gen. pag. 32. vers. 1. * *Cota vulgo sive Cotula foetida Casalp.* 492. *Pro Camomilla Offic. a quibusdam usurpatur*

2. An-

2. *Anthemis arvensis* annua patula, modo odora, modo inodora, modo foetida, folio glabro, capitulis & ramulorum extremitatibus crassioribus Michel. Nov. Plant. Gen. pag. 32. v. 3. Tab. 30. fig. 2

3. *Anthemis hortensis* repens odorata, flore luteo, semiffosculis concoloribus & vix conspicuis Michel. Nov. Plant. Gen. pag. 33. v. 7. *Chamamelum luteum capitulo apophyllo* C. B. Pin. 135. * *Chamamelum odoratum* Offic. Erba Appiolina vulgo

ANTIRRHINVM Ligustri folio, flore candido, labio inferiori circa rictum luteo, superiori vero lineis sanguineis variegato. * *Os Leonis floribus candidis* Casalp. 350

2. *Antirrhinum Leucoii* folio, flore candido, labio inferiori circa rictum pallido

3. *Antirrhinum vulgare* Leucoii folio, flore purpureo Inst. R. H. 168. * *Antirrhinum* I. Matib. 1255. *Os Leonis floribus roseis* Casalp. 350. Bocca di Leone vulgo

APARINE vulgaris annua maior asperrima, spinulis tum in caulibus tum in foliorum marginulis deorsum reflexis, flore albo, fructu hispido spinis hamatis instructo. *Aparine vulgaris* C. B. Pin. 134. * *Aparine* Matib. 852. *An Aparine vulgo Asprella* Casalp. 324

2. *Aparine* annua minor præcox, spinis in caule deorsum, in foliorum marginibus transversim aut sursum inclinatis, flore albo, fructu villis aduncis exasperato

3. *Aparine* semine lævi Inst. R. H. 114

4. *Aparine* semine Coriandri saccharati Inst. R. H. 114

5. *Aparine* minima Bor. Momp. App. 291

APARINE. vid. RVBEOLA

APHACA vulgaris flore luteo, siliquis crassioribus & brevioribus, semine albo aut subcinereo lituris nigris distincto. *Aphaca altera semine albo, nigris maculis notato* Vir. Lust. *Aphaca semine vario* Casalp. 236. *Aphaca semine variegato* I. B. 2. 217. Descript.

APIVM hortense latifolium Inst. R. H. 305

2. *Apium hortense* seu *Petroselinum* vulgo Inst. R. H. 304. * *Apio Hortense*, *Petroselino* Matib. 811. *Appio vulgare detto Prezzemolo* Ric. *Apium* Offic.

3. *Apium Macedonicum* Inst. R. H. 305. * *Petroselino Macedonico* Matib. 813. & Ric. *Petroselinum Macedonicum* Offic.

4. *Apium Pyrenaicum* Thapsiæ facie Inst. R. H. 305

5. *Apium palustre latifolium erectum*, ad alas floridum * *An. Apium aliud spontaneum latifolium, umbellis in foliorum alis* Casalp. 299. *Apio Palustre* Ric. *Paludapium*. *Eleoselinum* Offic.

6. *Apium dulce*, *Celeri* Italicorum Inst. R. H. 305. * *Sedano* vulgo

APOCYNVM erectum latifolium incanum Syriacum, floribus parvis obsolete purpurascens Inst. R. H. 91

2. Idem foliis amplis subrotundis

3. Apocynum erectum Africanum, villosa fructu, salicis folio glabro angusto Inst. R. H. 92. * Lino d' India *vulgo*

4. Apocynum sarmentis crassioribus & excelsas arbores scandentibus, foliis rotundis glabris & glaucis, floribus candidis ad foliorum alas umbellatim nascentibus, fructu An Apocynum folio subrotundo Inst. R. H. 92. * An Periploca non repens *Casalp.* 119

AQVILEGIA hortensis simplex, flore incarnato Inst. R. H. 428

2. Aquilegia sylvestris Inst. R. H. 428. * Aquilina *Matth.* 665. An Aquilegia, & Columbina *Casalp.* 589

3. Aquilegia hortensis multiplex, flore magno caeruleo Inst. R. H. 429

ARBUTVS folio serrato (fructu rotundo) Inst. R. H. 592. * Arbutus *Matth.* 291. Arbutus cuius fructus Avellanae magnitudinem non excedit *Casalp.* 113. Vnedo *Lob.* Corbezzolo *vulgo*

ARISARVM latifolium alterum Inst. R. H. 161. * Arisarum *Matth.* 632. Arum parvum *Casalp.* 227

2. Arisarum Angustifolium Dioscoridis forte, corniculo purpurascens C. B. Pin. 197

ARISTOLOCHIA Clematidis recta Inst. R. H. 162. * Aristolochia, o Aristologia longa *Matth.* 685. Aristolochia tenuis, vel Clematidis, vel Saracenica *Offic.* Aristologia Clematide *Nostrale Ric.*

2. Aristolochia rotunda flore ex purpura nigro Inst. R. H. 162. * Aristolochia I, o Aristologia rotunda *Matth.* 684. Aristologia genus primum *Casalp.* 566. Aristologia rotunda *Ric.* Hac & sequens in *Officinis* promiscue usurpantur pro Aristolochia rotunda

3. Eadem praelongo angusto flavescente flore, lingua ex purpura nigricante. An Aristolochia flore ex albo purpurascens Inst. R. H. 162

4. Aristolochia Pistolochia dicta Inst. R. H. 162

ARMENIACA fructu maiore rotundo, nucleo amaro * Hac & duae sequentes Mala Armeniaca etiam vocantur, & Albicocche *vulgo*

2. Eadem fructu oblongo

3. Armeniaca Mala minora Inst. R. H. 624

ARTEMISIA vulgaris caule atro purpureo, ramis floriferis expansis, capitulis cernuis. An Artemisia vulgaris maior, caule & flore purpurascens Inst. R. H. 460. * Hac, & duae sequentes promiscue usurpari possunt pro Artemisia *Officinarum*

2. Eadem caule ex viridi albicante capitulis surrectis * An Artemisia vulgaris, quae a quibusdam Canapasia vocatur *Casalp.* 478

3. Eadem caule ex viridi albicante, ramis floriferis surrectis non expansis, capitulis erectis

4. Artemisia Italica elatior, Delphinii folio viridi, inodora *Vaill.* A& Ac. R. Sc. Ann. 1719. pag. 378. num. 24

ARVM Americanum Ari vulgaris facie, foliis carnosius obscure virentibus lucidis, in uncialem teretem & inermem aculeum desinentibus. An Arum, *TAB. II.*

Americanum folio angustiori nervoso sagittato molliori, apice acutissimo Boerb. Ind. Alt. H. L. Bat. Part. 2. 74. num. 11

Pulcherrimam hanc plantam Michelio communicavit Illustrissimus D. Comes Ioseph. Zinanius Prosperi fil. Ravennas, qui inter cetera quibus commendandus est animi sui ornamenta, paucis ab hinc annis ad Rerum Naturalium ac Plantarum presertim studium applicare cepit animum, adeoque sedulus & diligens fuit ut Ravennae privatum hortum selectissimarum plantarum copia instructissimum iam habeat; magnam preterea apud eruditos gratiam promeritus sit ob editas observationes suas circa locustas, & diversarum avium ova nidosque. Hoc igitur Arum in hortum Florentinum translatum primum floruit ineunte Maio anni 1737. Flor crasso longo rectoque pediculo insidens supra foliorum comam eminebat: Petalo (si tamen ita appellandum est) carnosso ovali oblongo constabat intus candido exterius e viridi albicante, cuius una extremitas petiolo affixa & arte complicata erat, deinde vero sensim sensimque dilatabatur adeo ut cyathum conicum referret, margine ex una parte productiore Aristolochiae Clematitidis florum instar, & in oblongum mollemque aculeum abeunte. Pistillus Ari vulgaris forma & magnitudine e fundo floris surgebat. Fructus observare non licuit, cum Flos ab imperito quodam decerptus intempestive fuerit

2. Arum vulgare non maculatum Inst. R. H. 158. Arum. Aron Offic. Gichero vulgo ut & tres sequentes

3. Arum maculatum maculis candidis Inst. R. H. 158. * Aro Matth. 624. Gicherum maculis candidis Casalp. 226

4. Arum maculatum maculis nigris Inst. R. H. 158. * Gicherum maculis nigris Casalp. 226

5. Arum minus maculis amplioribus albidis, & maculis nigris perexiguis notatum

6. Arum Ægyptiacum florigerum & fructum ferens, radice magna orbiculari Inst. R. H. 159. * Colocasia Marc. 118. Aro d' Egitto Matth. 450. Aron magnum Casalp. 227. Faba & Lotus Ægyptia quorundam

ARVNDIO sativa, quæ Δίαξ Dioscoridis & Theophrasti Inst. R. H. 526. * Harundo Marc. 55. Canna Matth. 164. Calamus sive Harundo crassa Casalp. 186. Canna vulgo

2. Arundo maxima, & hortensis, radice crassa & pinguiore, ex Monte Argentario proveniens, pro Cinæ radice usitata H. Pis.

3. Arundo vulgaris sive φαρμακία Dioscoridis Inst. R. H. 526. * Canna Palustre Matth. 165. Calamus seu Harundo alia gracili calamo Casalp. 186

4. Arundo variegata angustifolia * An Canna vel Arundo tota nivea & foliis & caule Mentz. Pug. quam in hoc ipso horto Florentino observavit

5. Arundo semisarta Rheni Bononiensis Plinii Mont. Cat. Stirp. Agr. Bon. Prodr. 32. * Harundo Rheni Bononiensis sarta Plinii Casalp. 187

6. Arundo sarta Vallium Ravennae Mont. ibid.

ASARVM Inst. R. H. 501. * Asarum Matth. 40. & Ric. Asarum Casalp. 389. Baccaris, Valgago, Perpena, Nardus Rustica, Sanguis Martis Franc.

ASCLEPIAS albo flore Inst. R. H. 94. Vincetossico Matth. 855. Asclepias Casalp. 269. Asclepias. Vincetoxicum. Hirundinaria Offic.

2. Asclepias flore albo, umbilico atropurpureo

3. Ascle-

Horti Florentini

I I

3. *Asclepias nigro flore* Inst. R. H. 94
4. *Asclepias Africana Aizooides* Inst. R. H. 94

ASPARAGVS *fativa*, foliis tenuissimis sparsis, flore longiore * *An Asparago* Matth. 505

2. Eadem foliis crassioribus non ita sparsis, flore brevior. *Asparagus fativa* Inst. R. H. 300. Tab. 154. A. * *Hæ duæ Asparagi species promiscue usurpantur pro Asparago Offic. & Sparagi Ric.*

3. *Asparagus sylvestris*, tenuissimo folio (fructu crassiore) Inst. R. H. 300. * *Asparago saluatico* Matth. 506

4. Eadem fructu parvo. * *An Asparagi genus tertium* Casalp. 217

5. *Asparagus foliis acutis* Inst. R. H. 300. * *Asparagus* Casalp. 217. *Asparagus petraeus*. *Corruda* C. B. Pin. Spazzole vulgo

6. *Asparagus Africanus scandens Myrti folio angustiore* H. Pis.

ASPHODELVS *maritimus maximus*, radice *Buxea* ferme insipida, foliis sesquiunciam latis, caule ramoso, floribus albis, fructu exiguo, semine cinereo nigris maculis distincto. *Asphodelus in Maritimis caule nudo ramoso, floribus candidis, radicum bulbulis interna parte croceis* Casalp. 415

2. *Asphodelus montanus maior*, radice fervida cum bulbulis externe albidis, interne buxeis, caule ramoso & non ramoso, foliis unciam latis, floribus albis, fructu rotundo crassiore, semine cinereo nigris maculis distincto. *Asphodelus in Alpibus, caule simplici, floribus candidis, fructu rotundo, magnitudine Faba* Casalp. 415. * *An Asphodelo* Matth. 634. *Hæ duæ Asphodeli species in Officinis promiscue vocantur Hastula Regia, Asphodelum, Asfodillum*

3. *Asphodelus Apulus albus ramosus minor*, foliis iunceis. * *An Phalangii alterum genus in Sicilia* Casalp. 416

4. *Asphodelus luteus & flore & radice* Inst. R. H. 343. * *Asphodelus luteus* Casalp. 416. *Asphodelo che fa i fiori gialli a modo di stella* Matth. 635

5. *Asphodelus Zeylanicus*, foliis rotundis cepaceis, floribus luteis H. Pis.

ASPLENIVM five *Ceterach* Inst. R. H. 544. * *Scolopendria* Marc. 213. *Cetrach* Casalp. 595. *Aspleno* Matth. 940. *Cetracca Ric.*

2. *Asplenium ramosum* Inst. R. H. 544. * *Lonchite aspera falsa* Matth. 974

ASTER *omnium maximus*, *Helenium diæus* Inst. R. H. 483. * *Elenio* Matth. 79. *Enula* Casalp. 499. *Enula, & Henula Ric. Enula Campana, & Inula Offic.*

2. *Aster luteus radice odora* Inst. R. H. 482. * *Incensaria* Casalp. 496

3. *Aster maritimus Salicis longo glabro auriculato ac subtilissime denticulato folio, floribus luteis, semiflosculis septem lineas longis & semilineam latis.* *An Aster montanus luteus Salicis glabro folio* C. B. Pin. 266. *Morif. Hist. Oxon. Part. 3. sect. 7. Tab. 21. fig. 10. Aster III. Austriacus II. Clus. Hist. XIII. * Aster Offic.*

4. Idem semiflosculis decem lineas longis, & semilineam latis

5. *Aster Montanus Italicus luteus, foliis brevioribus & rigidioribus serratis, floribus umbellatim compactis* Michel. H. Pis. *Helenium Spiræ folio* Vaill. Ac. R. Sc. Ann. 1720. pag. 392. num. 15. *Conyza media Monspeliensi affinis multiflora* L. B. 2. 1049

6. *Aster palustris luteus*, folio longiori lanuginoso Inst. R. H. 483. * *Bri-rannica* Lugd.
7. *Aster* III. *Pannonicus Clusii luteus*, folio hirsuto *Salicis* I. B. 2. 1047.
8. *Aster pratensis Autumnalis*, *Conyza* folio Inst. R. H. 482. * *Coniza mezzana* Matth. 920. *Asteraftico similis alter* Casalp. 496. *Mentha lutea* Lon. *Cunilago Plinii* C. B. *Conyza media* Offic.
9. *Aster maritimus* folio tereti crasso tridentato Inst. R. H. 483. * *Cri-thamo* III. Matth. 520
10. *Aster Novæ Angliæ altissimus hirsutus* (foliis *Salicis* caulem ample-xantibus) floribus omnium maximis purpureoviolaceis Inst. R. H. 482
11. *Aster maritimus palustris cæruleus Salicis* folio Inst. R. H. 481. * *Tri-polium* Offic.
12. *Aster Tripolii flore* Inst. R. H. 481. * *An Linaria Tripolii flore* Donn. Cat. H. Flor.
13. *Aster Virginianus ramosissimus serotinus*, parvis floribus albis Trade-scanti Moris. Hist. Oxon. Part. 3. 121. num. 43
14. *Aster Chenopodii folio flore ingenti specioso* H. Elth.

ASTERISCVS annuus, foliis ad florem rigidis Inst. R. H. 497. * *Vn al-tro Aster Attico* Matth. 1235. *Aster Atticus* Casalp. 495

2. Idem perennis. *Asteriscus perennis folio odorato, flore rigido* Michel. Boerb. Ind. Alt. H. L. Bat. 105
3. *Asteriscus annuus*, foliis ad florem rigidis, flore sulphurei coloris Inst. R. H. 497
4. *Asteriscus annuus aquaticus patulus* Inst. R. H. 498. *Astero Attico an-nuo odorato di Candia* Zann. 30

T A B. III. **ASTEROIDES** hirsuta latifolia Patavina (flore luteo, semisflosculis septem lineas longis sesquilineam latis, seminibus triangularibus brevissime coronatis ac binis plerumque aristis armatis) Michel. H. Pis.

T A B. IV. 2. *Asteroides Alpina subhirsuta*, *Salicis* folio longiore & acutiore, inter-dum nonnihil crenato, flore luteo, semisflosculis octo lineas longis & semi-lineam latis, seminibus sesquilinearibus brevissime coronatis ac longiuscula arista munitis. *Aster montanus saxatilis latens, angusto acuto nervoso & molli Plantaginis folio, multicaulis* Bocc. Mus. Part. 2. 31. Tab. 18

T A B. V. 3. *Asteroides Alpina glabra*, *Salicis* folio angusto peracuto, flore luteo, se-misflosculis novem lineas longis & semilineam circiter latis, seminibus longis altius coronatis, ac unica, interdum binis aristis armatis. *Asteriscus perennis, Salicis glabro folio* Vaill. act. Ac. R. Sc. Ann. 1721. pag. 430. *Asteroides Al-pina Salicis folio* Coroll. Inst. R. H. 50

In tribus histe *Asteroidum* Tabulis fig. a semina marginalia representat, que breviora sunt, pyramidata triangularia, facie qua calyci incumbunt latiore & gibba; valde item umbilicata, seu membrana quadam rigidiuscula & pellucida; non autem aristis villisque coronata. His semisflosculus b insidet. Fig. vero c exprimit semina que in disco sunt, longiora & angustiora, trian-gularia pyramidata, & varie in singulis speciebus coronata. d semisflosculus est ovo seu embryoni insidens. Semina qualibet inter se distinguuntur folio-lis & imbricatis in acumen rigidiusculum desinentibus ut in *Anthemide*. Omnia autem hac per microscopium ampliata sunt

ASTRAGALVS tuberosus scandens Fraxini folio Inst. R. H. 415

2. Astragalus luteus perennis procumbens vulgaris, sive sylvestris Inst. R. H. 416

3. Astragalus luteus annuus Monspeliacus procumbens Inst. R. H. 416

4. Astragalus luteus perennis, siliqua gemella rotunda vesicam referente Inst. R. H. 416. * *Ceci salvatici* Matth. 443

5. Astragalus Monspeulanus Inst. R. H. 416

6. Astragalus triangularis Munting. Phytograph. Tab. 110. *Scuridaca Sicula*, siliquis foliaceis Bocc. Rarior. Plant.

ASTRANTIA maior corona floris purpurascens Inst. R. H. 314. * *Veratrum nigrum*, & *Elleborus niger* Diosc. Gesn. *Sanicula femina* Fusch.

ATRIPLEX latifolia sive Halimus fruticosus Inst. R. H. 505. * *Halimus alter latiore folio* Casalp. 160

2. Atriplex maritima frutescens sempervirens, foliis Oleæ angustioribus & candicantibus, fructu cordato tuberculoso. *An Portulaca Marina fruticosa*. I. B. 1. 229. * *Hæc & sequens Portulaca Marina*, in Offic. vocantur

3. Eadem fructu levi. *Halimus primus*, tenuiori folio Casalp. 160. *Halimus Eiusdem* in H. Sicc. pag. 61. num. 153. *An Portulaca Marina fruticosa* I. B. 1. 229

4. Atriplex folio hastato seu deltoide Inst. R. H. 505

5. Atriplex Orientalis frutex aculeatus, flore pulchro Coroll. Inst. R. H. 38

AVRANTIVM maximum Ferr. Hesper. 437, 439. 441. Arancio di fructo grossissimo vulgo

2. Aurantium Hierichuntium (fructu rotundo) cortice tenuiori (levi) medulla dulci rubente H. Pis. 21. Tab. 16. Arancio di sugo rosso vulgo

3. Aurantium ficiore medulla hibernum Ferr. Hesper. 374. & 379. *An Aurantium maximum verrucoso cortice* Volk. Hesper. Norimb. Tom. 2. 176. & *Clarici* pag. 139

4. Aurantium Olyssiponense Ferr. Hesper. 425. *Aurantium Lusitanicum*. Volk. Hesper. Norimb. 193. Arancio di Portogallo vulgo

5. Aurantium Acri medulla, vulgare Ferr. Hesper. 374. & 377. *Aurantium pomi acidi ferax* Volk. Hesper. Norimb. 187. * *Aurantium succo intus acido* Casalp. 141. *Aurantium. Mala Aurantia. Mala Aurea* Offic. Arancio forte vulgo

6. Aurantium dulci medulla, vulgare Ferr. Hesper. 374. & 377. *Aurantia fructu dulci* Volk. Hesper. Norimb. 187. 188. * *Aurantium succo intus dulci* Casalp. 141. Arancio dolce vulgo

7. Aurantium vulgare medulla medii saporis Ferr. Hesper. 374. *Aurantia fructu saporis medii sive dulcacido* Volk. Hesper. Norimb. 187. * *Aurantium succo intus mediocri* Casalp. 141. Arancio di mezzo sapore vulgo

8. Aurantium admodum florigerum, fructu subrotundo quasi sessili, leviter verrucoso, in fine circulo nonnihil prominente instructo, cortice trilineari, medulla amaradulci. Arancio da fiori nostrale vulgo. * *An Arancio Ric.*

9. Aurantium sylvestre Volk. Hesper. Norimb. 187. Arancio Salvatico vulgo

10. Aurantium Sinense Ferr. Hesper. 430. & 433. *Aurantium Sinense pumilum* Volk. Hesper. Norimb. 277. & 207. * Arancio della China vulgo

11. Au-

11. *Aurantium* foliis subrotundis crispis confertim nascentibus, flore albo parvo odorato & caduco, fructu aureo orbiculato, pulpa acida. *Aurantium crispo folio* Ferr. *Hesper.* 389. Arancio riccio vulgo

AVRICVLA Vrfi maxima, latioribus & longioribus foliis, flore luteo H. Mauroc. *Auricula Vrfi omnium maxima, non descripta* Don. *Cat. Plant. H. Flor. & Raii Hist. Tom. 3.* 576. H. *Pisf.* 21

2. *Auricula Vrfi* flore magno atropurpureo holoserico simplici, umbone candido amplissimo *Inst. R. H.* 120

AZEDARACH *Inst. R. H.* 616. * *Sicomoro falso* Matth. 307. *Tuber Casalp.* 107. *Zizypha candida* Lob. *alba* Lugd. *Pseudosycomorus* Cast.



ALLOTE Matth. 872. *Inst. R. H.* 185. * *Ballote, Cimiciottum* vulgo *Casalp.* 445. *Marrubium nigrum & fœtidum* Offic.
2. *Ballote* flore albo *Inst. R. H.* 185

BALSAMINA fœmina *Inst. R. H.* 418. * *Balsamina secon-*
da Matth. 1350. *Catanance* vulgo *Balsaminum* *Casalp.* 266. *Be-*
gliomini vulgo

2. *Balsamina fœmina* flore candido *Inst. R. H.* 418
3. *Balsamina fœmina* flore partim candido partim rubro *Inst. R. H.* 418
4. *Balsamina* flore maiore specioso *Inst. R. H.* 418
5. *Balsamina Indica* flore ex albo & suave purpurascens colore elegantissime variegato *Inst. R. H.* 419
6. *Balsamina Indica* flore rubente pleno *Inst. R. H.* 419

BALSAMITA maior Dod. *Pempt.* 205. *Vaill. A&.* *Ac. R. Sc. Ann.* 1719. pag. 369. num. 1. *Tanacetum hortense* foliis & odore *Menthae* *Inst. R. H.* 461.
* *Mentha Greca* Matth. 753. *Herba S. Mariae* *Casalp.* 483. *Costus Hortorum* *Gesf.* *Mentha Corymbifera* *Cord.* *Mentha Sarracénica* *Ang.* *Mentha Greca* *Cast.*
2. *Balsamita* foliis *Agerati* *Vaill. A&.* *Ac. R. Sc. Ann.* 1719. pag. 369. num. 2. *Bellis spinosa* foliis *Agerati* *C. B. Pin.* 262

BARBA Capræ præcox, foliis costæ ramosæ innascentibus minoribus & ad *Carpinum* accedentibus, floribus albis, petalis ex angusto principio sensim ad extremitatem dilatatis & rotundatis, staminulis longioribus. *Barba Capræ, floribus oblongis* *C. B. Pin.* 163. *Inst. R. H.* 265. *Barba Capri* *I. B.* 3. 488. *Drymopogon* *I. Tabern. Icon.* 777. * *Barba Caprina* Offic.

2. *Eadem* *Serotina*, foliis maioribus altius incis, floribus albis, petalis subrotundis, staminulis a centro vix se attollentibus *An Drymopogon* *II. Tabern. Icon.* 778

Horti Florentini

15

BARBA Iovis pulchre lucens Inst. R. H. 651. * *Barba Iovis Casalp.* 118
2. Barba Iovis Americana herbacea trifolia, floribus cæruleis spicatis. *Trifolium Americanum* C. B. Pin. 327

BARBAREA maior, foliis in paucos & ampliores lobos divis, floribus luteis, siliquis crassiusculis unciam longis ad caulem contractis

2. Eadem foliis in oblongos lobos divis, siliquis brevioribus ad caulem non contractis

3. Barbarea; quæ Sisymbrium Orientale Barbareae facie Plantaginis folio Coroll. Inst. R. H. 16

4. Barbarea foliis minoribus & frequentius sinuatis Raii Hist. Tom. 1. 809

BELLADONA maioribus foliis & floribus Inst. R. H. 77. * *An Solatrum maius Casalp.* 212. *Solanum melanocerason*, vel *manicum*, vel *lethale* Offic.

BELLIDASTRUM Alpinum glabrum, foliis brevibus hirsutis, caule palmari, flore albo Michel. Nov. Plant. Gen. 32. num. 1

BELLIS maior hirsuta hiemalis multiflora, floribus cum duplici semiflosculorum serie inferne rubentium desuper alborum. *An Bellis minor autumnalis Monanthes*, caule nudo tenui prælongo, flore ex albo rubente Raii Hist. Tom. 3. 221. * *Symphytum minimum*. *Consolida minima* & *minor*. *Primula veris* Offic.

BERBERIS dumetorum Inst. R. H. 614. * *Crespino* Matth. 183. & *Casalp.* 99. *Berberis volgare* o *Crespino* Ric. *Oxyacantha* Galeni Cord. *Spina acida* Brunf. *Berberis* Offic.

BERMVDIANA Iridis folio, fibrosa radice (flore cæruleo) Inst. R. H. 388

BETA Communis, sive viridis C. B. Pin. 502. *Beta nigra* I. B. 2. 961. *Beta folio brevior* & *rotundior* *Casalp.* 159. *Bietola vulgo*

2. Beta pallide virens maior Inst. R. H. 502

3. Beta sylvestris maritima Inst. R. H. 502

BETONICA foliis hirsutis, floribus purpureis amplissimis Mentz. Pug. *Betonica amplissima*, *Alpina* Bellucc. H. Pis. *An Betonica rubicundissima flore Montis Aurei* Inst. R. H. 203

2. Betonica Alpina latifolia maior villosa, flore luteo Inst. R. H. 203

3. Betonica purpurea Inst. R. H. 203. * *Betonica* Matth. 994. *Casalp.* 444 Ric. & Off. *Bettonica vulgo*

4. Betonica arvensis annua, flore ex albo flavesciente Inst. R. H. 203. * *Siderite secunda* Matth. 1057

BETVLA Inst. R. H. 588. * *Betula* Matth. 158

BIDENS Virginiana altissima, alato caule, foliis longis asperis integris alternatim posit, floribus luteis umbellatis, semiflosculis amplioribus semper quinis, flosculorum vaginulis nigricantibus, semine lato marginato binis corniculis instructo. *Ceratocephaloides altissima longifolia* Vaill. in *Act. Ac. R. Sc. Ann.* 1720. pag. 425. num. 2

2. Bi-

2. *Bidens palustris* annua, caule rotundo purpurascente circa radicem nonnihil villosa, foliis longis integris rarius serratis, flore luteo specioso nuntante, semine quatuor aristis munito. *Bidens folio non dissecto* Casalp. 488. *Inst. R. H.* 462. *Bot. Par.* 21. num. 1
3. *Bidens Palustris* annua, caule anguloso, foliis oblongis integris & serratis, flore parvo luteo minus specioso erecto, semine binis aristis armato. *An Bidens folio non dissecto* Casalp. 488. *Eupatorium Cannabinum fœmina septemtrionalium, stellato & odorato flore* Lob. Icon. 529
4. Eadem foliis in tres partes tantum divisus & leviter serratis. *An Bidens foliis tripartito divisus* Casalp. 488. *Inst. R. H.* 462
5. Eadem foliis quinquepartitis angustis & leviter dentatis * *Hæc & duæ sequentes in Officinis promiscue vocantur Verbena supina* Trag. *Verbesina* Gesn. *Et Cannabina aquatica* C. B.
6. Eadem foliis quinquepartitis latiusculis altius dentatis. *An Bidens foliis tripartito divisus* Casalp. 488. *Inst. R. H.* 462
7. Eadem Ebuli folio
8. *Bidens palustris* annua, foliis latis brevibus altius dentatis & quandoque incisus, imis integris, superioribus trilobatis, flore luteo nudo, semine bidentato
9. *Bidens Americana* Apii folio *Inst. R. H.* 462

BIGNONIA *Americana* Fraxini folio flore amplo phœniceo *Inst. R. H.* 164. * *Jasminum bederaceum Indicum* Corn.

2. *Bignonia Americana* (tetraphylla) capreolis donata, siliqua brevior *Inst. R. H.* 164. * *Clematide tetraphylla Americana* Zann.

BISTORTA maior radice minus intorta *Inst. R. H.* 511. * *Bistorta* Matth. 997. & Casalp. 167. *Bistorta. Celubrina. Bulapathum* Offic.

BLATTARIA maxima annua, foliis amplioribus acutis rugosis serratis & non splendentibus, floribus luteis solitariis pediculo quasi orbatis. *An Blattaria* Matth. 1210. Ed. Valgrif. in fol. Ann. 1585. Dod. Pempt. 145. Lugd. 1305. Lob. Obs. 304. *Blattaria Plinii* Ger. Emac. 776. Lob. Icon. 564. *Blattaria altissima Verbasci Maris foliis viridibus* H. Cathol. suppl. pag. 96. *Blattaria Mandragora folio rugosissimo lucido, flore lutescente maximo* H. Pis.

2. *Blattaria* annua, foliis longis splendentibus usque ad costam fere laciniatis, floribus luteis longo pediculo fultis. *An Blattaria lutea, folio longo laciniato* C. B. Pin. 241. *Blattaria lutea* I. B. 3. App. 874. Descript.

3. Eadem floribus albis

4. *Blattaria* annua, foliis longis splendentibus serratis, interdum per basim nonnihil laciniatis, floribus luteis solitariis longo pediculo fultis. *Blattaria flore luteo* Ger. Emac. 778. Park. Theatr. 64. *Verbasum nonum* Casalp. 347

5. Eadem flore albo

BLITVM sylvestre rubrum minus, foliis Ocimi confertioribus, interdum pluribus maculis nigris & exiguis notatis, floribus secundum caulis longitudinem ad foliorum exortum glomeratim nascentibus, semine nigro splendente. *An Blitum obscure virenti, Ocimi medii folio, non spicatum, seu Helxine veluti Lappulis infectum* H. Cathol. 30

2. *Blitum maritimum* annuum erectum minus, caulibus albicantibus, ramis longioribus & crebrioribus, foliis subrotundis parvis glaucis longo pediculo

culo donatis, floribus candidis ad foliorum alas inter molliter aculeata foliola exeuntibus, fructu oblongo coronato, semine nigro splendente. *Blitum Maritimum minus*, *calyculis aculeatis* Michel. H. Pis.

BOLETVS parvus, pileolo griseo suboscuro longo & angusto ac in metæ formam fastigiato, costis per longitudinem, & transversalibus scrobiculis undique cellulato, pediculo albo

BORRAGO floribus cæruleis Inst. R. H. 133. * *Buglossa vera* Matth. 1245. *Borrage floribus cæruleis elegantissimis* Casalp. 433. *Borrana*, & *Borrana Domestica* Ric. *Buglossum latifolium*, & *Borrage* Offic.

2. *Borrage floribus albis* Inst. R. H. 132. * *Borrage floribus candidis* Casalp. 433.

BRASSICA Campestris perfoliata flore albo Inst. R. H. 220. * *Perfoliata filiquosa* Lob.

BRVNELLA maior & elatior, folio longo latiore ac utrinque acuminato, flore ex cæruleo purpurascens. *Brunella flore minore vulgaris* I. B. 3. 428. sed Icon. *Prunella vulgaris* Trag. 310. Icon. *Prunella Fuschf.* 621. * *An Consolida minore* Matth. 1014. & Ric. *Prunella*, *Morella*, *Herba Mora*, *Consolida minor* Casalp. 453

2. Eadem nonnihil humilior, foliis brevioribus & ad petiolum obtusis. *Brunella flore minore vulgaris* I. B. 3. 428. Descript. *Brunella maior folio integro*, seu non dissecto Mor. Hist. Oxon. Part. 3. 363. Sect. XI. Tab. 5. fig. 11. *Prunella* Dod. Pempt. 136. *Prunella Consolida minor* Tabern. Icon. 553. *Symphytum petraeum*, *Consolida minor* Matth. Lob. Icon. 474. Cast. 146. * *Prunella*. *Symphytum minus* Offic.

3. Eadem minor serotina, foliis ad petiolum acuminatis, flore parvo

4. *Brunella cæruleo magno flore* Inst. R. H. 182

5. *Brunella foliis imis integris, superioribus laciniatis, flore albo*. *Brunella folio laciniato, flore albo* Inst. R. H. 183

6. Eadem foliis imis longioribus & angustioribus, flore albido. *Prunella* III. Tabern. Icon. 354

BRYONIA aspera sive alba, baccis rubris Inst. R. H. 102. * *Vite bianca*, ovvero *Brionia* Matth. 134. *Bryonia* Casalp. 205. *Brionia* Ric. *Bryonia* Offic.

BVGLOSSVM latifolium sempervirens Inst. R. H. 134. * *An Buglossa Hispanica* Casalp. 433

2. *Buglossum angustifolium maius, flore cæruleo* Inst. R. H. 134. * *Buglossa volgare* Matth. 1246. *Buglossa quasi Lingua Bovina* Casalp. 432. *Buglossa* Ric. *Buglossum*, *Lingua Bovis*, & *Lingua Bovina* Offic. ut & numer. 7. & 8

3. *Buglossum angustifolium maius, flore albo* Inst. R. H. 134

4. *Buglossum sylvestre minus, flore azureo, radice perenni* Italicum Barr. Icon. 333

5. *Buglossum Creticum maius, flore cæruleo purpurascens* Inst. R. H. 134

6. *Buglossum Creticum maius flore albo* Inst. R. H. 134

7. Buglossum Italicum perenne & admodum villosum, Echii folio, flore violaceo interne holosericeo, calyce vesicario. *An Buglossum sylvestre, maius, nigrum* C. B. Pin. 236. Inst. R. H. 134. * *Vn altra Buglossa col fiore negro* Matth. 124

8. Idem Echii bullato undulato dentatoque folio, minus villosum, flore intente violaceo quasi nigricante ac interne holosericeo

9. Buglossum arvense annuum, Lithospermi folio (flore albo) Inst. R. H. 134. * *Anchusa differentia tertia* Casalp. 435. *Lithospermum sylvestre* Trag.

BVGULA sylvestris villosa flore caeruleo Inst. R. H. 209

2. Bugula maior glabra, foliis oblongis inferne tantum vel undique prae-
rumque purpurascens, floribus caeruleis. *Consolida media quibusdam* Bugula I. B. 3. 430. Fig. 2. * *Consolida media* Matth. 1013. *Consolida mezzana* Cast. 134. & Ric. *Hec & sequens Bugula, Consolida media, Herba Laurentiana, seu S. Laurentii, & Herba Mora in Offic. vocantur, & vulgo Erba Mora*

3. Bugula media glabra, foliis brevibus subrotundis obscure virentibus & quasi lucidis, nunquam inferne purpurascens, floribus caeruleis. *Consolida media* Fuchs. Hist. 391. *Consolida media quibusdam* Bugula I. B. 3. 430. Fig. 1. *An Bugula minima glabra, flore caeruleo* Barr. Obs. 37. Icon. 337

4. Eadem floribus roseis

BVPHTHALMVM Tanacetii minoris foliis Inst. R. H. 495. * *An Chrysanthemum* Casalp. 494

2. Idem majus. *Chrysanthemum Tanacetii folio, flore albo, montanum, Italicum* Barr. Icon. 466. *An Buphtalmum Alpinum flore candido* Triumf. Obs. 79

BVPLEVROIDES quae *Simpla Nobla* Canariensium Boerh. Ind. Alc. H. Lugd. Bat. Part. 1. 72

BVPLEVRVM arborescens Salicis folio Inst. R. H. 310. * *Seseli Ethiopico* II. Matth. 794. *Planta altera quae pro Seseli Aethiopico ostenditur* Casalp. 296. *Seseli Aethiopicum* Offic.


2. Bupleurum perfoliatum rotundifolium annuum Inst. R. H. 310. * *Perfoliata* Matth. 215. & Offic.

BVRSIA PASTORIS maior, folio sinuato Inst. R. H. 216. * *Bursa pastoris* Casalp. 365. Matth. 601. & Offic.

2. Bursa pastoris eleganti folio instar Coronopi repentis Inst. R. H. 216

BVXVS arborescens Inst. R. H. 578. * *Buxus* Casalp. 126. *Bosso* Matth. 208. *Buxus* Offic. *Bossolo vulgo*

2. Buxus foliis rotundioribus Inst. R. H. 579



ACALIA Alpina foliis crassis serratis & inferna parte hirsutis, floribus purpureis umbellatis. * *Cacalia Casalp.* 459

2. Eadem præalta, Petasitidis foliis crassis subtus canescentibus & tomentosis. An *Cacalia foliis crassis hirsutis Inst. R. H.* 453

CACHRYS Peucedani folio crassiore & rigidior, segmentis teretibus, umbellis luteis ad singulos nodos radiatim seu rotatim nascentibus, semine longo sulcato & undique aspero. *Cachrys semine fungoso sulcato aspero, foliis Peucedani latiusculis Mor. Vmb.* 62. *Cachrys semine fungoso sulcato aspero Eiusd. Tab.* 3

2. Eadem semine longo sulcato, iugis seu costis aculeis longis & non exstantibus Caucalidis instar insignitis

3. *Cachrys Sicula* foliis Pastinacæ latifoliæ, semine sulcato & hirsuto *Mor. Patt.* 3. 277. *Seft.* 9. *Tab.* 1. *fig.* 4

4. *Cachrys Cretica* Angelicæ folio, Asphodeli radice (semine sulcato aspero & nigricante) *Coroll. Inst. R. H.* 23

CALAMINTHA præstantior magno flore *Inst. R. H.* 194. * An *Calamentum montanum Casalp.* 472

2. *Calamintha vulgaris*, vel officinarum Germaniæ *Inst. R. H.* 194. * *Calamintha montana Matth.* 756. & *Offic.*

3. *Calamintha Pulegii* odore, sive *Nepeta maior vulgaris*

4. Eadem foliis latis circinatis. An *Calamintha l. Matth.* 755

5. Eadem minor floribus exiguis

6. Eadem foliis latissimis fere rhomboidalibus petiolo longo donatis, floribus longiore petiolo fultis

7. *Calamintha frutescens Satureiæ* folio facie & odore (floribus candidis) *Inst. R. H.* 194. *Thymbra Offic.*

8. *Calamintha humilior* folio rotundior *Inst. R. H.* 194. * *Hedera Terrestre Matth.* 662. *Hedera Terrestris Casalp.* 452. & *Offic. Chamæcissos Dod.*

CALAMVS AROMATICVS vulgaris, multis Acorum Michel. Nov. *Plant. Gen. Part.* 1. 33. * *Planta quæ apud Serenist. Mag. Ducem virescit, & cuius radices vulgo pro Calamo Aromatico venduntur Casalp.* 425. *Acoro Matth.* 23. *Acoro, & Calamo Aromatico dello Spezierie ne' Giardini di S. A. Ric.*

CALCITRAPA vulgaris lutea alato caule *Vaill. in A&.* *Ac. R. Sc. Ann.* 1718. *pag.* 211. *num.* 21. * *Spina Solstitialis Dod.*

CALCITRAPOIDES Rapi folio alato caule, flore purpureo coronato *Vaill. in A&.* *Ac. R. Sc. Ann.* 1718. *pag.* 213. *num.* 1

2. *Calcitrapoides canescens Sonchi* folio, alato caule, capite (maiore) turbinato *Vaill. in A&.* *Ac. R. Sc. An.* 1718. *pag.* 214. *num.* 11. 13

3. *Calcitrapoides*; an *maritima canescens Cichorii* folio, capite magno *Vaill. in A&.* *Ac. R. Sc. Ann.* 1718. *pag.* 214. *num.* 9

CALTHA maritima sempervirens & semperflorens. * *Hæc pro Calendula & Caltha Offic. usurpari potest*

CAMPANULA pyramidata altissima Inst. R. H. 109

2. Campanula Alpina non ramosa maxima subhirsuta, foliis Vrticæ, floribus cæruleis solitariis amplis pendulis & uno versu dispositis. *An Campanula maxima foliis latissimis, flore cæruleo Inst. R. H. 108*

3. Campanula hortensis, folio & flore oblongo, cæruleo Inst. R. H. 109. * *Medio ovvero Viola Mariana Matth. 1040. An Rapunculi genus grandius, floribus purpureis Casalp. 385*

4. Campanula hortensis, Rapunculi radice Inst. R. H. 109

5. Campanula sive Cervicaria Bononiensis, parvo flore Inst. R. H. 109

6. Campanula Alpina, foliis Vrticæ longioribus & asperis, rarius dentatis, floribus cæruleis uncialibus uno versu dispositis & in foliorum alis glomeratim nascentibus, calyce patulo. * *Hæc, & quatuor sequentes, Cervicaria, & Archangelica in Offic. vocantur*

7. Eadem foliis Vrticæ angustis pyramidatis crebro & læviter dentatis, calyce clauso

8. Eadem arvensis Vrticæ foliis brevioribus asperis & altius incisfis, floribus parvis, calyce clauso

9. Eadem arvensis Vrticæ folio angusto aspero & læviter crenato, calyce clauso

10. Campanula saxatilis Betonicæ folio lævi, margine aspero, floribus cæruleis parvis glomeratis, semine marginato

11. Campanula Persicæ folia, flore albo Inst. R. H. 111

12. Campanula minor rotundifolia vulgaris Inst. R. H. 111

13. Campanula arvensis erecta Inst. R. H. 112. * *Elatine Casalp. 387. Speculum Veneris Ger. Pentagonion, Viola Pentagonia Tabern.*

CAMPHORATA Maritima hirsuta perennis humi strata, Iuniperi folio, fructu bilineari & veluti birostrato, semine ferri Equini figuram mentiente. *An Camphorata hirsuta C. B. Pin. 86*

CANNABINASTRUM annuum flore prorsus albo

2. Idem flore albo, labio inferiori venis purpureis distincto

3. Idem flore prorsus purpureo

4. Cannabinastrum annuum, Parietariæ folio, flore purpureo cum labio inferiori circa faucem dumtaxat variegato. *Cannabinastrum est novum plantæ genus a Michelio constitutum in Enumeratione rariorum plantarum sibi per Italiam & Germaniam observatarum, ut a Galeopsidibus Galeobdolis Ladanis & Asphaltiis plantas quasdam verticillatas melius distingueret. Huius characteres sunt, facies quædam propria, flos galeatus cuius labium inferius papillatum, calyculorum ora fimbriata ac teretibus & a se invicem distantibus aculeis munita, tandem verticilli florum ad basim spinis circumdati. Hæc vero nota cum Iconibus & descriptione octo specierum clarius proponuntur in supra dicto Michelii Opere postumo, ad cuius editionem parandam studium ac laborem meum omne libentissime conferam simul, ac publici iuris fecerim alteram partem Eius Novorum Generum Plantarum*

CANNACORVS latifolius vulgaris Inst. R. H. 367. * *Canna Indica Casalp. 420*

2. Can-

2. Cannacorus flore luteo punctato Inst. R. H. 367

CAPPARIS folio acuto Inst. R. H. 261. * *pro Cappari Offic. usurpatur*

CAPRIFOLIUM Germanicum Inst. R. H. 608

2. Caprifolium Italicum perfoliatum subhirsutum & serotinum, foliis oblongis. *Vincibosum Cæsalp.* 207. * *Hæc, & sequentes Caprifolii species in Offic. nostris promiscue usurpantur pro Periclymeno & Caprifolio, vocanturque vulgo Madrefelva & Vincibosco*

3. Caprifolium Italicum perfoliatum angustifolium sempervirens, foliis inferna parte incanis superne glaucis & quasi lucidis. *Periclymenum petraum perfoliatum humile, foliis inferioribus candicantibus, superne lucido virore splendentibus H. Mess.*

4. Caprifolium Italicum (perfoliatum serotinum & glabrum) Inst. R. H. 608. * *Periclymeno Matth.* 1025. *Madrefelva di fiori gialli Ric.*

CARDAMINE montana Afari folio Inst. R. H. 225

2. Cardamine Alpina palustris, Sisymbrii aquatici Matthioli folio, altera & minor, floribus albis

3. Cardamine Sicula foliis Fumariæ Inst. R. H. 224

4. Cardamine Alpina hirsuta floribus albis

5. Cardamine IV. Dalecampii Inst. R. H. 224. * *Nasturtium aquaticum minus C. B.*

6. Cardamine Alpina I. trifolia Inst. R. H. 225

7. Cardamine pratensis magno flore purpurascens Inst. R. H. 224. * *Nasturtium pratense Trag. Flor Cuculi Dod.*

CARDIACA (foliis planis) Inst. R. H. 186. * *An Cardiaca Matth.* 1086. *Cardiaca Cæsalp.* 445. *Hæc, & sequens in Offic. promiscue usurpantur pro Melissa sylvestri, Cardiaca, Alyso Galeni & Ætii, Marrubio Marc. & Lycopside*

2. Cardiaca crispa Inst. R. H. 187

CARDVVS pycnopolycephalus palustris Triunf. Obf. 103

2. Carduus sylvestris alter in limitibus agrorum Cæsalp. 526. & Vaill. in Art. Ac. R. Sc. Ann. 1718. pag. 195. num. 6

CARDVVS. vide ONOPORDON, ERIOCEPHALVS, SILYBVM, CALCITRAPA, & CALCITRAPOIDES

CAREX palustris maior, radice fibrosa, caule exquisitè triangulari, spica breviori compacta Michel. Nov. Plant. Gen. 69

2. Carex minor, radice fibrosa, foliis angustioribus, caule exquisitè triangulari, spica mucilata Michel. Nov. Plant. Gen. 68. num. 3

3. Carex, an nemorosa, fibrosa radice, caule exquisitè triangulari, spica longa divulsa seu interrupta, capitulis solitariis præterquam ultimo Michel. Nov. Plant. Gen. 69

4. Carex minor præalta, spica longa interrupta

5. Carex angustifolia, caule triquetro, capitulis pulchellis habitioribus inter se distantibus & in foliorum alis sessilibus Michel. Nov. Plant. Gen. 70

CAR-

CARLINA acaulos, magno flore luteo. *Carlina* vulgo *Casalp.* 527. * *pro Carlina, & Chamaleonte albo Offic. usurpari potest*

2. *Carlina* annua parva (subincana) flore purpureo rubente & albo, patula Michel. H. Pis.

3. *Carlina* sylvestris, flore aureo perennis Inst. R. H. 500

CARPINVS foliis oblongis serratis & nonnihil crispis, folliculis fructuum longioribus & acutis, semine lato maiore ac magis costulato. * *An Fago similis altera Casalp.* 39. *Carpino Matth.* 162. *Carpinus alba Cast.*

2. Idem foliis minoribus rugosis acuminatis atque inæqualiter serratis, folliculis fructuum brevioribus, semine minore, non ita costulato

3. *Carpinus Orientalis*, folio minori, fructu brevi Coroll. Inst. R. H. 40

CARTHAMOIDES perennis maior & plerumque ramosa, foliis ab imo ad medium caulem in simplices & angustas lacinias ad costam usque divisus, cæteris profunde dentatis, capitulis cæruleis

2. Eadem minor, foliis circa radicem usque ad costam laciniatis, cæteris dumtaxat dentatis

3. *Carthamoides humilis*, radice repente, *Carlinae* folio, capitulis cæruleis.

CARTHAMVS Officinarum flore croceo Inst. R. H. 457. * *Cnicon Graecorum, & Crecum Sarracenicum Marc.* 30. *Cnicus sativus vulgo Crocum Sarracenicum Casalp.* 534. *Carthamo Ric. Grogo, Zaffrone Vulgo*

CARVI *Casalp.* 291. Inst. R. H. 306. * *Caro Matth.* 798. *Carvi, Caros, Carum Offic.*

CARYOPHYLLATA vulgaris lutea, *Caryophyllatae* aquaticæ folio. *Caryophyllata Brunf. Tom.* 3. 24

2. *Caryophyllata* vulgaris foliis maioribus

3. Eadem foliis minoribus. * *Haec tres Caryophyllata species promiscue usurpari possunt pro Caryophyllata, Benedicta, Herba Benedicta Offic. & Garioflata Ric.*

4. *Caryophyllata Alpina* lutea Inst. R. H. 295

5. *Caryophyllata Alpina* minor Inst. R. H. 295

6. *Caryophyllata* aquatica nutante flore Inst. R. H. 295

CARYOPHYLLVS barbatus hortensis latifolius diversicolor Inst. R. H. 322. * *Armeria Lob. & aliis*

2. *Caryophyllus* sylvestris, flore ex albo carneo, umbilico virescente ac piloso, petalis tenuissime dissectis, sectionibus multifidis. * *An Caryophyllus flore tenuissime dissecto, carneo Inst. R. H. 331*

3. *Caryophyllus barbatus hortensis latifolius ruber* Inst. R. H. 333

4. *Caryophyllus* (annuus) barbatus sylvestris Inst. R. H. 333

5. *Caryophyllus repens cinereus angustifolius*, flore odorato dilute purpureo & circa umbilicum piloso, petalis latis & altius crenatis

6. *Caryophyllus Alpinus minimus repens subhirsutus*, *Polygoni* folio, flore purpureo inodoro, ac circa umbilicum cæruleo & anguloso

7. *Caryophyllus Alpinus parvus*, *Gramineo* folio subtilissime denticulato, flore ex albo purpurascente ac inodoro, umbilico subvirescente, corniculis brevissimis, petalis tenuissime laciniatis

8. Caryophyllus longo latoque folio, flore rubro parvo, umbilico saturatione & punctulis nigropurpureis villisque pellucidis obfuso

9. Caryophyllus minimus, Larycis folio, petalis parvis obtusis cordatis dilute purpurascens, ac interne lineis tribus saturationibus distinctis

10. Caryophyllus minimus, petalis parvis in summitate complanatis & cordatis, extus purpureis, interne dilutioribus & lineis tribus saturationibus distinctis

CASIA Poëtica Monspeliensium, an Theophrasti Inst. R. H. 664. * *Cassia lignea Casalp.* 154

CASSIDA Inst. R. H. 181. * *Scutellaria C. B.*

2. Cassida; an Cretica fruticosa Cataria folio, flore albo Coroll. Inst. R. H. 11

3. Cassida palustris vulgatio, flore caeruleo Inst. R. H. 182. * *Lysimachia Galericulata Clus. Gratiola caerulea C. B. Tertianaria Tab.*

4. Cassida palustris minima, flore purpurascens Inst. R. H. 182

5. Cassida quæ Scutellaria, folio Teucrii nitido, flore spicato annuente purpureo H. Cathol.

CATARIA an Hispanica, Betonica folio angustiori, flore albo Inst. R. H. 302

CEDRVS folio Cupressi, fructu parvo violaceo

CELTIS fructu (minore) nigricante Inst. R. H. 612. * *Lotus arbor quam in Hebræa Bagatim vocant Casalp.* 86. *An Loto Matth.* 276. *Bagolaro vulgo*

CENTAVRIVM maius Orientale erectum, Gladii folio, flore luteo Coroll. Inst. R. H. 32

2. Centaurium maius folio Helenii subtus incano Inst. R. H. 449

CEPA alpina palustris tenuifolia Inst. R. H. 383

2. Cera scætilis luncifolia perennis Inst. R. H. 383

3. Cera bicornis luncifolia, floribus albidis a medio ad summum purpurascens & præcipue costis & marginibus

4. Cera Ascalonica Matth. 556. Inst. R. H. 382. * *Cepis affinis Ascalonia, seu Ascalonia vulgo Casalp.* 400. *Ascalogne Matth.* 586. *Scalogni vulgo*

CERASVS racemosa sylvestris, fructu eduli e viridi purpurascens austro-dulci gratiosi saporis * *Cerasus quedam sylvestris Casalp.* 51

2. Cerasus sylvestris amara, Mahaleb putata Inst. R. H. 627. * *Mahaleb Matth.* 190

CERATOSPERMVM minimum Cornucopioides album & subhirsutum, seminibus incarnati coloris, Autumni tempore Lauri caudicibus adnascens Michel. Nov. Plant. Gen. 125. num. 3. Tab. 56. fig. 3

CHÆROPHYLLVM fativum Inst. R. H. 314. * *Cerofoglio Matth.* 555. *Cerofolium Casalp.* 41. *Cherofolium Dod. Gingidium Fuchf. Cerfoglio vulgo* CHA-

CHAMAE CERASVS dumetorum (villosa) fructu gemino rubro Inst. R. H. 609

2. Chamæcerasus Alpina fructu nigro gemino Inst. R. H. 609

CHAMAE DRYs fruticosa sylvestris, Melissæ folio Inst. R. H. 203. * *Hæc, & sequens in Offic. promiscue vocantur Salvia sylvestris, Scorodonia, Scordotis, & Scordium matius*

2. Eadem foliis maioribus & nigricantibus

3. Chamædrys maior repens Inst. R. H. 204. * *Chamædrys vulgo Quercula Cæsalp. 454. Camedry, Querciuola Ric. Trixago Cast.*

4. Chamædrys frutescens Teucrium vulgo Inst. R. H. 205. * *Teucro I. Matth. 863. Teucrium Cæsalp. 455*

5. Chamædrys palustris canescens, seu scordium officinarum Inst. R. H. 205. * *Scordium Marc. 204. Scordeo Matth. 890. Scordium Cæsalp. 456. Scordeo Ric.*

6. Chamædrys maritima incana frutescens, foliis lanceolatis Inst. R. H. 205. * *Maro Matth. 769. Ric. 48. Pepolina ex Sicilia ad nos allata sub nomine Mari Cæsalp. 466. Marum Cortusi I. B.*

7. Chamædrys laciniatis foliis Inst. R. H. 205. * *Camedrio II. Matth. 866. Chamædrys fœmina Cæsalp. 457. Botrys Chamædryoides C. B. Trixago Lon. Iva moschata Tab.*

8. Chamædrys spinosa C. B. Prodr. 117

CHAMAE MELVM (annum) vulgare Leucanthemum Dioscoridis Michel. Nov. Plant. Gen. 34. * *Anthemide o vero Camamilla Matth. 955. Chamæmelum vulgo autem Camomilla Cæsalp. 491. Camomilla Ric. Chamæmelum. Offic. Camomilla vulgo*

CHAMAE MELVM. vide ANTHEMIS

CHAMAE NERION villosum magno flore purpureo Inst. R. H. 303. * *Onagra alia hirsuta, latiore folio Cæsalp. 268*

2. Chamænerion, an villosum, minus, parvo flore Inst. R. H. 303

3. Chamænerion Asclepiadis folio, glabrum, flore purpurascens

4. Chamænerion latifolium, vulgare Inst. R. H. 302. * *Onagra Cæsalp. 268. Herba S. Antonii & Filius ante patrem Gesn. Lyfimachia siliquosa C. B. Epilobium Gesn.*

5. Chamænerion angustifolium Alpinum, flore purpureo Inst. R. H. 302

6. Chamænerion Alpinum palustre latifolium & glabrum, foliis binis, interdum ternis, flore purpureo, petalis bifidis. *Chamænerion Alpinum, foliis ad nodos ternis Inst. R. H. 203*

7. Chamænerion Alpinum palustre, nitidorubente caule, Digitalis minoris foliis coniugatim positis ac petiolo donatis, floribus ferme albis, petalis bifidis, siliqua quadrata triunciali

8. Chamænerion Alpinum, foliis pediculo donatis, floribus albis perexiguus, petalis bifidis

9. Chamænerion angustifolium glabrum Inst. R. H. 303

10. Chamænerion Alpinum minus, Brunellæ foliis Inst. R. H. 303

CHA.

CHAMAEPITYS lutea vulgaris, five folio trifido Inst. R. H. 208. * *Chamaepitio primo Matth.* 991. *Chamaepitys vulgo Iva Casalp.* 456. *Iva Arbetica, & Aiuga Offic.*

CHAMAERHODODENDROS Alpina villosa Inst. R. H. 604

CHAMELAEA tricoccus Hist. R. H. App. 651. * *Mexercon Arabum Lob.*

CHELIDONIVM maius vulgare, foliorum lobis rotundioribus & rotunde crenatis, flore luteo non laciniato. *Chelidonia Brunf. Tom. I.* 236

2. Idem foliorum lobis oblongis acutis & argute dentatis. *Chelidonia I. B.* 3. 482. *Chelidonium maius Dod. Gall.* 24

3. Idem foliorum lobis oblongis rotunde incis. *Chelidonium maius vulgare folio magis dissecto Boerb. Ind. alt. H. Lugd. Bat. part. I.* 305. * *Celidonia Ric. Chelidonia & Hirundinaria Offic. ut & superiores*

4. *Chelidonium maius, foliis quernis Inst. R. H.* 231

CHENOPODIVM Stramonii folio Barr. Obs. 103

2. *Chenopodium folio triangulo Inst. R. H.* 506. * *Bono Enrico Matth.* 631. *Bonus Henricus Brunf. Tota Bona Lob. Lapathum unctuosum C. B. Atriplex Canina Lon.*

3. *Chenopodium folio sinuato candicante Inst. R. H.* 506. * *Atriplice Salvatico secondo Matth.* 489. *Cynocrambe Casalp.* 161

4. *Chenopodium foetidum Inst. R. H.* 506. * *Connina vulgo Casalp.* 163. *Blitum foetidum Trag. Atriplex foetida C. B. Garosmum Dod. Vulvaria Taubern. & Cast.*

5. *Chenopodium Ambrosioides, folio sinuato Inst. R. H.* 506. * *Botri Matth.* 901. *Botrys Casalp.* 158

6. *Chenopodium Ambrosioides Mexicanum Inst. R. H.* 506

7. *Chenopodium Lini folio villosa Inst. R. H.* 506. * *Belvedere Casalp.* 159. *Linaria Scoparia C. B.*

8. *Chenopodium maritimum annuum glabrum, Gramineo folio carnofo & minus acuto, floribus in foliorum alis, semine nigro splendente. An Kali minus, album, semine splendente C. B. Pin.* 289

9. Idem caulibus lignosis procumbentibus, graminis folio carnofo longiore, angustiore & peracuto, floribus minoribus

10. *Chenopodium maritimum fruticosum sempervirens, foliis vermiculatis, floribus in foliorum alis, semine nigro splendente. Anthyllis Chamaepitydes frutescens C. B. Pin.* 282. *Kali species five Vermicularis marina arborefcens I. B.* 3. 704. *Chamaepitys vermiculata Lob. Icon.* 381. *Cassia lignosa similis frutex tertius in Maritimis, bicubitalibus ramis lignosis, foliis Erica crassioribus & pulposis Casalp.* 155

CHENOPODIVM. vide KALI

CHONDRILLA iuncea viscosa arvensis, quæ prima Dioscoridis Inst. R. H. 475. * *Herba quæ ad Chondrillas reduci potest Casalp.* 510

CHONDRILLA. vide LACTVCA

CHRISTOPHORIANA vulgaris nostras racemosa & ramosa Inst. R. H. 299. * *Barba Capri* Casalp. 217. *Aconitum racemosum* C. B. *Napellus racemosus* Lugd.

CHRYSANTHEMVM folio minus secto glauco Inst. R. H. 492

2. Idem folio magis secto

3. *Chrysanthemum latifolium* Inst. R. H. 492

CHRYSANTHEMVM. vide BIDENS

CHRYSOCOME Dill. Supp. Floræ Giff. *Linosyris* Lob.

CICHORIUM silvestre sive officinarum, foliis latioribus & pulchre divisis, flore cæruleo. *Cichorium*, *Intubus erraticus* Tabern. Icon. 170. * Hoc, & sequens in Offic. promiscue usurpantur pro *Cichorio sylvestri*, *Cichoria*, *Cichorio*, & *Intubo errático*

2. *Cichorium silvestre* altius radicaturn, foliis laciniatis, flore cæruleo
* *An Cichorea salvatica* Matth. 532

3. *Cichorium maritimum* perenne, foliis minoribus integris & interdum nonnihil laciniatis, flore cæruleo

CICUTA maior Inst. R. H. 306. * *Cicuta* Matth. 1155. & Casalp. 292

CINARA maxima ex Anglia delata Inst. R. H. 442. * *Mazza ferrata*. vulgo

2. *Cinara hortensis* foliis non aculeatis Inst. R. H. 442. * *Cardo senza spine* Matth. 705. *Scolymus* Fuchf. *Cattus*, *Carduus sativus* Gesn. *Carciofo* vulgo

3. *Cinara silvestris*, spinis longis flavescentibus armata. *An Cinara spinosa*, cuius pediculi estantur Inst. R. H. 442. * *Cardones* Casalp. 526. *Castos* Theophrasti Ang. foliorum pediculi terra obruti Gobbi vulgo vocantur

4. Eadem spinis brevibus & rarioribus infecta * *Spina alba* Marc. 162. *Cardo simile a i Carcioffi*, che Noi adopriamo in Toscana per fare appendere il Latte in vece di Caglio Matth. 693. 701. Presame vulgo ut & superior

5. *Cinara acaulos* Tunetana, *Tafga* dicta, magno flore suaviter olente, angustis *Cinerariæ* foliis non spinosis H. Pis.

CIRCAEA Lutetiana Inst. R. H. 301. * *Pirola quadam in Montibus* Casalp. 339

2. *Circæa minima* Inst. R. H. 301

CIRSIVM foliis non hirsutis, floribus compactis Inst. R. H. 447. * *Circio* Matth. 1233

2. *Cirsium acaulos* flore purpureo Inst. R. H. 448

3. *Cirsium pratense*, *Asphodeli* radice, foliis carnosis angustis longioribus viridibus & *Acanthi* modo divisis, capitulo singulari purpureo parvo

4. *Cirsium arvense*, *Sonchi* folio, radice repente, flore purpurascente Inst. R. H. 448. * *Stoppione* vulgo Casalp. 531

5. *Cirsium Acanthoides* montanum, flore flavescente Inst. R. H. 448

6. *Cirsium Creticum* altissimum, *Cardui lanceolati* folio, flore albo Coroll. Inst. R. H. 32

CISTVS fœmina, folio Salviz (acutior) elatior, & rectis virgis Inst. R. H. 259. * *Cisto femina* Matth. 195. *Cistus Casalp.* 574. *Cistio vulgo ut & duo sequentes*

2. *Cistus mas* II. folio longiore Inst. R. H. 259
3. *Cistus mas maior*, folio rotundior Inst. R. H. 259. * *Cisto maschio* Matth. 194. *Cisti alterum genus in arenosis maritimis nascens Casalp.* 574
4. *Cistus Ladanifera* Monspeliensium Inst. R. H. 260. * *Ladano* Matth. 197. *Ladanum vulgo Casalp.* 575. *Imbrentina Ric.* 45. *Rimbrentine vulgo*

CITREVM vulgare Inst. R. H. 621. Boerh. Ind. Alt. H. L. Bat. Part. I. 240. *Malum Citreum vulgare* Ferr. Hesper. 61. *Malum Citreum Genuensium*, vulgare Volk. Hesper. Norimb. 25. & 116. *Cedri di Massa vulgo* * *Citrus Casalp.* 139. *Malus Citria* Cast. *Malus Medica* C. B.

2. *Citreum Florentinum odoratissimum*. *Malum Citreum Florentinum* Volk. Hesper. Norimb. 123. & 124. *Limon Citreum Florentinum laudatissimum* Ferr. Hesper. 263. *Cedrato vulgo*

3. *Citreum calyce longo crassissimo & quinquepartito*. *Malum Citreum*, calyce quinquepartito crasso, fructu magno *Clarici* pag. 671. num. 48. *Cedro della Ghianda* Volk. Hesper. Norimb. Tom. 2. 48

CLEMATITIS five Flammula surrecta, alba Inst. R. H. 294. * *Flammula* Matth. 1009

2. *Clematitis scandens urens*, Asparagi radice, foliis rotundioribus, floribus albis umbellatis, semine brevi & ferme rhomboideo. *Clematitis five Flammula repens* Inst. R. H. 293. * *Vitalba Ric. Flammula Iovis Ambr.*

3. *Eadem maritima foliis oblongis, seminibus maioribus circinatis*. *Clematitis maritima repens* Inst. R. H. 294. *Zannich.* 69. *Tab.* 129

4. *Eadem lasmini vulgaris folio seminibus longis rhomboideis*. *An Clematitis five Flammula scandens, foliis valde minoribus* I. B. 2. 137. *Descript.*

5. *Clematitis silvestris latifolia (foliis incis)* Inst. R. H. 293. * *Clematide terza* Matth. 1008. *An Clematitis Casalp.* 543. *Vitis silvestris* Trag. *Vitis nigra Fuchf. Vitalba vulgo*

6. *Eadem foliis minus incis & partim integris*

7. *Eadem foliis minoribus ac multum incis*

8. *Clematitis peregrina foliis Pyri incis* Inst. R. H. 293

9. *Clematitis alpina Geranifolia* Inst. R. H. 294

10. *Clematitis cœrulea recta* Inst. R. H. 294

11. *Clematitis cœrulea repens* Inst. R. H. 294. * *Clematide seconda* Matth. 1007. *An Flammula Casalp.* 543

12. *Clematitis purpurea repens* Inst. R. H. 294

CLINOPODIVM Origano simile elatius, maiore folio Inst. R. H. 195. * *Clinopodio vulgare* Matth. 860. *Acinos* Lob.

2. *Clinopodium arvense Ocimi facie* Inst. R. H. 195. * *Vn altro Clinopodio* Matth. 861. *Clinopodium Casalp.* 454. *Ocimum sylvestre, Acinos* Dod.

CNICVS silvestris hirsutior, five Carduus Benedictus Inst. R. H. 450. * *Cardo Santo* Matth. 858. *Carduus Sanctus, five Carduus Benedictus Casalp.* 534

- COCHLEARIA** altissima Glasti folio Inst. R. H. 215
 2. *Cochlearia folio cubitali* Inst. R. H. 215. * *Thlaspi magnum* *Rapbanus montanus* vulgo appellatus *Casalp.* 767. *Raphano vulgare* *Matth.* 469. *Armoracia* *Brunf.* *Rapbanus rusticanus* C. B. *Cren* vulgo a voce Germanica
 3. *Cochlearia folio subrotundo* Inst. R. H. 215. * *Cochlearia* *Offic.*

COLCHICVM commune Inst. R. H. 348. * *Colchico florido* *Matth.* 1164. *Hermodactylus* vel *Crocus sylvestris* *Casalp.* 419. *Hermodactylus niger* & *rufus* *Mesueo* & *Scrapioti* C. B.

COLVTEA Orientalis, flore sanguinei coloris lutea macula notato Coroll. Inst. R. H. 44

2. *Colutea Aethiopica* flore purpureo Inst. R. H. 649
 3. *Colutea Vesicaria* Inst. R. H. 649. * *Colutea* *Matth.* 827. *Sena quiburd.*

COMELINA Virginiana repens, foliis acutis caulem amplexantibus. *Falangie ramoso Virginiano, con foglie larghe, serpeggianti* *Zann.* 90

CONVOLVVLVS purpureus, folio subrotundo Inst. R. H. 82. * *Campanelle*, e fiori dello Scacciati vulgo a pictoris cuiusdam nomine

2. *Convolvulus maior*, foliis latis longis acutis sagittatis & per basim auriculatis, auriculis nigris & angulatis, flore albo triunciali, calyce unciali. *Volubilis* *Brunf.* *Tom.* 3. 91. *An Smilax levis, vel lenis maior* *Lob. Icon* 619. *Ger. Emac.* 861. *Smilax levis maior* *Dod. Pempt.* 292. *Convolvulus maior albus* *Park. Theatr.* 163

3. *Idem* foliis latis brevibus obtuse mucronatis & per basim auriculatis, auriculis parum angulosis, floribus biuncialibus, calyce octo circiter lineas longo

4. *Convolvulus arvensis minor*, folio hastato, auriculis longis angustis peracutis, flore roseo radiis albis picto. *An Convolvulus arvensis minimus* *Raii Synops.* *Ed.* 3. 276. *Convolvulus angustissimo folia nostras cum auriculis* *Pluk. Almag.* 116. *Tab.* 24. *fig.* 3

5. *Idem* folio sagittato acuto, *Convolvulus minor purpureus* *Lob. Icon.* 619. *Convolvulus minor* *Clus. Hist.* 1. *Smilax levis minor* *Dod. Pempt.* 393. *Helictine cissampelas* *Matth.* (1665. & 1559.) *Lugd.* 1424

6. *Idem* folio longiore cum auriculis subrotundis brevissimis. *An Convolvulus minimus, angusto brevi subrotundo folia* *Bocc. Mus. Part.* 2. 44. *Tab.* 33

7. *Convolvulus Græcus* Sagittæ foliis, flore albo Coroll. Inst. R. H. 1. * *Orobanchæ Theophrasti* *Ang.* *Viluppio*, & *Vilucchio vulgo*, ut & tres superiores

8. *Convolvulus argenteus umbellatus erectus* Inst. R. H. 84. * *Dorychnium vulgo* *Argentina* *Casalp.* 384

9. *Convolvulus minor argenteus repens acaulos ferme* Inst. R. H. 84

10. *Convolvulus maritimus nostras rotundifolius* Inst. R. H. 85. * *Brassica Marina* *Matth.* 497. *Soldanella* *Casalp.* 384. & *Ric.*

CONYZA maior vulgaris Inst. R. H. 454. * *Coniza maggiore* *Matth.* 918. *Conyza maior* *Casalp.* 501. *Baccharis* *Gesl.*

2. *Conyza Americana* Vrticæ folio, flore albo Inst. R. H. 455

CONYZA. vide CHRYSOCOME

CORIANDRVM minus testiculatum Inst. R. H. 316

CORIARIA vulgaris Vaill. in A& Ac R. Sc. Ann. 1711

CORINDVM ampliore folio, fructu maiore Inst. R. H. 431. * *Vescicaria* Matth. 1130. *Faba inversa* Casalp. 382. *Pisum Vescarium* C. B. *Halimolobos peregrinum* Fuchs. Paternostri di S. Domenico vulgo
2. *Corindum* folio & fructu minori Inst. R. H. 431

CORNVS fœmina Inst. R. H. 641. * *Cornus* vulgo *Sanguen* Casalp. 80. *Sanguino* Matth. 280. *Virga Sanguinea* Dod. *Sanguine* vulgo
2. *Cornus silvestris* mas Inst. R. H. 641. * *Cornus* Casalp. 109. *An Corniolo* Matth. 279. & Ric.

CORONA Imperialis Inst. R. H. 372. * *Lilium Persicum* C. B.

CORONA SOLIS Inst. R. H. 489. * *Helenium Indicum*, sive *Flor Solis* seminum cortice candida Casalp. 500. *Hec*, & sequens promiscue vocantur *Chrysanthemum Peruvianum* Dod. *Planta maxima Cortusi*, *Girafola* vulgo
2. *Eadem maxima*, Seminum cortice nigro † *Helenium Indicum*, seminum cortice nigro Casalp. 500

3. *Corona Solis* parvo flore, tuberosa radice Inst. R. H. 489. * *Tartusi bianchi* vulgo

4. *Corona Solis* altissima *Virgæ aureæ* foliis Inst. R. H. 490

5. *Corona Solis Trachelii* folio, radice repente (flore maiore). Inst. R. H. 490

CORONILLA maritima glauco folio Inst. R. H. 650

CORONOPVS Neapolitanus tenuifolius Inst. R. H. 128. * *Coronopus* vulgo *Herba stella sylvestris* Casalp. 329

2. *Coronopus Massiliensis* hirsutior latifolius Inst. R. H. 128

3. *Coronopus hortensis* (perennis) Inst. R. H. 128. * *Coronopus* Matth. 522. *An Coronopus* vulgo *Herba Stella sativa* Casalp. 329

CORYLVS sativa fructu oblongo. * *Nux Avellana urbana* oblongam nucem ferens Casalp. 38. *Nocciola* vulgo

2. *Corylus sylvestris* fructu oblongo, involucrio eleganter inciso. *Corylus sylvestris* fructu oblongo Lugd. 1712. *Descript.* *Nocciola salvatica* vulgo

3. *Corylus sylvestris* fructu rotundo cum involucrio longiore. *Corylus sylvestris* fructu rotundo Lugd. 101. *Descript.*

COTINVS Coriaria Inst. R. H. 610. *Cotino* Matth. 236. *Coccigrya Theophrasti*, *Cotinus Plinii* Lugd. *Scotano* vulgo

CRAMBE Orientalis Dents Leonis folio, Erucaginis facie Coroll. Inst. R. H. 14

CRA-

CRATAEGVS folio subrotundo serrato subtus incano Inst. R. H. 633.
* *Sorbi torminalis alterum genus in alpestribus Casalp.* 146. *Sorbus alpina* Gefn.

2. *Crataegus Italica* folio laciniato minori subtus lanato, fructu rotundo rubro Michel. H. Pis.

CREPIS *maritima angustifolia dentata*, flore luteo

2. *Crepis* folio leviter dentato Vaill. in Act. Ac. R. Sc. Ann. 1721. pag. 255. num. 1. * *Terracrepolus in Hetruria Casalp.* 113

3. *Crepis Chondrillæ* folio Vaill. in Act. Ac. R. Sc. Ann. 1721. num. 2

4. *Eadem* folio maculis sanguineis notato

CRITHMVM *maritimum maius glaucum*, caulibus erectis, foliorum lobis ternis longioribus & angustioribus, umbellis ex albo virescentibus. * *Haec duo Crithmi species in officinis pro Foeniculo marino sive maritimo promiscue usurpantur*

2. *Idem minus*, caulibus procumbentibus, foliorum lobis brevioribus

CROCVS *sativus* Inst. R. H. 350. * *Crocum vulgo Zafferanum Casalp.* 411. *Croco Matth.* 77. 78. *Zafferano Ric. & vulgo*

2. *Crocus vernus latifolius aureus* Inst. R. H. 352

3. *Crocus vernus angustifolius*, flore dilute purpureo. *Croci alterum genus silvestre, flore purpurascente Casalp.* 411

CRVCIATA *hirsuta* Inst. R. H. 115. * *An Crucialis Casalp.* 325. *Inguinaria Plinii quibusd.*

2. *Cruciata Florentina lutea minor*, partim glabra, partim hirsuta. *Crucialis in montibus exilis Casalp.* 325

3. *Cruciata, an palustris alba* Inst. R. H. 115

CVCVBALVS *Plinii* Inst. R. H. 339. * *Polemonia altera peregrina Casalp.* 258. *Alfina scandens baccifera C. B.*

CVCVMIS *sativus Aegyptiacus*, immaturo fructu albo, maturo vero subluteo. *lævi*

2. *Cucumis sylvestris. Asininus dictus* Inst. R. H. 104. * *Cocomero salvatico Matth.* 1288. *Cucumis sylvestris vulgo Cucumis asininus Casalp.* 204. *Cucumis erraticus Gefn. Cucumer Elateris Loh. Cocomero salvatico detto asinino Ric.*

CVPRESSVS *meta in fastigium convoluta*, quæ femina Plinii Inst. R. H. 587. * *Cupressus femina Casalp.* 134. *Cipresso femmina Matth.* 132. *Cipresso vulgo*

2. *Cupressus ramos extra se spargens*, quæ mas Plinii Inst. R. H. 587. * *Cupressus mas Casalp.* 134. *Cipresso maschio Matth.* 132. *Cipressa vulgo*

3. *Cupressus Lusitanica patula*, fructu minori Inst. R. H. 587

CYANVS *segetum flore caeruleo* Inst. R. H. 446. * *Flos Alysus caeruleus Marc.* 209. *Ciano minore Matth.* 537. *Cyanus qui vulgo Fioralisus in Hetruria Casalp.* 538. *Battisegola vulgo*

2. *Cya.*

2. *Cyanus montanus latifolius*, vel *Verbasculum Cyanoides* Inst. R. H. 445. * *Ciano maggiore* Matth. 536
3. *Cyanus floridus odoratus Turcicus* sive *Orientalis maior*, flore albo Inst. R. H. 446. * *Ambretta bianca vulgo*
4. *Cyanus floridus odoratus Turcicus* sive *Orientalis maior*, flore incarnato Inst. R. H. 446. * *Ambretta vulgo*
5. *Cyanus floridus odoratus Turcicus* sive *Orientalis maior*, flore luteo Inst. R. H. 446. * *Ambretta gialla vulgo*

CYCLAMEN orbiculato folio, inferne purpurascens Inst. R. H. 154.
* *Ciclamino* Matth. 620. *Cyclaminus*, vulgo *Pamporcinus* Casalp. 392. *Arthanita*. *Pane Porcino* Ric. *Pantherreno* vulgo

2. *Cyclamen folio anguloso* Inst. R. H. 155
3. *Cyclamen folio Hederaceo Polyanthes* Inst. R. H. 155
4. *Cyclamen radice exigua* Inst. R. H. 156. * *Cyclamini* vulgo *Pamporcini quoddam genus in Pisanis Collibus* Casalp. 392

CYNOGLOSSVM montanum maximum Inst. R. H. 139. * *Cynoglossa* quaedam in montibus Casalp. 440. *Hac, & sequentes Cynoglossi species usurpari possunt pro Cynoglossa Offic.*

2. *Cynoglossum montanum*, virenti folio, maiori flore Inst. R. H. 139
3. *Cynoglossum Creticum*, argenteo angusto folio Inst. R. H. 140
- Cynoglossum folio molli incano, flore cæruleo striis rubris variegato* Mor. H. R. Blef.

CYPEROIDES spica pendula longiore & angustiore Inst. R. H. 529

2. *Cyperoides silvarum latifolium*, caule exquisite triangulari, foliis ad margines ciliis instar pilosis & angustissime denticulatis, spicis strigosis, capsulis oblongis incurvis rarius dispositis & parum bifidis Michel. Nov. Plant. Gen. 56. num. 6
3. *Cyperoides spicis brevibus erectis*, e granis parvis & subhirsutis & glaucis dense congestis Mont. Cat. Stirp. Agr. Bon. Prodr. 29
4. *Cyperoides foliis Caryophyllæis*, caule rotundo triquetro, spicis floriferis multis
5. *Cyperoides angustifolium*, caule & spicis floriferis triangularibus, spicis autem seminalibus longe distantibus, pediculis brevibus insidentibus, squamis curtis, capsulis nitidis & fere splendentibus in cuspidem vix bifidam desinentibus Michel. Nov. Plant. Gen. 58. num. 19
6. *Cyperoides spicis parvis longe distantibus* Inst. R. H. 530

CYPERVS odoratus radice longa, sive *Cyperus Officinarum* Inst. R. H. 527. * *Cipera* Matth. 28. *Cyperus primus* Casalp. 189. *Cippero con radici lunghe ineguali e torte* Ric. *Cunzia* vulgo

2. *Cyperus odoratus radice longa*, simul cum caulibus tenuiore
3. *Cyperus rotundus odoratus parvus* Michel. Nov. Plant. Gen. 45. n. 6.
* *Cipera* Matth. 28. *Cyperus alter* Casalp. 189. *Cippero con radici olivari* Ric.
4. *Cyperus rotundus, esculentus angustifolius* Inst. R. H. 527. * *Traf* Matth. 573. & *Casalp.* 191. *Bacicci* vulgo

CYTISO GENISTA scoparia vulgaris, flore luteo Inst. R. H. 649.

* *Genista* genus quadrato iunco *Casalp.* 115. *Genista angulosa* & *scoparia*.
C. B. Scornabecco vulgo

CYTISVS glabris foliis subrotundis, pediculis brevissimis Inst. R. H. 648

2. *Cytisus Alpinus latifolius* (foliis utrinque acuminatis) flore racemoso pendulo Inst. R. H. 648. * *Laburnum vulgo Avornellum Casalp.* 113

3. *Cytisus Alpinus*, foliis longioribus utrinque acuminatis & subtus villosis, flore racemoso pendulo Michel. H. Pis.

4. *Cytisus glaber nigricans* (spicatus) Inst. R. H. 648

5. *Cytisus hirsutus*, foliis latis subrotundis, floribus primum luteis deinde rufescentibus, siliquis latis, calyce ampliori

6. *Cytisus hirsutus amarus sempervirens*, floribus e foliorum alis pendentibus luteis ac lituris sanguineis notatis, siliquis villosis incurvis. *Cytisus sylvestris* in Montibus *Casalp.* 114. An *Cytisus hirsutus* Inst. R. H. 647

7. *Cytisus Italicus hirsutus*, foliis brevioribus obrusioribus & pediculo orbatis, floribus glomeratis in foliorum alis, siliquis parvis dense congestis & villosis. *Cytisus Casalp.* H. Succ. pag. 12. num. 38. *Cytisus* in Collibus maritimis albidior, foliis forme sine pediculo haerentibus Eiusd. in Op. 114

8. *Cytisus humilis glaber*, foliis oblongis, floribus purpureis per caulem sparsis, calyce bilineari, siliqua nitida angusta sesquiunciali



AMASONIVM stellatum Inst. R. H. 257

DAUCVS vulgaris Inst. R. H. 307. * *Staphylinus silvestris* Dod. *Daucus* Offic.

2. Idem tenuifolius glaber

3. *Daucus maritimus annuus*, seminibus & radiis umbellæ crassioribus. * An *Staphylinus silvestris maximus*, sive *Daucus marinus Casalp.* 289

4. *Daucus annuus ad nodos floridus* Inst. R. H. 308. * *Gingidii* genus *Cicutaria* vocatum *Casalp.* 289

DELPHINIVM perenne montanum subhirsutum minus, foliis Aconiti tenuissime dissectis, flore cæruleo. An *Aconitum Lycotum* flore Delphinii I. *Silefiacum Clus. Hist.* XCV

2. *Delphinium Platani folio*, *Staphisagria* dictum Inst. R. H. 428. * *Staphisagria Casalp.* 589. *Staphis Agria Matth.* 1291. *Staphisagria*, & *Stafizaga Ric. Pedicularis Cord. Stafizzeca vulgo*

3. *Delphinium hortense*, flore maiore & simplici cæruleo Inst. R. H. 426. * *Fior Capuccio Casalp.* 69. 267. & 403. *Consolida Regalis Cast. Calcatrippa Cord.*

4. *Delphinium hortense*, flore maiore & simplici albo Inst. R. H. 427. * *Harum duarum Delphinii specierum semen pro Staphisagria in officinis nostris usurpatur*

DENS

DENS CANIS angustiore longioreque folio, flore suaverubente Inst. R. H. 378

2. Dens canis latiore rotundioreque folio, flore ex purpura rubente Inst. R. H. 378. * *An Dens caninus Casalp.* 410

DENS LEONIS alpinus maximus latifolius

2. Idem angustifolius

3. Dens leonis latiore folio Inst. R. H. 468. * *Dente di Leone Matth.* 535. *Vrinaria Adv. Taraxacon Offic.*

4. Idem folio glabro. * *Aphaca Casalp.* 508

5. Dens leonis angustiore folio Inst. R. H. 468

6. Dens leonis Asphodeli bulbulis Inst. R. H. 468. * *Cicorea Constanti-nopolitana Matth.* 533

7. Dens leonis tuberosa radice Inst. R. H. 468

8. Dens leonis foliis canescentibus villosis Inst. R. H. 468

9. Dens leonis alpinus Asplenii folio

10. Dens leonis alpinus glaber, Cichorii folio, costa viridi, floribus luteis, caulibus nonnihil foliosis

11. Dens leonis foliis minimis hirsutis & asperis Inst. R. H. 469

DENTARIA heptaphyllos Inst. R. H. 225. * *Dentaria maior Casalp.* 589.

2. Dentaria heptaphyllos baccifera Inst. R. H. 225. * *Dentaria minor Casalp.* 586. *Coralloides Cord.*

DICTAMNVS Creticus C. B. Pin. 222. Boerh. Ind. alt. H. L. Bat. P. I. 178. *Origanum Creticum latifolium tomentosum, seu Dictamnus Creticus Inst. R. H. 199. Dittamo Matth.* 743. & *Ric. Dictamnus Creticum Casalp.* 468. *Dittamo vulgo*

DIGITALIS latifolia (hirsuta & præalta) flore ferrugineo Inst. R. H. 166

2. Digitalis maior lutea vel pallida, parvo flore (foliis imis angustioribus, fructu semiunciali) Inst. R. H. 165

3. Digitalis latifolia, floribus albis, punctis quatuor ferrugineis notatis

4. Digitalis angustifolia glabra, floribus parvis albidis ac punctis quatuor ferrugineis notatis. *An Digitalis angustifolia lutea Inst. R. H. 166*

5. Digitalis minima Gratiola dicta Inst. R. H. 165. * *Gratiola Matth.* 734. *Gratia Dei Casalp.* 275. *Limnesium, sive Centauroides Cord. Centaurium aquaticum, forte Polemonium palustre amarum Hippocrati Veterinario Gesn. Hyssopum vulgare quorundam Col.*

6. Digitalis lutea magno flore Inst. R. H. 165

DIPSACVS silvestris, vel Virga pastoris maior Inst. R. H. 466. * *Vn altro Diffaco Matth.* 699. *Carduus fullonum Brunf. Labrum Veneris Cast.*

DORIA Narbonensium Boerh. Ind. Alt. H. L. Bat. Part. 1. 98. * *Herba Doria Casalp.* 503. *Panax Chironium Theophrasti Tab.*

2. Doria quæ Iacobæa Orientalis Limonii folio Boerh. Ind. Alt. H. L. Bat. Part. 1. 98. num. 4.

3. Doria quæ Iacobæa alpina foliis longioribus ferratis Boerh. Ind. Alt. H. L. Bat. Part. 1. 98. num. 3. * *Solidago Saracenis Fuchf. Consolida Saracenis Thal. Consolida Aurea Tab. & Offic.*

DORONICVM maximum, foliis caulem amplexantibus Inst. R. H. 488

2. *Doronicum Scorpoide*, radice candida, monantho, folio uno caulem amplexante H. Cath. * *Aconitum Pardalianches*. Radice, che ci si porta per *Doronic Ric.* 36

3. *Doronicum radice Scorpis* Inst. R. H. 487. * *Doronicum Pardalianches* minore chiamato falsamente *Doricio* Matth. 1140. *Doronicum Casalp.* 497

DORYCNIVM Monspeliensium Inst. R. H. 391

2. Idem villosum

3. Idem flore ex albo & rubro variegato

DRACOCEPHALVS latifolius glaber, *Lyfimachia lutea* folis Mor. Hist. Oxon. Part. 3. 417. Sect. 11. Tab. 21. fig. 2

DRACVNCVLVS polyphyllus Inst. R. H. 160. * *Minor Dracunculus* Marc. 145. *Dracontea minore* Matth. 624. *Dracunculus vulgo Dracontea Casalp.* 225. *Serpentaria vulgo*



CHINOPHORA maritima spinosa Inst. R. H. 636. * *Crista-mo* 11. Matth. 519

ECHINOPVS maior, flore candido, staminibus in medio caeruleis Inst. R. H. 463. * *Spina bianca d'alcuni* Matth. 702.

An quadam peregrina apud Nos foliis Acanthi minoribus candidis spinosis, &c. Casalp. 522. *Carduus sphaerocephalus* Cord.

2. Idem major, Acanthi folio ampliore

3. *Echinopus minor annuus magno capite* Inst. R. H. 463

ECHIVM vulgare Inst. R. H. 135. * *Echio* Matth. 1049. *Echion Casalp.* 436. *Buglossum sylvestre* Dod.

2. *Echium maius & asperius*, flore albo Inst. R. H. 135

3. *Echium annuum*, folio angusto ac verrucis rubris albisque notato, flore ex caeruleo purpurascente

4. Idem folio latiore bullato undulato ac verrucis candidis exasperato, flore caeruleo, tubo incurvo. *An Echium Creticum latifolium rubrum* Inst. R. H. 135

5. *Echium annuum foliis Lithospermi arvensis*, flore caeruleo parvo Micheli H. Pis.

ELAEAGNVS Orientalis angustifolius, fructu parvo olivæformi subdulci Coroll. Inst. R. H. 53. * *Oliuo di Boemia* Matth. 215. *Ziziphus Cappadocica* Plinii Lugd. *Ziziphus alba* Gesn.

ELICHRYSUM Africanum foetidissimum amplissimo folio, calyce argenteo Boerh. Ind. alt. H. L. Bat. P. 1. 126

2. Elichrysum Orientale Inst. R. H. 453

3. Elichrysum Italicum maritimum incanum, foliis angustissimis ac brevibus, capitulis umbellatis rotundioribus aureis. *Elichrysum seu Stoechas Citrina angustifolia* C. B. Pin. 264. Inst. R. H. 452. *Stoechas Citrina tenuifolia* Narbonensis I. B. 3. 154. *Stoechas Citrina* Dod. Pempt. 268. Matth. Ed. Valgr. fol. 1185. pag. 1100. * Hæc, & tres sequentes Elichrysi species promiscue usurpantur pro *stoechade citrina* Offic. vocanturque vulgo Tignamica corrupto nomine a thymiamate ut censet Vigna in Theophr.

4. Idem præaltum Linariæ folio angustissimo, capitulis luteis oblongis & in umbellam magis sparsam dispositis, calycibus oblongis pallidis

5. Elichrysum angustissimo folio Inst. R. H. 452. * *Helichryson* quam recentiores medici *Stoechadem Citrinam* vocant, alicubi *Tignamicam* Casalp. 484

6. Elichrysum Italicum odore gravi, angustissimo folio intorto, floribus umbellatis luteis, calyce longo angusto pallido

7. Elichrysum Africanum, foliis Linariæ serratis ac subtus incanis, capitulis maiusculis singularibus aureis longo pediculo insidentibus

* Ex seminibus a Domino Thoma Shaw Coll. Reginae apud Oxonienses socio per varias Africae provincias rerum naturalium observandarum gratia itinere instituto collectis & Michelio communicatis, tres aut quatuor diversæ Plantæ prodire, inter quas elegans hæc Elichrysi species adhuc superstes, cætera perierunt antequam semen perficerent

EMERVS Inst. R. H. 650. * *Emerus* Casalp. 117. *Calutea filiquosa* vel *scorpioides* C. B.

EPHEDRA maritima maior Inst. R. H. 663. * *Polygonum bacciferum* C. B.

2. Ephedra Cretica tenuioribus & rarioribus flagellis Coroll. Inst. R. H. 53

EPHEMERVM Virginianum flore cæruleo maiori Inst. R. H. 367

EPIMEDIVM Inst. R. H. 232

EQUISETVM altissimum scandens asperum monostachion & polystachion, fetis plerumque ramosis & prælongis. *Equisetum in sepibus* Casalp. 598. *Coda di Cavallo* III. Matth. 1083. Ed. Valgrif. in fol. Ann. 1568

EQUISETVM. vide **HYDROCERATOPHYLLON**

ERICA vulgaris glabra (Myricæ folio, flore purpureo) Inst. R. H. 602.

* *Scopa floribus purpurascens* Casalp. 104. *An Erica* Matth. 169

2. Erica maxima (ramis & foliis quaternis) alba Inst. R. H. 602

3. Erica maritima humilis, glabro Corios folio exadverso quaterno, costa non elata ac subtilissime sulcata, floribus oblongis purpureis elegantibus uno versu dispositis, calyce concolore. * *Scopa ramis humistratis circa stagna maritima* Casalp. 104

ERIOCEPHALVS capite rotundo maximo Vaill. in A& Ac. R. Sc. An. 1718. pag. 204. n. 1

2. *Eriocephalus vulgaris* capite turbinato, flore purpureo Vaill. in Aët. Ac. R. Sc. Ann. 1718. pag. 205. n. 7
3. *Eriocephalus alpinus* annuus, foliis lanceolatis, spinosior & patulus, capitulis pyriformibus purpureis turbinatis & confertim nascentibus.
4. *Eriocephalus leucographis* flore purpureo coronato Vaill. in Aët. Ac. R. Sc. Ann. 1718. pag. 205. n. 10
5. *Eriocephalus annuus lanceatus maior*, capitulis pyriformibus purpureis plerumque solitariis, squamis rigidioribus expansis & reflexis. *Carduus lanceatus Raii Hist. T. 1. 310. n. 1*
6. Idem minor, capitulorum squamis minoribus compactis. *An Carduus lanceatus, sive sylvestris Dodonæi I. B. 3. 58*

ERVCA latifolia alba, sativa Dioscoridis Inst. R. H. 227. * *Eruca sativa folio latiore Casalp. 360. Ruchetta Domestica Matth. 559*

2. *Eruca Romana* seu gentilis, siliqua angusta, folio lato Inst. R. H. 227
3. *Eruca maritima* foliis amplioribus, admodum succulentis, laciniatis, & alternis sectionibus sinuatis, flore luteo
4. *Eruca*, an tenuifolia perennis, flore luteo Inst. R. H. 227. * *Eruca sativa altera fruticosa Casalp. 360. Eruca Offic. Ruchetta vulgo ut & sequens*
5. *Eruca Campestris* annua minor, foliis laciniatis, flore luteo

ERYNGIVM latifolium planum Inst. R. H. 327. *Eringia piano Matth. 718*

2. *Eryngium planum minus* Inst. R. H. 327
3. *Eryngium vulgare* R. H. 327. * *Eringia Montano, Cacatreppola Matth. 716. 717. An Eryngium vulgo Iringum Casalp. 520. An Eringio Ric.*
4. *Eryngium maritimum* Inst. R. H. 327. * *Eringia Marino Matth. 717*

ERYSIMVM angustifolium maius Inst. R. H. 228

2. *Erysimum polyceratum*, vel corniculatum Inst. R. H. 228. * *Irionis tertia species Casalp. 361. Vn altro Irione Matth. 604*
3. *Erysimum annuum* foliis in paucas & longas lacinias divisus, floribus luteis exiguis, siliquis hirsutis corniculatis & ad caulem contractis. *Erysimum vulgare C. B. Pin. 100. Zannich. Ist. 287. Irion C. B. in Matth. 471. Erysimum Irion I. Tabern. Leon. 442*
4. Idem foliis latis multum laciniatis & ad Raphanum accedentibus. *Erysimum Tragi flosculis luteis iuxta muros proveniens I. B. 2. 863. Erysimum, Trag. 102. Irion, sive Erysimum Dod. Pempt. 714. Erysimum Dioscoridis Eiusd. Gall. 438. Verbena recta sive mas Fuchf. Hist. 592*

EVGENIA Indica Myrti folio deciduo, flore albo, fructu suaverubente molli leviter sulcato & odorato Michel. Nov. Plant. Gen. 226

EVONYMVS vulgaris, grana rubentibus Inst. R. H. 617. * *Siler quem vulgo Silium alii Fusaginem vocant Casalp. 128. Evonimo Matth. 209*

EVPATORIVM Cannabinum Inst. R. H. 456. * *Eupatorio commune Matth. 1069. Eupatorium Casalp. 486. Eupatorium cannabinum Offic. Eupatorio d' Avicenna Ric.*

FAGO-



AGOPYRVM vulgare scandens, calyculis florum alatis, semine nigro splendens H. Pis. *Fagopyrum maius scandens* Bot. Par. *Helxine Cissampelos altera*, *Atriplicis effigie* Lob. Icon. 629. *Convolvulum nigrum* Dod. Pempt. 396. * *Formentone Casalp.* 166

2. *Fagopyrum vulgare scandens*, calyculis florum nudis, semine nigro H. Pis. *Fagopyrum vulgare, minus, scandens* Bot. Par. 52. *Volubilis nigra* Tabern. Icon. 87. * *Formentone alterum genus Casalp.* 166. *Formento Saraceno Matth.* 418. *Polygonum hedevaceum* Col.

FAGVS Inst. R. H. 584. * & *Casalp.* 35. *Faggio Matth.* 233

FERRVM EQVINVM Germanicum, siliquis in summitate Inst. R. H. 400. * *Sferra cavallo vulgo*

FERVLA fœmina Plinii Inst. R. H. 321. * *Ferola Matth.* 837. *Ferula mas Casalp.* 286

2. *Ferula minor ad singulos nodos umbellifera* Inst. R. H. 321. * *Panan Asclepium Casalp.* 279

FICOIDES Africana, folio Plantaginis undulato, micis argenteis aspero Tournef. in Act. Ac. R. Sc. Ann. 1705. * *Cristalloide. Erba Cristallina vulgo*

2. *Ficoides, seu Ficus Aizooides, an Africana maior procumbens, triangulari folio ensiformi* H. L. Bat. 247

FILAGO maior humistrata repens, foliis expansis, capitulis maioribus conglobatis

2. *Filago annua erecta maior ramosa & prolifera, foliis expansis, capitulis florum in globulos congestis. Filago seu Impia* Dod. Pempt. 66. Inst. R. H. 454. *Vaill. in Act. Ac. R. Sc. Ann. 1719. pag. 391. Gnaphalium vulgare, Filago, Centunculus* Lob. Icon. 480. *Gnaphalium vulgare Tabern. Icon.* 389. * *Gnafalia vulgare Matth.* 909

3. *Eadem foliis ad caulem appressis, capitulis florum parvis in globulos congestis. Gnaphalium Germanicum* I. B. 3. 158. *Gnaphalium vulgare Fuchf. Lugd.* 1155. *Gnaphalium Fuchf. Hist.* 288. *Filago* Dod. Gall. 67. *Elichryso sylvestris Træg.* 321. Icon 1.

FILICVLA quæ *Adiantum nigrum officinarum*, pinnulis acutioribus Inst. R. H. 542. * *Adianto nero Ric.*

2. *Filicula Fontana maior, sive Adiantum album Filicis folio* Inst. R. H. 542

FILIPENDVLA vulgaris, an *Molon* Plinii Inst. R. H. 293. * *Filipendula Matth.* 913. & *Casalp.* 551

FILIX ramosa maior, pinnulis obtusis non denticatis Inst. R. H. 536. * *Felcie Femmina Matth.* 1253. *Filix fœmina Offic.*

2. *Eadem pinnulis denticatis*

3. *Fi-*

3. Filix ramosa minor, pinnulis dentatis Inst. R. H. 536
4. Filix non ramosa, dentata Inst. R. H. 536. * *Hæc & sequens in Officinis Filix mas vocantur*
5. Eadem maior. * *An Felce masculina Matth. 1352*

FOENICVLVM sativum annuum, dilute virentibus foliis, in multas & gradatim descendentes coniugationes divisis, capillamentis longioribus & crassioribus præditis, umbellis amplioribus luteis, semine crassiore albo dulci. *An Fœniculum dulce Azoricum Inst. R. H. 311. Finocchio dolce vulgo*

2. Fœniculum sylvestre præaltum, foliorum coniugationibus paucioribus, inæqualiter a se invicem distantibus, & in prælonga capillamenta divisis, umbellis parvis luteis, acriori & nigriori semine. *An Fœniculum vulgare minus, acriori & nigriori semine Inst. R. H. 311. * Fœniculum sylvestre Casalp. 282. Fœniculum, & Marathrum Offic. Finocchio vulgo*

3. Fœniculum maritimum, foliorum segmentis tenuissimis & rarioribus, umbellis parvis luteis, semine acriori & nigriori

4. Fœniculum sylvestre, caulibus tenuioribus fæctis, modo erectis, modo procumbentibus, foliorum portiunculis brevissimis, umbellis aureis rarioribus & tribus vel quatuor aut quinque corymbis compositis, semine nigricante, Aurantii fervido sapore

5. Fœniculum tortuosum Inst. R. H. 311. * *Seseli Massiliense Offic.*

6. Fœniculum annuum, umbella contracta oblonga Inst. R. H. 311. * *Kisnaga Matth. 554. Cumini sativi genus quod Visnaga vocatur Casalp. 285. Gingidium Ang.*

FOENVM GRAECVM sativum Inst. R. H. 409. * *Fien Greco Matth. 438. & Ric. Fœnum Græcum Casalp. 239. & Offic.*

FRAGARIA vulgaris Inst. R. H. 295. Fragaria Matth. 1075. * *Herba di Fragole Ric. Fragola vulgo*

2. Fragaria fructu albo Inst. R. H. 296

3. Fragaria sylvestris alpina, flore parvo, fructu rotundo exiguo

4. Fragaria sativa atque spontanea, fructu rubro tuberculoso, circa calycem seminibus destituta

5. Fragaria Inglese di fiore mezzo pieno Zannon. 97

6. Fragaria sylvestris sterilis maior ac sativam plane referens, flore maiore. *Fragaria sterilis maior Mentz. Pug.*

7. Fragaria sterilis minor non repens & acaulos ferme, flore minimo ex albo carneo, petalis cordatis

FRANCA maritima supina saxatilis glauca Ericoides sempervirens, flore purpureo Michel. Nov. Plant. Gen. 23. Tab. 22. fig. 1

FRANGVLA Inst. R. H. 612. * *Frangola Matth. 1334. Alnus baccifera Tabern.*

FRAXINELLA Inst. R. H. 430. * *Dictamnium album, seu Fraxinellum Casalp. 589. Dittamo bianco Matth. 144. Dittamo bianco, Dittamo Fraxinella Ric.*

FRAXINVS florifera botryoides Inst. R. H. 577. * *Fraxini fructus in Officinis vocantur Lingua Avis*

FRITILLARIA maxima, flore obsoletæ purpuræ Inst. R. H. 377

FVMARIA Florentina scandens, viticulis longissimis, foliis latioribus, floribus albis deorsum reflexis, cum rictu atropurpureo, in spicam cernuam digestis. *Fumaria alba Adv. 338. Fumaria altera caulibus longioribus, flore candicante Casalp. 272*

2. *Fumaria Officinarum* foliis glaucis, floribus in spica longiuscula recta dispositis, rubris, rictu atropurpureo. *Fumaria Officinarum & Dioscoridis, flore purpureo C. B. Pin. 143. * Fumaria piedi di Gallina prima Matth. 1218. Hac & sequens Fumaria ustiores in Officinis sunt, vocanturque Fumaria, Fumus Terra, Capnos, & Fumosterno Ric.*

3. Eadem foliis maioribus viridibus & in oblongos lobos divisis, floribus in spica recta digestis, rubris, inferna parte candicantibus, rictu saturatius purpureo. * *Fumaria piedi di Gallina seconda Matth. Descript. 1219. & Fumaria fig. 1217. Fumaria & Fumus terre Casalp. 272*

4. *Fumaria lutea C. B. Pin. 143. * Coridali Split Matth. 1219. Split Casalp. 271*

5. *Fumaria bulbosa, radice cava, maior, flore albo Inst. R. H. 422*

6. *Fumaria bulbosa, radice cava, maior, flore rubro dilutiore Inst. R. H. 422. * Leontopetalon alterum Casalp. 271. Haec dua Fumaria bulbosæ species in Offic. vocantur Aristolochia cava, & Radix cava*



ALEGA vulgaris floribus cæruleis Inst. R. H. 398. * *Ruta Capraria, Lavaneſe Matth. 780. Caprago, vulgo Galega, in Hetruria Avaneſe, floribus purpureis Casalp. 249. Hac & sequens in Officinis promiscue vocantur Ruta Capraria, seu Caprago, & vulgo Capraggine*

2. *Galega vulgaris floribus penitus candicantibus Inst. R. H. 399*

GALEOBDOLON foliis Vrticæ dilute virentibus, flore luteo. *Galeobdolon Dill. Cat. Giſt. 49. & Nov. Plant. Gen. 102. Galeopsis five Vrtica iners, flore luteo I. B. 3. 323. Inst. R. H. 185*

2. *Idem foliis atrovirentibus*

3. *Galeobdolon foliis Vrticæ amplioribus & maculatis, flore luteo. Galeopsis lutea amplioribus foliis maculatis Inst. R. H. 185*

GALEOPSIS procerior fœtida spicata Inst. R. H. 185

2. *Galeopsis hirsuta fœtida, Melissæ folio, spica longissima alba*

3. *Galeopsis Hispanica frutescens, Teucrii folio Inst. R. H. 186*

4. *Galeopsis palustris, Betonicæ foliis, flore variegato Inst. R. H. 185.*

* *Tertiola Casalp. 451. Betonica fœtida Geſn.*

GALEOPSIS, vide CANNABINASTRVM, & GALEOBDOLON

GALLIVM album Linifolium Barr. Obs. 12. n. 99

2. Gallium album vulgare (sarmentosum latifolium) Inst. R. H. 115.

* *Lappago Casalp.* 325. *Mollugo C. B.*

3. Gallium Alpinum latifolium minus, floribus albis odoratis

4. Gallium Alpinum pumilum erectum angustifolium album

5. Gallium luteum Inst. R. H. 115. * *Gallio Matth.* 1190. *Galion flore luteo Casalp.* 325

6. Gallium nigro purpureum montanum tenuifolium Inst. R. H. 115

GENISTA iuncea Inst. R. H. 643. * *Genista iunco rotundo robustiore ac magis flexibili Casalp.* 115. *Genista Offic. Ginestra vulgo*

2. Genista Florentina frutescens, tota glabra, viminibus angulosis & plerumque triangularibus, foliis partim acutis partim retusis, floribus luteis, siliquis glabris. *An Genista maritima frutescens Linifolia, caule alato Coroll. Inst. R. H. 44.*

3. Genista, an ramosa foliis Hyperici Inst. R. H. 643

4. Genista tinctoria Germanica Inst. R. H. 643

5. Genista tinctoria Germanica, foliis angustioribus Inst. R. H. 643. * *An Ginestra Matth.* 1295

6. Genista tinctoria Linifolia * *Coroneola seu Corneola Casalp.* 251. *Flor Tinctorius Fuchs.*

7. Genista radiata, sive Stellaris Inst. R. H. 643

GENISTA SPARTIVM maius, longioribus aculeis Inst. R. H. 645. Bot. Par. 78. * *An Spina Christi vulgo Casalp.* 117

2. Genista Spartium minus Germanicum Inst. R. H. 645. * *Alius suffrutex Coroneola similis altior Casalp.* 251

GERANIVM Batrachioides folio Aconiti, flore albo lineis cæruleis variegato Inst. R. H. 266

2. Geranium Batrachioides, Gratia Dei Germanorum Inst. R. H. 266

3. Idem Alpinum & minus, flore purpureo-violaceo, petalis leviter cordatis

4. Geranium Batrachioides odoratum Inst. R. H. 266

5. Geranium Batrachioides, flore purpureo reflexo, Italicum Barr. Icon. 39

6. Geranium Romanum versicolor sive striatum Inst. R. H. 267

7. Geranium tuberosum maius Inst. R. H. 267. * *Geranio I. Matth.* 902

8. Geranium Argenteum Alpinum Inst. R. H. 267

9. Geranium Columbinum maximum, Asphodeli radice, foliis profunde dissectis, floribus saturate purpureis, petalis pene cordatis octo lineas longis & sex latis. *Geranium sanguineum, maximo flore Inst. R. H. 267*

10. Idem flore purpureo, venis concoloribus & saturatioribus distincto, externe valde diluto, petalis cordatis, septem lineas longis & sex latis

11. Idem maius, flore saturate purpureo, petalis altius cordatis, octo lineas longis, & quinque latis

12. Geranium maius, flore parvo saturate purpureo. *Geranium hemato-des purpureum, parvo flore, Italicum Barr. Obs.* 55

13. Idem maius, foliis simpliciter laciniatis, flore purpureo minore, petalis cordatis

14. *Geranium Columbinum*, dissectis foliis, pediculis florum longissimis Inst. R. H. 268
15. *Geranium Columbinum maius*, foliis tenuiter dissectis, foliis florum bifidis Inst. R. H. 268
16. *Geranium folio Malvæ rotundo* Inst. R. H. 268. *Geranio II. Matth.* 903. *Pic Colombino Ric.*
17. *Geranium Africanum arborescens*, Malvæ folio plano & lucido, flore elegantissimo kermisino Boerh. Ind. Alt. H. L. Bat. Part. 1. 262
18. *Geranium Africanum arborescens*, Ibis folio rotundo (circulo nigricante infecto) Carlinæ odore Herman. H. L. Bat. 275
19. *Geranium Africanum frutescens*, Malvæ folio laciniato odorato instar Melissæ, flore purpurascens Boerh. Ind. Alt. H. L. Bat. Part. 1. 263
20. *Geranium Africanum frutescens* (viriculis procumbentibus) Malvæ folio laciniato & odorato Herman. H. L. Bat. 277
21. *Geranium Africanum Alchimillæ hirsuto folio* (circulo nigricante infecto) floribus albidis Herman. H. L. Bat. 282
22. *Geranium Africanum* (procumbens) foliis inferioribus Afari, superioribus Staphysagriæ maculatis, splendentibus, Acetosæ sapore Boerh. Ind. Alt. H. L. Bat. Part. 1. 262
23. *Geranium triste*, sive *Indicum noctu olens* Inst. R. H. 270
24. *Geranium Alpinum*, *Coriandri folio*, longius radicum, flore purpureo maiore Michel. H. Pif.
25. *Geranium Rubertianum rubens maius & maiori flore* Michel. H. Pif. *An Geranei Rubertiani altera species, flore maiore Adv.* 296
26. *Geranium Robertianum l. viride* Inst. R. H. 268. * *Geranio V. Matth.* 906. *Panax Herculeum Ang. Rupertiana Casalp. Herba Ruperti Lugd.*
27. *Geranium Cicutæ folio*, acu longissima Inst. R. H. 268
28. *Geranium Cicutæ folio inodorum* Inst. R. H. 269
29. *Geranium Cicutæ folio minus supinum* Inst. R. H. 269
30. *Geranium folio Althææ* Inst. R. H. 268. * *Geranio VI. Matth.* 907

GEVM rotundifolium maius Inst. R. H. 251

GLAUCIVM foliis multum laciniatis & crispis, flore luteo, siliqua prælonga glabra. *Papaver sylvestre corniculatum* Trag. 123. *Papaver cornutum* Cord. Hist. 131. * *Papavero Cornuto Matth.* 1116. *Papaver Corniculatum Casalp.* 270

2. Idem flore pallido
3. *Glaucium* foliis parum laciniatis, flore luteo, siliquis asperis * *Hæ tres Glaucii species usurpari possunt pro Papavere Cornuto Offic. & Ric.*
4. *Glaucium Orientale*, flore magno rubro Coroll. Inst. R. H. 18

GLAVX maior palustris, flore herbaceo Bocc. Mus. Part. 2. 105

GLOBVLARIA vulgaris Inst. R. H. 467. * *Bellis cærulea C. B.*

2. *Globularia montana humillima repens* Inst. R. H. 467

GLYCYRRHIZA capite echinato Inst. R. H. 389

2. *Glycyrrhiza filiquosa vel Germanica* Inst. R. H. 389. * *Glicirrhiza, e Regolitia Matth.* 688. *Glyciriza vulgo Liquiritia Casalp.* 251. *Lagorizia Ric. Glycyrrhiza Offic Liquiritia & Vgurizia vulgo*

G R A M I N V M

O R D O I

Gramina Loliacea

GRAMEN loliaceum, radice repente, five Gramen officinarum Inst. R. H. 516

2. Gramen loliaceum, radice repente, five Gramen officinarum, aristis longioribus donatum Inst. R. H. 516

3. Gramen loliaceum, radice repente, maritimum Inst. R. H. 416

4. Idem totum glaucum

5. Gramen loliaceum corniculatum, spicis villosis Inst. R. H. 516

6. Gramen loliaceum Alpinum, foliis latis, subtus & ad margines hirsutis, spicis corniculatis glabris & aristatis

7. Gramen loliaceum villosum latifolium perenne, spicis partialibus multiplicibus & aristatis

8. Gramen loliaceum corniculatum, veluti fruticosum, foliis angustissimis Inst. R. H. 517

9. Gramen loliaceum, spicis articulosis erectis Inst. R. H. 517

O R D O II

Gramina Secalina

GRAMEN spicatum vulgare, secalinum Inst. R. H. 527

2. Gramen secalinum, bulbosa radice, seu ex Alepo Bauhini Scheuchz. Agrostograph. 19

O R D O III

Gramina Spicata locustis simplicibus

GRAMEN spicatum semine miliaceo albo Inst. R. H. 518

2. Gramen spicatum, spica cylindracea longioribus villis donata

3. Gramen spicatum, spica cylindracea tenuissima longiore Inst. R. H. 520

4. Gramen spicatum, spica cylindracea longissima Inst. R. H. 519

5. Gramen typhioides alpinum, spica brevi densa & veluti villosa Scheuchz. Prodr. Gram. 17

6. Gramen spicatum aristis pennatis Inst. R. H. 518

7. Gramen spicatum secalinum maritimum pumilum repens, Arundinis folio & facie, foliis superna parte villosis, spica laxa non aristata Michel. H. Pis. 72

8. Gra-

8. Gramen spicatum secalinum maritimum maximum, spica longiore Inst. R. H. 518

O R D O IV

Gramina spicata locustis biglumibus

- GRAMEN avenaceum montanum Inst. R. H. 524
2. Gramen anthoxanthum spicatum Inst. R. H. 518

O R D O V

Gramina Dactyloidea

- GRAMEN dactylon, radice repente, sive Gramen officinarum Inst. R. H. 520. * *Gramen Casalp.* 183. *Sanguinella Matth.* 1054
2. Gramen dactylon minus, multiplici panicula, spicis ab eodem exortu geminis Michel. H. Pis. 75
3. Gramen dactylon folio latiore Inst. R. H. 520
4. Gramen dactylon folio latiore, spicis nigris disiunctis Bot. Par. 85. num. 36

O R D O VI

Gramina Miliacea glumis simplicibus

- GRAMEN arundinaceum Halepense, Tragopogonis folio, D. Bobart. Plux. Alm. Phytogr. Tab. 32. fig. 1
2. Gramen paniculatum aquaticum, Phalaridis femine Inst. R. H. 523
3. Gramen paniculatum aquaticum, Phalaridis femine, folio variegato Inst. R. H. 523
4. Gramen miliaceum alpinum erectum latifolium, panicula sparsa aristata, locustis lineam longis
5. Idem angustifolium, panicula sparsa non aristata
6. Idem supinum, panicula sparsa non aristata
7. Gramen caninum supinum vineale latifolium serotinum, panicula sparsa, locustis minimis non aristatis
8. Gramen paniculatum supinum (præcox) ad infima culmorum genicula foliorum capillarium fasciculis donatum (aristatum) Scheuchz Agrostograph. 141

O R D O VII

Gramina Avenacea

- GRAMEN avenaceum, utriculis lanugine flavescentibus Inst. R. H. 525
2. Gramen nodosum, avenacea panicula Inst. R. H. 525
 3. Gramen avenaceum juncoides, foliis angustissimis, panicula quoque versu expansa, locustis albicantibus bilinearibus, glumis per basim villosis & in linearem aristam desinentibus
 4. Gramen pratense paniculatum molle Inst. R. H. 522
 5. Gramen caninum paniculatum molle Inst. R. H. 522
 6. Gramen avenaceum capillaceo folio, panicula ampliore, locustis splendentibus Inst. R. H. 525
 7. Gramen avenaceum parvum procumbens, panicula non aristata Inst. R. H. 525
 8. Gramen avenaceum, sparsa panicula speciosa, locustis minimis Mor. Hist. Oxon. Part. 3. 215. sect. 3
 9. Gramen avenaceum parvum procumbens, panicula non aristata Raii Hist. 1288

O R D O VIII

Gramina locustis compositis panicula sparsa

- GRAMEN avenaceum altissimum glabrum, foliis asperis, panicula pene aristata (glumis ab basim villosis) caule pleno rigido D. Michel. H. Pis. 74.
 * Hoc procul dubio est *Ampelodesmos* cuius meminit Plinius L. XVII Hist. Nat. cap. 23. non solum enim in Sicilia, sed in Ora etiam maritima Neapolitana, ac nonnullis Adriatici litoris locis huius Graminis foliis siccatis, ac deinde madefactis rustici utuntur viminum loco ad Vites continendas, quemadmodum saepius mihi narravit Michellius
2. Gramen avenaceum aquaticum Inst. R. H. 526
 3. Gramen paniculatum alpinum latifolium, panicula heteromalla, locustis semiuncialibus breviter aristatis
 4. Gramen avenaceum, locustis villosis angustis candicantibus & aristatis Inst. R. H. 526
 5. Gramen avenaceum, locustis angustis glabris candicantibus & aristatis Inst. R. H. 525
 6. Gramen paniculatum alpinum, radice crassissima, foliis rigidis (superna parte magis glaucis) striatis & asperis, panicula fusca non aristata Micheli. H. Pis. 75
 7. Gramen Orientale paniculatum, Portulacæ semine Coroll. Inst. R. H. 39
 8. Gramen pratense paniculatum altissimum, locustis parvis splendentibus non aristatis Inst. R. H. 524

9. Gra-

9. Gramen paniculatum, spicis crassioribus & brevioribus Inst. R. H. 521
10. Gramen paniculatum alpinum, foliis prælongis, spicis crassioribus & brevioribus, staminulis florum albis
11. Gramen paniculatum maritimum vulgatissimum Raii Synopf. Ed. 2. 259. num. 18. & Ed. 3. 409. num. 6
12. Gramen paniculatum alpinum angustifolium, panicula non sparsa, locustis pene aristatis
13. Gramen paniculatum perenne, capillaceo folio, panicula heteromalla, locustis longioribus aristatis
14. Gramen alpinum angustifolium paniculatum proliferum
15. Gramen paniculatum angustifolium, panicula uno versu disposita & pene aristata
16. Gramen paniculatum alpinum, angustifolium, caulibus reclinatis, panicula sparsa & quoquo versu tendente, locustis parvis non aristatis
17. Gramen Avenaceum minus, foliis inferioribus capillaceis, superioribus vero latoribus Inst. R. H. 525. Bot. Par. 94. num. 8
18. Gramen paniculatum Alpinum, foliis latis brevioribus & carinatis, panicula heteromalla densiore, locustis lanceatis mutilis
19. Gramen pratense (annuum) paniculatum minus album (panicula heteromalla) Inst. R. H. 521
20. Gramen filicinum rigidiusculum Bot. Par. 92. num. 73. Tab. 18. fig. 4. *Gramen minus vulgare, panicula rigida* Inst. R. H. 522

O R D O I X

Gramina Bromoidea

- GRAMEN avenaceum panicula sparsa, locustis maioribus aristatis Inst. R. H. 526
2. Gramen avenaceum spicatum alpinum, spica heteromalla, locustis semuncialibus muticis
 3. Gramen bromoides, locustis maximis, lanuginosum, Italicum Scheuchz. Hist. Gram. pag. 261
 4. Gramen bromoides murorum lanuginosum erectum, locustis amplioribus aristatis in panicula compacta propemodum spicata & veluti in Alopecuroide dispositis Michel. H. Pis. 76
 5. Gramen bromoides annuum, caule pedali (vix se sustinens) locustis maioribus compressis lanuginosis & aristatis Mich. H. Pis. 75
 6. Gramen bromoides annuum, caule pedali (vix se sustinens) locustis maioribus compressis glabris Michel. H. Pis. 76
 7. Idem præcox, locustis minoribus aristatis
 8. Gramen pratense annuum minus, panicula lata speciosa heteromalla aristata Michel. H. Pis. 76
 9. Gramen tomentosum Creticum spicatum, spica purpurea Coroll. Inst. R. H. 39
 10. Gramen spicatum, spica purpureo argentea molli Tournefortii alterum, locustis maioribus Michel. H. Pis. 72
 11. Gramen spicatum, spica cylindræa molli & laxa Inst. R. H. 520
 12. Gra-

12. Gramen paniculis elegantissimis sive *ἑσπερίαις* maius Inst. R. H. 522
 13. Gramen paniculis elegantissimis minimum Inst. R. H. 522
 14. Gramen paniculatum maius perenne, locustis magnis tremulis Michel.
 H. Pif. 75
 15. Gramen tremulum minus, locustis parvis triangulis D. Sherard. Raii
 Meth. Plant. 179

GRAMEN *dactylon* Indicum esculentum, spica articulata Mont. Cat.
 Stirp. Agr. Bon. Prodr. 63

2. Gramen *dactylon* Orientale maius Frumentaceum, semine Napi
 Eiusd. Ibid.

GRANADILLA Indica scandens & sempervirens, radice repente, foliis
 palmatis, flore magno albido, quadruplici filamentorum versicolorum serie
 obvallato, fructu aureo ovi gallinacei magnitudine & forma. *An Grana-*
dilla polyphyllus fructu ovato Inst. R. H. 241

* *Venustissima hac Granadilla species ex qua nam America provincia ad*
nōs advecta primum fuerit ignoramus. Vulgatissima tamen nobis nunc est &
ad topiaria opera valde expetita, utpote quæ capreolis suis excelsos quosque
parietes scandat, & foliis saturatius virentibus vestiat hyemis rigoribus in-
visita, præterea uberi florum ac fructuum proventu oculos non parum oblectet.
Radix eius fibrosa est, fragilis, colore ex pallido albicante, sapore subdul-
ci veluti recentis fabæ, geniculata repens ac admodum prolifera. Sarmenta
emittit multa intus fungosa, quæ si fulcrum nullum reperiant gracilia perma-
nent, ac terram tangentia facile se propagant e geniculis, sive alis foliorum
fibras demittendo: Si vero capreolis suis arborem vel parietem arripiant, in trun-
cum insignem crescunt ligno levissimo constantem, & Hederæ, vel potius Pe-
riplocæ foliis oblongis Inst. R. H. quæ excelsam quamdam arborem conscende-
 rit ligni ad instar porosum ac subtilissimis tubulis constans. Folia simul cum
 capreolis ad singula internodia e sinu foliorum duorum lunatorum prodeunt
 plantæ teneræ parva integra vel trifida, adultæ vero magna palmata seu quin-
 quefariam & quandoque septifariam scissa, lævia nervosa & aliquantum ve-
 nosa, superne saturatius virentia inferne glauca, odore gravi ferme Xyridis,
 sapore fatuo. Harum incisura media longior est, cæteræ gradatim minores,
 omnes autem in medio latiores, in apice & petiolum versus extenuatæ, nusquam
 serratæ vel laciniatæ ut in nonnullis aliis Granadilla speciebus contingit. Ma-
 gnitudine admodum variant hæc folia pro plantæ ætate vigore vel faciliore
 ascensu, a biunciali siquidem, ad spithamalem amplitudinem perveniunt. Pe-
 tiolo brevi adnectuntur dilute virescente, superna parte in canaliculum effor-
 mato, cuius margines binis utraque parte minutis verrucis seu clavis nigri-
 cantibus muniuntur, e quorum extremitate in ingenti æstu guttulam liquoris
 mellei pellucidi distillare observavi. Quotannis ab Iunii mensis initio ad Octo-
 brem totum usque flores ex alis foliorum profert figura illi omnino similes qui
 a Cl. Tournefortio pingitur Tom. II. Inst. R. H. Tab. 123. Sed per omnia ma-
 iores. Calycis triphylli exterioris laminae tenues sunt, cochlearis instar exca-
 vata, dilute virentes, & dum flor expanditur decidunt. Calyx interior in
 laminas quinque petalis similes dividitur, crassas, e lato principio sensim in
 acutum productas, in apice retusas & aculeo molli hamato instructas, costu-
 lis externe per longitudinem distinctas, extus dilute virentes, intus autem
 can-

candicantes. Petala quinque pyramidata obtusa plana, magnitudine laminarum calycis, candida & ferme pellucida. Calyx in centro floris acetabulum insigne efformat, cuius labia duplici corolla seu sepe obvallantur. Exterior nempe duobus tribus vel quatuor ordinibus mollium filamentorum semuncialium ex albo & caruleo eleganter variegatorum constat, interior vero tribus pariter ordinibus filamentorum semilinearium ferrugineorum, apice crassiusculo, exiguos clavos aliquatenus representantium. E supradicti acetabuli centro surgit stilus columnaris, qui ad acetabuli os perveniens in patinam veluti quamdam expanditur & petalorum ac filamentorum plano coequatur, acetabuli cavitatem perfecte claudens, quæ melleo pellucido liquore repleta est; deinde vero columnarem rursus formam induit ex albo nonnihil virescens, & ad semuncialem altitudinem exporrigitur. In summitate finditur in quinque radios complanatos & nonnihil incurvatos, quorum extremitatibus apices seu testiculi oblongi compressi aurei & in filiquas veluti duas divisi aureo pulvisculo refertas ita adnectuntur ope fili seu axis cuiusdam, ut versatiles sint, in flore nempe nondum recluso clavis seu capillamentis Embryonis apprimuntur, in aperto vero, acetabulum versus inclinantur. In centro radiorum horum apices substantium erigitur Embryo, seu bacca ovata exigua e viridi pariter albicans, cuius summitati innascuntur tubæ tres vel quatuor claviformes e nigro purpureo variegata, & versus apices in aperto flore reclinatos diriguntur, adeo ut apicum debiscentium pulvisculus capitulis harum tubarum scabris & glutinosis facile adhareat. Floris odor veluti Hyacinthi, sed nonnihil gravis. Fructus ovi gallinacei magnitudine & forma, per maturitatem aureus, cortice laevi crasso fungoso intus candido, in tres veluti cellulas dividitur ut exacte demonstrat Tab. 124. Tom. II. Inst. R. H. Semina exigua offae forma & nigra punctulis seu fossulis albis variegata in vesiculis quibusdam rubris inequalibus continentur liquore lento rubente subacido repletas. Notandum insuper est florum aridum non decidere maturo fructu ut in Helleboro paucisque aliis plantis accidit. Cl. Michelius hanc nobis vulgatissimam Granadilla speciem nulli ex iis quæ a variis Auctoribus describuntur vel pinguntur exacte respondere animadvertit. An vero eadem ipsa sit cum aliis nomine tenus a Botanicis designatis, iudicari ex descriptione nostra facile poterit.

2. Granadilla folio Hederaceo, flore (subviridi) & fructu minimis Inst. R. H. 241

GROSSVLARIA fructu maiore, villis longis rarius dispositis infecto, spinis rectis. * *Vva spina*, *Vva marina*, & *Vva crespina domestica* Matth. 184. *Vva spina* vulgo *Casalp.* 99

2. Eadem foliis parvis, spinis ternis in apice nonnihil aduncis munita, acinis parvis pubescentibus. * *Vva spina salvatica* Matth. 184. Hæc, & superior *Grossularia* species in Offic. audit *Grossularia*, *Vva crispa*, & vulgo *Vva spina*

3. *Grossularia* multiplici acino, sive non spinosa hortensis rubra, sive *Ribes* Officinarum Inst. R. H. 639. * *Alvis* vulgo *Rhibes* *Casalp.* 99. *Ribes* vulgare Matth. 185. *Ribes*, & *Ribesum rubrum* Offic.

GVAIACANA angustiore folio Inst. R. H. 600. * *Ermellinus* *Casalp.* 104. *Loto d' Affrica* Matth. 278



ARMALA Inst. R. H. 257. * *Ruta salvatica*. Harmola Matth. 778. Harmel Constantinopolitanorum Casalp. 573. Harmel. Ric.

HEDERA arborea Inst. R. H. 613. * *Hedera baccis in maturitate nigris* Casalp. 92. *Hedera arborea* Matth. 659. *Hellera* Ric. & vulgo

HEDYPNOIDASTRUM perenne glabrum & longius radicum, folio Dentis leonis eleganter laciniato, flore ampliore. *Hedypnois Alpina minor saxatilis glabra*, *Dentis leonis folio*, perennis, ex Montibus *Petrae Apuanae Micheli H. Pis. Taraxacoidastrum Dentis leonis folio ad summitate radiato* Vaill. Nov. Plant. Gen. in Act. Ac. R. Sc. Ann. 1721. pag. 235. numer. 2. * *Trinciarella vulgo*

2. *Hedypnoidastrum* perenne subhirsutum & patulum, radice brevi præmorsa, *Dentis leonis folio*, flore parvo luteo, ac inferna parte ex albo ferrugineo

HEDYPNOIS annua Inst. R. H. 478

HEDYSARUM clypeatum flore suaviter rubente Inst. R. H. 401

2. *Hedysarum clypeatum* flore albido Inst. R. H. 401

3. *Hedysarum triphyllum Canadense* Inst. R. H. 401

4. *Hedysarum triphyllum Americanum*, foliis minoribus & rotundioribus

HELIANTHEMUM vulgare, flore luteo Inst. R. H. 248. * *Panace Chironio* Matth. 785. *Chironia* Casalp. 397. *Hyssopus Campestris* Trag. *Gratia Dei* Gesn. *Consolida aurea* Cord. *Chamaecistus* C. B.

T A B. VI. 2. *Helianthemum Venetum* erectum elatius & ferme glabrum, foliis oblongis atroviridibus quasi lucidis, flore luteo minore * *Pictor verticillos quosdam foliorum male expressit in Icone*, & pilos iusto maiores

3. *Helianthemum maritimum* procumbens, *Rorismarini folio* superne glauco, inferne simul cum caulibus incano, floribus albis

HELLEBORUS niger foetidus Inst. R. H. 272. * *Enneaphyllon* Casalp. 583. *Consiligo* Gesn. *Veratrum nigrum* Dod.

2. *Helleborus niger hortensis*, flore viridi Inst. R. H. 272. * *Vn altro Elleboro nero* Matth. 1281. *Helleborus niger* Casalp. 581. *Elleboro nero*. *Noccha* Ric. 37. & vulgo

3. *Helleborus niger hortensis*, flore viridi, alter

4. *Helleborus niger* foliis dissectis Inst. R. H. 272

5. *Helleborus niger* angustioribus foliis (flore albo vel rosco) Inst. R. H. 272. * *Elleboro nero* Matth. 1200. *Hellebori nigri alterum genus* Casalp. 581. *An Elleboro nero dal fior pavonazzo* Ric. 37. *Helleborus niger verus* Ger. *Veratrum nigrum legitimum* Clus.

HERMODACTYLVS folio quadrangulo Coroll Inst. R. H. 50. * *Saetryrium* Casalp. 427

HER-

HERNIARIA montana saxatilis perennis glabra (viticulis longioribus humi proiectis) Michel. H. Pis. * *Hac, & sequens usurpari possunt pro Polygono minore, Herba Turca, & Millegrana Offic., & Herniaria Ric.*

2. *Herniaria fruticosa lignosa subhirsuta maritima, radice exigua Micheli H. Pis.*

HESPERIS hortensis flore purpureo Inst. R. H. 222. * *Viola Matronalis C. B.*

2. *Hesperis lutea, filiquis striatissimis Inst. R. H. 222. * Draba lutea C. B.*

3. *Hesperis Allium redolens Inst. R. H. 222. * Alliaria Matth. 891*

4. *Eadem foliis altius incisis*

5. *Hesperis Leucoii folio latiore non serrato, flore luteo parvo, filiqua quadrangula Michel. H. Pis. * Viola alba quadam lutei coloris in montibus, foliis rotundioribus Casalp. 369*

6. *Hesperis Leucoii folio serrato, filiqua quadrangula (flore luteo maiore) Inst. R. H. 223*

7. *Hesperis Leucoii folio angusto non serrato, filiqua quadrangula longiore & angustiore Michel. H. Pis.*

8. *Hesperis Leucoii folio angusto & laeviter serrato, filiqua quadrangula*

9. *Hesperis exigua lutea, folio dentato angusto Boerb. H. L. Bat. P. 2. 20*

HIERACIVM fruticosum latifolium hirsutum Inst. R. H. 472

2. *Idem angustifolium*

3. *Hieracium murorum laciniatum; minus pilosum Inst. R. H. 471. * Pulmonaria Gallica Tab.*

4. *Hieracium Dentis leonis folio, bulbosum Inst. R. H. 470*

5. *Hieracium montanum latifolium glabrum minus Inst. R. H. 471*

6. *Hieracium alpinum pratense, Cichorii folio, hirsutum asperum & peramarum Michel. H. Pis.*

7. *Hieracium alpinum Chondrillæ glabro & nitido folio, maius, flore aureo ac externe saturate purpureo*

8. *Hieracium Chondrillæ folio glabrum minus*

9. *Hieracium asperum, maiori flore, in limitibus agrorum Inst. R. H. 469*

10. *Hieracium Echiioides, capitulis Cardui Benedicti Inst. R. H. 471. * Buglossum Echiioides Lob. Hieracium Echiioides C. B. Buglossum luteum Cam.*

11. *Idem alpinum Buglossi folio*

12. *Hieracium maritimum umbellatum angustifolium glabrum, Pilosellæ facie Micheli H. Pis.*

HIPPOCASTANVM vulgare Inst. R. H. 612. * *Castanea Equina appellata Constantinopoli Casalp. 79. Castagne Cavalline Matth. 230. Castagno d' India vulgo*

HORMINVUM Napi folio Inst. R. H. 178

2. *Horminum sylvestre latifolium verticillatum Inst. R. H. 178*

HORMINVUM vide **SCLAREA**

HYACINTHVS Indicus tuberosus, flore Hyacinthi Orientalis Inst. R. H. 347

2. *Hyacinthus oblongo* flore, cæruleus maior Inst. R. H. 344. * *Hyacinthus Casalp.* 402
3. *Hyacinthus oblongo* cæruleo flore, minor Inst. R. H. 345
4. *Hyacinthus oblongo* albo flore, minor Inst. R. H. 345
5. *Hyacinthus oblongo* flore suaviter rubente, minor Inst. R. H. 345
6. *Hyacinthus Orientalis*, flore duplici Boerb. Ind. Alt. H. L. Bat. Part. 2. 112. num. 28.
7. *Hyacinthus Hispanicus*, flore incarnato Boerb. Ind. Alt. H. L. Bat. Part. 2. 112. num. 32
8. *Hyacinthus Orientalis*, flore pleno cæruleo purpureo, clavo longo, petalis modice reflexis Boerb. Ind. Alter. H. L. Bat. Part. 2. 112. num.
9. *Hyacinthus Orientalis*, flore pleno ex purpureo & cæruleo vario Boerb. Ind. Alt. H. L. Bat. Part. 2. 113. num. 55
10. *Hyacinthus Orientalis*, flore pleno ex cæruleo & pallido vario, clavo longo tenuique Boerb. Ind. Alt. H. L. Bat. Part. 2. 114. num. 56
11. *Hyacinthus Orientalis*, flore pleno cæruleo lituris cælestinis, clavo longo plano anguloso Boerb. Ind. Alt. H. L. Bat. Part. 2. 113. num. 49
12. *Hyacinthus Orientalis* flore plenissimo candidissimo toto, clavo conico, petalis maxime reflexis, caule & flore maximis Boerb. Ind. Alt. H. L. Bat. Part. 2. 113. num. 45

HYDROCERATOPHYLLON folio aspero quatuor cornibus donato Vaill. in Act. Ac. R. Sc. Ann. 1719. pag. 21. num. 1

HYDROCOTYLE vulgaris Inst. R. H. 328. * *Cotyledon aquatica* Dod.

HYOCSYAMVS vulgaris vel niger Inst. R. H. 88. * *Hiosciamus Matth.* 1118. *Hiosciamus niger* Offic.

2. *Hyoscyamus minor*, albo similis, umbilico floris atropurpureo Coroll. Inst. R. H. 5. * *Hyoscyami alterum genus in maritimis Casalp.* 345. *Hæc Hyoscyami species pro Hyoscyamo, Jusquiamo albo, & Dente Caballino usurpari potest*
3. *Hyoscyamus Creticus* luteus minor Inst. R. H. 118

HYPERICVM vulgare Inst. R. H. 254. * *Hæc, & duæ subsequentes Hyperici species promiscue usurpantur pro Hyperico, Perforata, Herba S. Iohannis, & Fugadæmone Offic. vocanturque vulgo Pilatro*

2. *Idem* caulibus rubentibus * *Hypericum vulgo autem Perforata Casalp.* 394
3. *Idem* caulibus pallescentibus, flore ampliore
4. *Hypericum crispum*, triquetro & cuspidato folio Inst. R. H. 255
5. *Hypericum fœtidum frutescens* Inst. R. H. 255. *Tragium Pon. Ascyrum legitimum Bell. ad Clus.*
6. *Hypericum elegantissimum non ramosum*, folio lato Inst. R. H. 255
7. *Hypericum*, an *Alpinum humilius*, magno flore punctato Inst. R. H. 256
8. *Hypericum palustre supinum tomentosum* Inst. R. H. 255

HYSSOPVS Officinarum cærulea, seu spicata Inst. R. H. 200. * *Hissopo Matth.* 733. *Hyssopus Casalp.* 462. *Hissopo domestico di Mesue, e Isopo volgare Riv.*

2. *Hyssopus vulgaris alba (latifolia)* Inst. R. H. 201



ACEA Iaceæ Babilonicæ maximæ similis, floribus paniculatis
D. Sherard. Raii Hist. Tom. 3. 207

2. Iacea montana foliis latis & subrotundis
3. Iacea vulgaris laciniata, flore purpureo Inst. R. H. 443
4. Iacea montana incana laciniata, flore purpureo
5. Iacea montana saxatilis atrovirens tenuifolia lutea Michel. H. Pis.
6. Iacea cinerea laciniata, flore purpureo Inst. R. H. 444
7. Iacea sive Serratula alpina, foliis subrotundis minus laciniatis, flore purpureo
8. Iacea nemorensis, quæ Serratula (maior) Inst. R. H. 444. * *Cerretia & Serretta Casalp. Solidago Sarracenica Lon.*
9. Iacea alpina nigra humilis foliis cichoraceis in amplas, & angustas lacinias usque ad costam divisas & nonnihil ad margines crispis, flore purpureo coronato, squamis ad extremitatem nigricantibus & pennatis, seminibus nudis
10. Eadem capitulis tenuioribus, squamis in longiusculum nigricantem & pennatum apicem desinentibus
11. Iacea montana, purpurea (maior) foliis laciniatis viridibus & asperis, squamarum capitulorum aciebus pennatis & nigricantibus (floribus coronatis, semine nudo) Michel. H. Pis.
12. Eadem minor
13. Iacea montana incana erecta, foliis laciniatis, flore purpureo coronato, calyce cum squamis ad extremitatem acutis nigricantibus & pennatis, seminibus marginalibus nudis, discoideis vero papposis
14. Iacea maritima supina incana purpurea, foliis laciniatis, capitulis parvis H. Pis.
15. Iacea (annua) foliis cichoriaceis villosis, altissima, flore purpureo Inst. R. H. 444
16. Iacea pratensis caule atropurpureo, foliis cichoriaceis omnibus ample laciniatis. * *Hæc & sequentes Iacea species pro Stæbe Offic. usurpari possunt*
17. Eadem foliis imis integris, cæteris laciniatis
18. Eadem foliis saturate virentibus ac plerumque integris
19. Eadem caule viridi, foliis cichoriaceis angustioribus, laciniatis, & non laciniatis
20. Eadem præalta, caule viridi, foliis cichoriaceis omnibus integris
21. Iacea maritima supina purpurea, integro rigido nigricante folio, squamarum capitulorum aciebus fuscis & pennatis Michel. H. Pis.
22. Iacea humilis incana pratensis, folio integro Ambros. 295
23. Iacea angustifolia, flore purpureo coronato, semine nudo, calyce crassiori, squamis nigricantibus perangustis acutis & magis pennatis. *Iacea supina, incana, purpurea Bot. Par.*

IACOBÆA Senecionis folio incana perennis Raii Hist. 285

2. Iacobæa montana, Senecionis folio Barr. Obs. 97
3. Iacobæa Senecionis folio tenuiter laciniato, flore luteo, semisflosculis integris
4. Iacobæa, an Cineraria Lampanæ foliis Hort. Cathol. Supplem. 3
5. Iacobæa maritima Inst. R. H. 486. * *Cineraria Casalp. 500*
6. Iacobæa vulgaris Raphani folio. * *Herba S. Iacobi Fuchs.*

7. *Iacobaea alpina*, foliis subrotundis serratis Inst. R. H. 485

IACOBAEA vide DORIA

- IALAPA* flore purpureo Inst. R. H. 129. * *Gelsiminum rubrum* Casalp. 154. *mirabilis Peruviana* Ger. *Solanum Mexiocanum* C. B. Gelsomin della Notte vulgo
2. *Ialapa* flore ex purpureo & luteo mixto Inst. R. H. 129

IASMINOIDES aculeatum, salicis folio, flore parvo ex albo purpurascente Michel. Nov. Plant. Gen. 224. Tab. 105. Fig. 1. * *Rhamno primo* Matth. 177. Spina da Crocifissi vulgo

2. *Iasminoides* aculeatum humile, Halimi minoris folio, flore maiori violaceo, fructu crassiore per maturitatem flavescere Michel. Nov. Plant. Gen. 224. Tab. 105. fig. 2. * *Rhamnus Palestinus* H. Mauroc.

IASMINVM Alexandrinum, Citri folio, flore pleno Barr. Obs. 123. Icon. 63

2. *Iasminum* sive Sambach Arabum folio acuminato, flore stellato maiore (sempieno) albo odoratissimo, vulgo Mugarino H. Mauroc. & H. Pis. Tab. 31.

3. *Iasminum* Azoricum flore albo Inst. R. H. 597

4. *Iasminum* vulgare flore albo Inst. R. H. 597. * *Iesminus* Marc. 40. *Gelsiminum* Casalp. 153. *Gelsomino* Matth. 95. *Gelsiminum* & *Iasminum* Offic. *Gelsomin* salvatico vulgo

5. *Iasminum* Hispanicum, flore maiore externe rubente Inst. R. H. 597. * *Gelsimini* genus humilium primum Casalp. 153. *Gelsomino* di Catalogna vulgo

6. *Iasminum* Indicum, flavum, odoratissimum Ferr. Flor. Cult. 393

7. *Iasminum* sive *Gelsiminum* luteum Inst. R. H. 597. * *An Iesminus* luteus Marc. 40. *Gelsomin* Giallo vulgo ut & sequens

8. *Iasminum* luteum, vulgo dictum, bacciferum Inst. R. H. 597. * *Gelsimini* genus humilium alterum Casalp. 153. *Polemonium* Gesn. *Ruta* Capraria quorundam. *Ruta baccifera* Tabern. *Trifolium fruticans* Dod.

IMPERATORIA maior (semine minore) Inst. R. H. 317

2. Eadem rugosioribus foliis, semine duplo maiori. * *Haec duae Imperatoria species promiscue usurpantur pro Imperatoria & Ostrutio* Offic.

IRIS Florentina, flore minore, tribus petalis inferioribus violaceis latis ac brevibus, cæteris dilute cæruleis. * *An Iride domestica* Matth. 18

2. *Iris* Florentina latifolia, flore maiore purpuroviolaceo. * *Iris* vulgo *Lilium purpureum* Casalp. 421. *Gbiaggiuolo* Ric. *Giaggiuolo* vulgo

3. *Iris* Florentina latifolia, flore albo, petalis angustis. *Iris alba* Florentina Inst. R. H. 358. * *Iris cuius flos ex toto candidus* Casalp. 421. *Irios*, *Ireos*, & *Iris Florentina* Offic. ut, & superior

4. *Iris* Sufiana, flore maximo ex albo nigricante Inst. R. H. 358

5. *Iris* foetidissima, seu *Xyris* Inst. R. H. 360. * *Xiride* Matth. 1044. *Spargula foetida* Casalp. 442. *Gladiolus foetidus*, *Xyris Dioscoridi* C. B. *Ricotta* vulgo

6. *Iris* angustifolia foetida, foliis procumbentibus. *An Iris pratensis angustifolia*, folio foetido Inst. R. H. 360

7. *Iris palustris lutea* Inst. R. H. 360. * *Acorus sive Iris palustris* Casalp. 422. *Acoro falso* Matth. 24
8. *Iris maritima humilis*, foliis latis, flore luteo dilutiore, Liliū conval-
lium odore
9. *Iris montana humilis*, foliis latis, flore pallido inodoro, cum tribus pe-
talis inferioribus lineis luridis distinctis. *Iris flore pallido* Casalp. 421
10. *Iris angustifolia*, Prunum redolens, minor Inst. R. H. 361

ISATIS sativa vel latifolia Inst. R. H. 211. * *Isatis sativa* Marc. 155.
Glaſtum vulgo Guadum Casalp. 358. *Glaſto domeſtico* Matth. 669. *Guado vulgo*
2. *Isatis*; an *sylvestris* vel *angustifolia* Inst. R. H. 211. *Glaſto ſalvatico*
Matth. 630. *Isatis quæ ſponte in arvis naſcitur* Casalp. 358

IVNCOIDES nemorosum villosum latifolium maius, flore minore Mi-
chel. Nov. Plant. Gen. 41. num. 1
2. *Iuncoides nemorosum villosum angustifolium minus*, flore maiore Mi-
chel. Nov. Plant. Gen. 41. num. 2
3. *Iuncoides Alpinum medium villosum latifolium*, panicula sparſa, capi-
tulis ſeminum longiuſculis

IVNCVS acutus, capitulis Sorghi Inst. R. H. 246
2. *Iuncus acutus maritimus Anglicus* Park. Theatr. 895
3. *Iuncus acutus*, panicula ſparſa Inst. R. H. 246
4. *Iuncus parvus cum pericarpis rotundis* Inst. R. H. 247
5. *Iuncus foliis articulosis erectis*, radice repente craſſiori Michel. Nov.
Plant. Gen. 38. num. 3
6. *Iuncus foliis articulosis, floribus umbellatis* Michel. Nov. Plant. Gen. 18. n. 6
7. *Iuncus foliis articulosis, floribus umbellatis cum utriculis* Inst. R. H. 247

IVNIPERVS media foliis liratis, baccis rubris (mediae magnitudinis) Michel.
H. Piſ. * *Iuniperus montanus fructu ſtavo* Casalp. 137. *Ginepro roſſo vulgo*
2. *Iuniperus vulgaris*, fruticoſa (baccis rotundis) Inst. R. H. 588. * *Gi-
nepro* Matth. 135. *Ginepro*, & *Ginebro Ric. & vulgo. Iuniperus Offic.*
3. *Eadem baccis oblongis*
4. *Iuniperus vulgaris*, foliis longioribus, baccis maioribus compreſſis
5. *Iuniperus minor montana*, folio latiore, fructuque longiore Inst. R.
H. 589
6. *Iuniperus maior arboreſcens*, ſive vulgaris ſterilis & mas Flor. Akdorf.



ALI maius cochleato ſemine Inst. R. H. 247
2. *Kali ſpinoſum villoſum annuum*, foliis craſſioribus & bre-
vioribus, calyce membranaceo, ſemine cochleato
3. *Kali hirsutum annuum*, foliis teretibus craſſis, floribus in
foliorum alis naſcentibus, calyce aculeato ac tranſverſe oblon-
gato, ſemine ferri equini figuram mentiente. An *Chenopodium Sedi folio*
minimo, *Kali facie, hirsutum*, & *candidum Zannich. Iſt. 64. num. VII. An.*
Kali

Kali parvum hirsutum I. B. 3. 702. *Kali minus, villosum* C. B. Pin. 289. Prodr. 133. *Chenopodium Sedi foliis teretibus* Buxb. Cent. 1. pag. 21. Tab. XXXI. fig. 1

4. *Kali annuum villosum parvum*, Sedi folio, calyce membranaceo, semine ferri equini figuram præferente. *Kali species vermicularis marina arborefcens* I. B. 704. * *An frutex tertius in maritimis asperis* Casalp. 155

5. *Kali minus album*, semine splendente C. B. Pin. 289. * *An Salsola quædam in maritimis* Casalp. 170.

6. *Kali album foliis angustioribus*, semine splendente

KETMIA Syrorum quibusdam Inst. R. H. 99. * *Alcea arborefcens Syriaca* C. B.

2. *Ketmia Syrorum*, flore purpuroviolaceo Inst. R. H. 99

3. *Ketmia Sinensis*, fructu subrotundo, flore simplici Inst. R. H. 100. * *Rosa della China vulgo*

4. *Ketmia peregrina*, Populi folio subtus incano, flore amplissimo flavescente, umbilico sanguineo

5. *Ketmia palustris foliis latis subrotundis & inferna parte molli ac subcinerea lanugine infectis*, flore purpureo magno. *Aristalthea Plinii* Casalp. in H. Sicc. pag. 245. num. 697. *Malva sylvestris caule altiori, folio Altheæ candicante, flore specioso roseo* in Op. pag. 561. *Ketmia palustris maior folio subtus incano, flore magno purpurascente, fructu acuminato* Zannich. 154

6. *Ketmia vesicaria vulgaris* Inst. R. H. 101. * *Hypecoo* Matth. 1117. *Hypecoum* Casalp. 576. *Alcea vesicaria* Dod.

KETMIA vide **PENTAGONOCARPOS**



ACRYMA IOB Inst. R. H. 532. * *Lacryma, & Lacryma Iob.* Casalp. 181. *Lithospermum arundinaceum forte Dioscoridis & Plinii* C. B.

1. **LACTVCA** montana latifolia laciniata, flore cæruleo Inst. R. H. 474. * *Sonchus cæruleus & Soncho Cicborium* Cam.

2. *Lactuca sylvestris murorum*, flore luteo I. B. 2. 1004. Vaill. in Act. Ac. R. Sc. Ann. 1721. pag. 260. * *Lactuca sylvestris Scariola & Serralia vocata* Casalp. 516. *Scariola, Endivia salvatica* Ric. Hæc & sequentes in Officinis promiscue appellantur *Lactuca sylvestris, Lactuca agrestis, Scariola, Scariola & Seris*

3. Eadem foliis multum laciniatis

4. *Lactuca sylvestris media*, non amara, caule lævi ramofo, ramis simplicibus surrectis, foliis latis brevibus & usque ad spinosam costam in plures lacinias eleganter dissectis, flore maiore, intus dilute luteo, extus purpureo

LAMIVM alba linea notatum Inst. R. H. 183. * *Milzadella, Vrtica mortua, & innoxia* Casalp. 449

2. Idem

2. Idem floribus candidis
3. Idem minus, flore purpureo
4. Lamium Paretariæ facie Inst. R. H. 183
5. Lamium vulgare album, five Archangelica flore albo Inst. R. H. 183
6. Lamium Garganicum subincanum, flore purpurascens cum labio superiori crenato Michel. H. Pis.
7. Lamium purpureum fœtidum, folio subrotundo, five Galeopsis Dioscoridis Inst. R. H. 183. * *Urtica non mordax & fœtida Clus. Dolcimele vulgo*
8. Lamium montanum saxatile ferme glabrum, flore amplo purpureo cum labio superiori crenato Michel. H. Pis.
9. Lamium folio caulem ambiente, minus Inst. R. H. 184

LAPATHVM folio acuto plano, ramis surrectis. * *An Lapathum seu Rumex Casalp. 164. Hæc, & sequens in Officinis vocantur Lapathum acutum, Oxylapathum, Rumex, & Romice vulgo*

2. Idem ramis expansis. * *An Oxilapathum Matth. 473. Lapathum sylvestre Casalp. 164*
3. Lapathum folio acuto rubente Inst. R. H. 504. * *Lapathum sanguineum Cam. Sanguis Draconis Herba Gefn.*
4. Lapathum folio acuto crispo Inst. R. H. 504
5. Lapathum pulchrum Bononienſe, folio sinuato, viride
6. Idem rubrum
7. Lapathum folio rotundo, alpinum Inst. R. H. 504. * *Lapathi genus quoddam in montibus Casalp. 164. Hippolapathum, Pseudo-Rha Lob. Rhabbarum monachorum C. B. Lapathum rotundum Ang.*
8. Lapathum maius, foliis subrotundis, ramis surrectis, staminulis florum flavescentibus, capsularum feminalium alis a basi usque ad medium crenatis & quandoque etiam barbatis *An Lapathum sylvestre, magnum, vulgare I. B. 2. 983. Hippolapathum sylvestre Tabern. Icon. 436. Hippolapathum salvatico Matth. 477*
9. Lapathum aquaticum, minus Inst. R. H. * *Hydrolapathum minus Lugd.*

LAPPA maior, Arctium Dioscoridis Inst. R. H. 450. * *Hæc & sequens in Offic. vocantur Bardana, Lappa Bardana, Lappa maior, & Personata*

2. Lappa maior capitulis parvis glabris Raii Synops. Ed. 3. 178. num. 3. *Lappa maior seu Bardana foliis maximis Casalp. 336. Lappa Eiusdem H. Sicc. pag. 102. num. 258. Lappa maior Italica, capitulis parvis Michel. H. Pis. * Personata maggiore Matth. 1213. Lappa Bardana Ric.*

LARIX folio deciduo, conifera Inst. R. H. 586. * *Larix Offic.*

LASERPITIVM foliis latioribus lobatis Inst. R. H. 324

2. Laserpitium alpinum minus, Peucedani folio, semine nonnihil crispo

LATHYRVS latifolius Inst. R. H. 395. * *Ervilium vulgo Rubilium Casalp. 233. Climeno Matth. 1022. Roviglia vulgo*

2. Lathyrus sylvestris luteus, foliis Vicie Inst. R. H. 395

LAVANDVLA latifolia Hispanica tomentosa Inst. 198

2. La-

2. *Lavandula latifolia* Inst. R. H. 198. * *Nardo Italiano* Matth. 34. *Pseudonardus* Cast. Spigo vulgo

3. *Lavandula latifolia altera*

4. *Lavandula angustifolia* Inst. R. H. 198. * *Lavandula* Matth. 34. *Spica Italica Lavanda vulgo* Casalp. 459. *Spica Nardi Cam.* Spigo salvatico vulgo

LAVROCERASVS fructu turbinato Michel. H. Pis. *Laurocerasus* Clus. Hist. 4. I. B. 1. 420. *Cerasus folio laurino* C. B. Pin. 450. *Laurocerasus* Thal. Tab. XXIII.

2. *Laurocerasus* fructu rotundo Michel. H. Pis. * *Lauro*, *Lauro regio* & *Lauro di Trebisonda vulgo*, ut & *superior*

LAVRVS mas & foemina, foliis latissimis planis & utrimque acuminatis. *Laurus latifolia* ~~μαυριπτε~~ *Dioscoridis* C. B. Pin. 460. *Laurus latifolia mas*, & *foemina* Tabern. Icon. 951. *Laurus latifolia maior* Park. Theatr. 1488.

2. Eadem foliis planis, duas uncias cum dimidio longis, unciam latis, partim utrinque acuminatis, partim retusis, fructu subrotundo. *Laurus* Trag. 1063

3. Eadem foliis utrinque acuminatis, quatuor uncias longis sexquunciam latis, & ad oras undulatis, fructu oblongo. *An Laurus vulgaris folio undulato* Inst. R. H. 597

4. *Laurus vulgaris* flore pleno Inst. R. H. 597. * *Hæ Lauri species usurpari promiscue possunt pro Lauro Offic. & Alloro Ric.*

LEONTODONTOIDES alpinus glaber, Erysimi folio, radice crassa foetida Michel. Nov. Plant. Gen. Part. 1. 31. Tab. 28

LEONTOPETALON foliis costæ ramosæ innascentibus Coroll. Inst. R. H. 49. * *Leontopetalon* Matth. 862. *Leontopetalon* Casalp. 270

LENTICVLA palustris maior, inferne magis convexa, fructu polyspermo Michel. Nov. Plant. Gen. 15

2. *Lenticula aquatica trifulca* C. B. Pin. 362. * *Lenticula quædam palustris in Auxeri fluvio* Casalp. 612. *Hederula aquatica, seu palustris* Tabern.

3. *Lenticula palustris quadrifolia* C. B. Pin. 362. * *Semprevivo minore* Matth. 1174

LENTICVLARIA maior polyrhiza, inferne atropurpurea Michel. Nov. Plant. Gen. 16

2. *Lenticularia minor monorhiza*, foliis subrotundis, utrinque viridibus Michel. Nov. Plant. Gen. 16. * *Lenticula palustris* Casalp. 612

3. *Lenticularia omnium minima arhiza* Michel. Nov. Plant. Gen. 16

LENTISCVS vulgaris Inst. R. H. 580. * *Lentiscus* Casalp. 77. *Lentisco* Matth. 122. Ric. 48. *Lentistio* & *Dentistio vulgo*

LEPIDIVM latifolium Inst. R. H. 216. * *Lepidium vulgo* *Herba Piperis* Casalp. 364. *Lepidio di Paolo e di Plinio* Matth. 643. *An Lepidio* Ric.

2. *Lepidio di Dioscoride* Zann. 118

3. *Lepidium humile incanum arvense* Inst. R. H. 216. * *Draba* Matth. 602. & *Casalp.* 365. *Arabis* Cam.

4. *Lepidium humile minus incanum Alepicum* Inst. R. H. 216
5. *Lepidium maius non repens*, foliis imis Scabiosæ, cæteris integris, floribus albis exiguis, fructu minimo lanceolato. *Lepidium gramineo folio*, sive *Iberis* Inst. R. H. 216. * *Iberide* Matth. 315. *Lepidio di Dioscoride* Eiusd. 642
6. Idem. minus

LEVCANTHEMVM Americanum ramosum altissimum & serotinum; foliis acutis dentatis, flore maximo. *Bellis Americana procerior serotina ramosa, flore amplissimo* Herman H. L. Bat.

2. *Leucanthemum alpinum maius*, folio rigido & altius dentato, flore maximo 34. circiter semiflosculis composito. * *Hoc, & sequentes, Bellis maior, Bellis ramosa, & Consolida media vulnerariorum in Offic. vocantur*

3. Idem folio leviter dentato, flore minore 24. circiter semiflosculis composito

4. Idem folio leviter dentato, flore maximo 24. circiter semiflosculis composito

5. Idem foliis imis laciniatis, cæteris altius & raro dentatis, flore maximo 24. circiter semiflosculis non ita latis composito

LEVCOIVM hortense incanum, folio non sinuato, flore purpureo maiore simplici & habitiori * *Leucoio porpureo* Matth. 924

2. Idem folio sinuato floribus purpurascentibus. * *Viola alba & matronalis, floribus rubentibus* Casalp. 368

3. Idem flore pleno, maculis albis notato

4. Idem foliis sinuatis, floribus albis. * *Leucoio bianco* Matth. 924. *Viola alba & matronalis, floribus candidis* Casalp. 368

5. *Leucoium luteum vulgare* Inst. R. H. 221. * *Leucoio giallo* Matth. 925. *Viola alba & matronalis lutea ramosior* Casalp. 368. *Viola gialla* Ric. Cheiri. *Leucoium luteum. Viola lutea* Offic.

6. *Leucoium luteum pleno flore* Inst. R. H. 221

7. *Leucoium maritimum sinuato folio* Inst. R. H. 221

LICHENAGARICVS terrestris digitatus niger, apicibus alborufis, seminibus griseis undique conspersus, radice membranacea longissima varie divaricata & implexa Michel. Nov. Plant. Gen. 104. num. 4. Tab. 54. fig. 4

LIGVSTICVM alpinum, foliis Cicutæ tenuioribus & glabris, radice brevi Michel. H. Pis. Tab. 39. fig. 2

LIGVSTRVM Inst. R. H. 596. * *Ruvisticum* Marc. 58. *Ligustrum* Casalp. 95. *Ligustro* Matth. 187. *Luisitico & Ruistico vulgo*

LILAC Inst. R. H. 601. * *Ligustrum Orientale* Casalp. 120. *Lilac e Ghiana Vnguentaria* Matth. 1237. *Syringa carulea* C. B.

2. *Lilac flore albo* Inst. R. H. 601. * *An Lilac flore albo non descriptum* Donn. Cat. H. Flor.

3. *Lilac laciniato folio* Inst. R. H. 602. * *Agem Lilac Persarum* Corn.

LILIOASPHODELVS phœniceus Inst. R. H. 344. * *Liliago maior Asphodelo affinis* Casalp. 410

LILIONARCISSVS luteus autumnalis maior Inst. R. H. 386. * *Narcissus autumnalis* Cæsalp. 414

LILIVM album vulgare Inst. R. H. 369. *Giglio* Matth. 870. *Lilium* Cæsalp. 418. *Lilium album* Offic. *Giglio bianco* & *Giglio vulgo*

2. *Lilium floribus reflexis*, montanum, flore rubente Inst. R. H. 370. * *Martagon* Matth. 871. *Lilium sylvestre vulgo Martagon colore purpureo*, si-
ve potius carneo Cæsalp. 419

3. *Lilium bulbiferum angustifolium* Inst. R. H. 370

4. *Lilium purpureocroceum maius* Inst. R. H. 369. * *Hemerocallis* Matth. 921

LILIVM CONVALLIVM album Inst. R. H. 77. * *Lilium Convallium* Matth. 923. & Cæsalp. 224. *Mughetto vulgo*

LIMONIVM maritimum maximum Italicum, Cynoglossi aut Glasti fo-
lio pediculo longiori fulcto, caule nudo, floribus cæruleis paniculatim na-
scentibus, calyce stellato. * *Limonium folio Rumicis, floribus purpureis* Cæ-
salp. 166. An *Limonium maximum, folio latissimo* D. Sberard. Rasi T. III. 247.
* *Been rosso Ric. Beben Rubrum* Offic.

2. *Limonium minus perenne*, Bellidis folio, floribus cæruleis, calyce stel-
lato. *Limonium alterum exiguum* Cæsalp. 166. An *Limonium maius* I. B. 3. 877.

3. *Limonium minus*, Bellidis folio, flagellis fœniculaceis Inst. R. H. 342.
Limonium minus densa caulium fœniculacea veluti coma Læl. Triumph. ap. Fr.
65. Pluk. Phytogr. Tab. 42. fig. 5. An *Limonium minimum comatum elegans*
Rasi Hist. Tom. 3. 246

4. *Limonium maritimum minus perenne & patulum*, Bellidis minor s. fo-
lio, ramulis pinnatis hirsutis densissime ramificatis & magis intortis, flori-
bus cæruleis Michel. H. Pis. *Limonium parvum Bellidis folio, caulibus sub-*
hirsutis ramofloribus, flore cæruleo, petalis cordatis Zannich. Opusc. Botan.
27. An *Limonium reticulatum, supinum* Bocc. Rar. 82. Inst. R. H. 342

5. *Limonium lignosum gallas ferens* Inst. R. H. 342

LINARIA vulgaris lutea, flore maiore Inst. R. H. 170. * *Osfride* Matth.
1262. *Linaria* Cæsalp. 350. *Osfyris* & *Linaria* Offic.

2. Eadem flore albo, riñu aureo

3. *Linaria erecta sempervirens glauca*, foliis imis verticillatis, cæteris alter-
nis, floribus purpureis parvis & inodoris. An *Or Leonis in montibus similior*
Linaria Cæsalp. 351

4. *Linaria alpina tetraphylla*, floribus violaceis parvis. * *Fruticulus qui-*
dam in Collibus saxosis Cæsalp. 326

5. *Linaria Hederaceo folio glabra*, seu *Cymbalaria vulgaris (annua)* Inst.
R. H. 169. * *Cimbalaria* Matth. 1182. & Ric. An *Cimbalaria* Cæsalp. 266

6. *Linaria Hederaceo folio glabro*, seu *Cymbalaria maior (perennis)* flo-
re candido, riñu pene pallido Michel. H. Pis.

LINGVA CERVINA Officinarum Inst. R. H. 544. * *Pbilitide* Matth.
864. *Lingua Cervina* & *Scolopendria* Cæsalp. 594. *Pbyllitis* Gesn.

2. *Lingua Cervina multifido folio* Inst. R. H. 545

LINVM montanum perenne, Iuniperi folio, floribus umbellatis albis cantilla rubedine infectis

LITHOSPERMVM maius, erectum Inst. R. H. 137. * *Lithospermum* Marc. 216. *Lithospermo minore* Matth. 960

2. *Lithospermum minus repens latifolium* Inst. R. H. 137. * *Ambarum barum Lithospermi specierum semina in Officinis Lithospermum, Milium Solis & Milium soler vocantur*

3. *Lithospermum alpinum palustre latifolium*, flore cæruleo maiore, umbilico luteo

4. *Lithospermum palustre minus*, flore cæruleo Inst. R. H. 137

5. *Lithospermum arvense minus* Inst. R. H. 137. * *Ecbium Scorpioides* C. B.

LONCHITIS aculeata maior Inst. R. H. 538. * *Hæc, & sequens in Officinis Filix mas vocantur*

2. *Lonchitis aculeata latioribus pinnulis* Inst. R. H. 538

LOTVS villosus altissimus, flore glomerato Inst. R. H. 403. * *Lotus Lybica Dalecampii*

2. *Lotus villosus maior & erectus*, flore albo glomerato, filiquis brevibus obesis. *An Lotus pentaphyllos filiquosus villosus* Inst. R. H. 403

3. *Idem minor & procumbens. An Lotus hemorrhoidalis humilior & candidior* Inst. R. H. 403

4. *Lotus palustris maior rotundifolia glabra. Lotus palustris maior glabra D. Vaillant. An Lotus pratensis, maior glaber Eiusd. in Bot. Par. 120*

5. *Lotus minor lutea glabra*, caulibus longissimis procumbentibus, foliis angustioribus. *An Lotus pentaphyllos minor glabra, foliis longioribus & angustioribus* Inst. R. H. 402

6. *Eadem caulibus nonnihil surrectis, foliis longioribus & angustioribus*

7. *Lotus pratensis prorsus glabra & procumbens, foliis rotundioribus. An Lotus sive Melilotus pentaphyllos minor glabra* Inst. R. H. 402. *Melilotum vulgo Cæsalp. 244*

8. *Eadem maior foliis ad margines tantum pilosis*

9. *Eadem maior villosa. An Lotus corniculata hirsuta minor I. B. 2. 356. Inst. R. H. 403*

10. *Lotus alpina hirsuta minor angustifolia procumbens, caulibus brevioribus, floribus minoribus luteis nonnunquam externe rubescentibus*

11. *Lotus angustifolia, flore luteo purpureo ex Insula S. Iacobi H. Amstel. Tom. 165*

LVNARIA maior annua, filiquâ rotundiore. *An Lunaria maior, filiqua rotundiore* Inst. R. H. 218. * *Hæc & sequens promiscue vocantur Viola Lunarîs, Lunaria Græca, & Bulbonach*

2. *Lunaria maior (perennis) filiqua longiore* Inst. R. H. 218

LVPVLVS mas Inst. R. H. 535. * *Lupulus Cæsalp. 157. Lupulo* Matth. 1273. *Lupus salictarius, & Lupulus Offic. Luppulo vulgo*

LVTEOLA herba salicis folio Inst. R. H. 423. * *Struthio falso* Matth. 619

2. *Luteola sativa atque spontanea minor*

- LYCHNIS hirsuta, flore coccineo, maior Inst. R. H. 334. * *An Oculus Christi* *Casalp.* 253. *Flos Constantinopolitanus* *Dod.* *Scarlattea* *vulgo*
2. *Lychnis hirsuta*, flore incarnato, maior Inst. R. H. 334
3. *Lychnis coronaria* *Dioscoridis sativa*, flore rubro & veluti flammeo fulgente Inst. R. H. 334. * *An Lychnide* *Matth.* 868. *Lychnis Coronaria flore rubente* *Casalp.* 252. *Hæc, & tres sequentes promiscue vocantur Iovis Flos Theophrasti Gesn.*
4. *Lychnis coronaria* *Dioscoridis sativa*, flore dilute rubente Inst. R. H. 334
5. *Lychnis coronaria sativa multiplex* Inst. R. H. 334
6. *Lychnis coronaria* *Dioscoridis sativa alba* Inst. R. H. 334. *Lychnis coronaria flore albo* *Casalp.* 252.
7. *Lychnis silvestris alba simplex* Inst. R. H. 334. * *Ocimoide* *Matth.* 1151. *Basilicum sylvestre* *Cast.*
8. *Lychnis silvestris noctiflora alba simplex*, quæ sterilis Michel. H. Pis. *Lychnis sylvestris alba simplex*, semine vidua Bot. Par.
9. *Lychnis silvestris noctiflora alba simplex*, calyce amplissimo ventricoso & striato Michel. H. Pis. Tab. 41. fig. 1
10. *Lychnis perennis viscosa noctiflora subhirsuta*, *Ocymastri facie*, flore parvo leucophæo extus luteoviridi, petalis bifidis cum appendicibus
11. *Lychnis montana viscosa noctiflora hirsuta latifolia alba*, floribus absque appendicibus Michel. H. Pis.
12. *Lychnis noctiflora angustifolia odorata* Inst. R. H. 335
13. *Lychnis silvestris*, sive aquatica, purpurea simplex Inst. R. H. 335
14. *Lychnis arvensis hirsuta parva & procumbens*, *Ocymastri facie*, flore rubro hilari, petalis bifidis cum appendicibus, calyce ventricoso
15. *Lychnis silvestris*, quæ *Saponaria* vulgo Inst. R. H. 306. * *Saponaria* *Casalp.* 256. *Viola Agrestis* *Trag.* *Struthium Plinii* *Fuch.*
16. *Lychnis silvestris*, quæ *Saponaria* vulgo, flore albo Inst. R. H. 336
17. *Lychnis* sive *Saponaria* flore pleno Inst. R. H. 336
18. *Lychnis pratensis*, flore laciniato simplici Inst. R. H. 336. * *Odontides* *Casalp.* 259. *Odontitis Plinii* *Flor Cuculi* *Gesn.*
19. *Lychnis pratensis*, flore laciniato pleno minore Inst. R. H. 336. * *Margheritine vulgo*
20. *Lychnis silvestris*, quæ *Behen album* vulgo, elatior, foliis longis angustis & sensim in acutum apicem productis, flore minore, petalis cordatis bifidis absque appendicibus, sectionibus latis in exteriori margine crenatis. * *Hæc, & tres sequentes, Polemonium, Behen album, Papaver spumeum Offic. & Been album Ric. promiscue vocantur*
21. Eadem foliis longis peracutis, flore maiusculo
22. Eadem foliis latioribus
23. Eadem alpina humilis, lato breviorique folio, floribus albis maioribus, petalis cordatis bifidis cum appendicibus, sectionibus latis
24. *Lychnis multiflora elatior*, *Linariæ folio*, parvo flore Inst. R. H. 338
25. *Lychnis viscosa altissima*, flore muscoso, *Ocymastri facie* *Triunf. Prælus.* 58
26. *Lychnis maritima non viscosa glabra atrovirens*, *Bellidis folio*, floribus muscosis viridibus in spicis partialibus & heteromallis dispositis, petalis capitlaceis integris deorsum reflexis
27. *Lychnis silvestris hirsuta annua*, flore minore carneo Inst. R. H. 337
28. *Lychnis silvestris alba*, spica reflexa Inst. R. H. 338

LYCOPERSICON Galeni Inst. R. H. 150. * *Pomi d'oro* Matth. 1136. & vulgo. *Malum insanum depressius & latius* Casalp. 28. *Poma amoris*. Dod. *Mala aurea* Cast.

2. Lycopersicon fructu Cerasi rubro Inst. R. H. 150. * *Solanum arbore-scens* Casalp. 215

LYCOPVS palustris glaber (foliis altius, & acute dentatis) Inst. R. H. 191. * *Siderite* I. Matth. 1056. *Marrubium aquaticum* Trag. *Lancea Chri-sti* Gesn.

2. Idem foliis brevioribus parum & rotunde crenatis

3. Lycopus foliis in profundas lacinias incisus Inst. R. H. 191. * *Verbenaca* alterum genus foliorum scissuris ad medium nervum accedentibus Casalp. 451

LYSIMACHIA lutea maior, quæ Dioscoridis, foliis ternis (& quaternis) caule rotundo tenuiore, flore maiore Michel. H. Pis.

2. *Lysimachia lutea maior*, quæ Dioscoridis, foliis ternis (flore minore) Inst. R. H. 141

3. *Lysimachia rotundifolia lutea*, foliis quaternis, flore prorsus luteo & du-plo maiori

4. *Lysimachia lutea minor*, foliis (latioribus & brevioribus) nigris punctis notatis Inst. R. H. 141

5. Eadem fundo floris subrufo

6. *Lysimachia Orientalis minor*, foliis glaucis annuenticibus, flore purpureo H. Pis. Tab. 40. fig. 1

7. *Lysimachia humifusa*, folio rotundiore, flore luteo Inst. R. H. 141. * *Numularia* Casalp. 261. *Centimorbia* Gesn. *Nummularia* Offic.



ALVA vulgaris, flore maiore, folio sinuato Inst. R. H. 95
* *Malva sylvestris*, & *Malva* Offic. *Malva vulgo*, ut & 3. se-quentes

2. *Malva sylvestris maior erecta*, folio sinuato, flore albo subpurpureo mediæ magnitudinis, folliculo seu calycis involucri ampliore Michel. H. Pis.

3. *Malva vulgaris*, flore minore, folio rotundo Inst. R. H. 95

4. *Malva annua erecta glabra*, foliis carnosissimis ad latera magis dilatatis, floribus perexiguis ex albo purpurascens & in foliorum alis glomeratim ag-gestis sine pediculis

5. *Malva ulmifolia semine rostrato* Inst. R. H. 96

6. *Malva Hispanica* foliis mollibus undulatis in margine, superius micis sul-phureis ad Solem lucentibus donatis Mor. Hist. Oxon. Part. 2. 523. n. 14

7. *Malva rosea humilis ramosa*, caule punctis purpureis inscripto, foliis in-ferioribus angulosis, superioribus vero ficulneis, flore dilute rubro, fundo luteo, amplo. * *Malvone*. *Malva Rosa vulgo* ut & sequentes

8. Eadem humilior, nonnihil ramosa, caule viridi, Caprifici folio, flore pleno rubro saturo

9. Ea

9. Eadem humilior ramosa, caule viridi, foliis parvis subrotundis & parum angulosis, flore rubro
10. Eadem humilior, caule ex rubro punctato, foliis rotundis angulosis, flore dilute rubente, fundo saturatiore
11. Eadem humilior vix ramosa, caule viridi, foliis angulosis, flore carneo, fundo nonnihil saturatiore
12. Eadem elatior non ramosa, caule viridi, foliis angulosis, flore rubro saturo
13. Eadem elatior ramosa, caule viridi, foliis ficulneis non ita profunde incis, flore dilute rubente, fundo saturatiore
14. Eadem elatior non ramosa, caule viridi, Caprifici folio, flore pleno intenso rubro
15. Eadem elatior vix ramosa, caule viridi, foliis angulosis, flore rubro
16. Eadem elatior parum ramosa, caule viridi, foliis angulosis, flore rubente, fundo ampliore & saturatiore
17. Eadem elatior non ramosa, caule viridi, foliis ficulneis, lobis rotundioribus, flore roseo, fundo saturatiore
18. Eadem elatior ramosa, caule viridi, foliis rotundis nonnihil angulosis, flore dilute rubente, fundo saturatiore
19. Eadem vix ramosa, caule viridi, foliis angulosis, flore roseo, fundo nonnihil saturatiore
20. Eadem elatior non ramosa, caule viridi, foliis Althææ rugosis & magis angulosis, flore minore carneo, fundo saturatiore
21. Eadem altissima ramosa, caule viridi, foliis cucumerinis seu magis angulosis, flore carneo, fundo saturatiore
22. Eadem humilis non ramosa, caule viridi, foliis inferioribus angulosis, superioribus vero ficulneis, flore luteo amplo
23. Malva arborea sempervirens, Alchimillæ folio mollissimo, flore purpureo, striis & fundo intenso concoloribus, calyce exteriori amplo, interiori parvo. * *An Malva quædam arborefcens Casalp.* 561

MALVINDA Americana procumbens, Alcææ folio, flore phœniceo parvo

MANDRAGORA maior verna fœtida, foliis Lactucæ aut Brassicæ crispis & glabris, floribus parvis ex albo subcæruleis, fructu rotundo amplo luteo & graviter odorato. *Mandragora fructu rotundo Inst. R. H.* 76. *Mandragoras Casalp.* 215. * *Mandragora mas vel alba Cam.*

2. Mandragora maior autumnalis, foliis longis subasperis crispis & ad oras undulatis, floribus violaceis vel ex cæruleo purpurascens, fructu
An Mandragora tertia ex Sicilia circa Æquinoctium Autumni germinans & florens, Lactucæ foliis, fructu turbinato ut parvi Sorbi Casalp. 216. * *Hæc & sequentes usurpari possunt pro Mandragora nigro, & fœmina Offic. & Mandragola vulgo*

3. Mandragora minor Autumnalis, foliis betaceis subasperis, flore maiore ex cæruleo purpurascens, fructu exiguo ovato & odorato

4. Mandragora minor brumalis, foliis betaceis crispis superna parte atrovirentibus & asperis, floribus uncialibus ex albo subcæruleis, fructu ovato exiguo odorato flavescens. *Mandragora florem purpureum circa brumam, promens, folio breviori tamen & latiore Casalp.* 216. *Mandragora minor, aspera, flore parvo ex albo subcæruleo, fructu ovato exiguo H. Pis. Tab.* 43

MAR-

MARRUBIUM album vulgare Inst. R. H. 192. * *Marrubio* Matth. 876. *Marrubium* Casalp. 447. *Prassio* Ric. *Marrubium* album C. B. *Prasium* Ang.

2. *Marrubium* album latifolium peregrinum Inst. R. H. 192. *Marrubium candidum* Dod. & *Creticum* Offic. ut & sequens

3. *Marrubium* album angustifolium peregrinum Inst. R. H. 192

4. *Marrubium* Hispanicum supinum, calyce stellato & aculeato Inst. R. H. 192. * *Alysson* Galeni Clus.

5. *Marrubium* annuum, foliis subrotundis, calyculis aculeatis, flore vario

MATRICARIA vulgaris seu sativa Inst. R. H. 493. *Matricaria dicta a quibusdam Amareggiola* sive *Herba amara* Casalp. 492. *Matricale* vulgo

2. *Matricaria* flore pleno Inst. R. H. 493

3. *Matricaria* hortensis minor glabra, flore lacteo plenissimo

MEDICA maior erectior, floribus violaceis Inst. R. H. 410. * *Fenum Burgundiacum* Lob.

MEDICAGO trifolia frutescens incana Inst. R. H. 412. * *Cytisus* Casalp. 113. *Citiso* Matth. 1223. *Lignum Rhodium*, *Cytisus verus* Belli

2. *Medicago* perennis, foliis ternis angustis in apice incisus, floribus luteis spicatis, siliqua falcata intorta (laevi) Michel. H. Pis.

3. Eadem floribus e luteo pallescentibus

4. Eadem floribus e caeruleo virescentibus

5. Eadem floribus partim luteis partim violaceis

6. Eadem floribus violaceis

MELANOSCHOENVS palustris angustifolius, *Lithospermi* semine Michel. Nov. Plant. Gen. 46. num. 1

MELIANTHVS Africanus Inst. R. H. 431

2. *Melianthus* Africanus minor foetidus Boerh. Ind. Alt. H. L. Bat. P. 1. 300

MELILOTVS Officinarum Germaniae Inst. R. H. 407. * *Loto domestico*, *Tribolo*, *Trifoglio Cavallino* Matth. 1221. *Lotus sylvestris* vulgo *Trifuli*, & *Tripuli flosculis* luteis Casalp. 241. *Trifolium odoratum* Dod. *Tribolo* vulgo ut & tres sequentes

2. *Melilotus* perennis erecta glabra, foliis oblongis serratis, floribus spicatis albis odoratis lineam longis, siliquis rotundis rugosis exiguis, semine singulari virescente. *Melilotus Officinarum Germania* flore albo C. B. Pin. 331

3. Eadem floribus sesquilineam longis, siliquis maioribus rugosis obtusis monospermis

4. *Melilotus* siliquis longioribus acutis Inst. R. H. 407

5. *Melilotus* Italica folliculis rotundis Inst. R. H. 407

6. *Melilotus* lutea minor, floribus & siliculis minoribus spicatis & dense dispositis Inst. R. H. 407

7. *Melilotus* capsulis reni similibus in capitulum congestis Inst. R. H. 407

MELISSA hortensis Inst. R. H. 193. * *Melissa* Matth. 874. *Melissa* vulgo *Citronella* Casalp. 446. *Melissa* Ric. *Cedronella* & *Cedroncella* vulgo

2. Me-

2. *Melissa hirsuta præalta*, caule crispo, foliis amplioribus omnibus acuminatis, minus odorata, flore albo. *Melissa sylvestris hirsutior*, minus odorata *Raii Hist.* 571

3. Eadem humilior, caule aspero, foliis minoribus & rugosioribus, imis acuminatis, cæteris rotundioribus

4. *Melissa Pyrenaica* caule brevi, Plantaginis folio (flore violaceo) *Inst. R. H.* 193

5. *Melissa humilis latifolia*, maximo flore purpurascente *Inst. R. H.* 193.
* *Melissa adulterina* I. B. *Herba Sacra Lugd.*

MELONGENA fructu oblongo violaceo *Inst. R. H.* 151. * *Melanzana* *Matth.* 1134. *Pyrum insanum colore purpureo Cæsalp.* 210. *Malum insanum* *Dod. Petonciano vulgo*

2. *Melongena* fructu oblongo, albo *Inst. R. H.* 151. *Pyrum insanum candidum candore Eboris Cæsalp.* 210. *Vovo Turco vulgo*

3. *Melongena* fructu incurvo *Inst. R. H.* 152

MENTHA rotundifolia palustris, seu aquatica, maior *Inst. R. H.* 189.
* *Sisymbro salvatico Matth.* 515. *Mentha aquatica sive sisymbrica Lob. Sisymbrium Fuchs. Mentha rubra Brunf. Calamintha aquatica Gesn.*

2. *Mentha aquatica hirsuta*, partim verticillata partim spicata, foliis latis ad *Melissam* accedentibus, spica longa, verticillis crassioribus, floribus purpureis, staminulis longis

3. *Mentha aquatica nigra & glabra*, Ocimi odore, foliis oblongis, spica verticillata tenuiore, floribus parvis dilute purpureis, staminulis brevibus

4. *Mentha sylvestris angustifolia glabra atrovirens*, spica dilute purpurea verticillata, florum staminulis brevissimis

5. *Mentha sylvestris glabra*, foliis brevioribus assidue crenatis, verticillis florum binis vel ternis ex cæruleo purpurascens

6. *Mentha montana*, foliis amplioribus longioribus & rugosis, spica verticillata, staminulis brevibus

7. *Mentha sylvestris longiore folio Inst. R. H.* 189. * *Menthastrum Trag. Mentha Equina Brunf. Sisymbrium campestre Ang. Mentastro Ric.*

8. *Mentha aquatica seu Pulegium vulgare Inst. R. H.* 189. * *Puleggio Matth.* 742

9. *Mentha aquatica seu Pulegium vulgare*, flore albo *Inst. R. H.* 190

10. *Mentha aquatica seu Pulegium maius*, foliis rotundioribus ad *Nummulariam* accedentibus. *An Pulegium foliis Nummularia C. B. Pin.* 222. *Prodr.* 109

MENYANTHES palustre latifolium & triphyllum *Inst. R. H.* 117. * *Trifolium palustre Cord.*

MESPILVS Germanica, folio Laurino non ferrato, sive *Mespilus sylvestris Inst. R. H.* 641

2. *Mespilus aculeata Amygdali folio Inst. R. H.* 642. *Pruno gazerino vulgo*

3. *Mespilus Apii folio sylvestris spinosa*, sive *Oxyacantha Inst. R. H.* 622.
* *An Oxyacantha Marc.* 57. *Spina alba, Spina acuta Ang. Spina Appendix Plinii Gesn. Marruca bianca vulgo*

4. *Mespilus folio rotundiore, fructu nigro subdulci Inst. R. H.* 642

MILLEFOLIVM vulgare album Inst. R. H. 496. * *Millefolium maius* *Cæsalp.* 482. *Achillea* *Lon.* *Stratiotes millefolia* *Fuchf.*

2. *Millefolium purpureum maius* Inst. R. H. 496. * *Millefoglio maggiore* *Matth.* 1200.

3. *Millefolium* sive *Ageratum umbella candida*, folio *Millefolii* minoris, rigidiore tamen *Lælii Triunf.* apud *Fratr.* 65

4. *Millefolium* quod *Tanacetum album*, maritimum *tenuifolium*, flore candido *Bocc. Mus. Part. 2. 33. Tab. 25*

5. *Millefolium minus tenuifolium*, *Tanaceti* odore *Barr. Obs.* 101

6. *Millefolium nobile* Inst. R. H. 496. * *Achillea* *Matth.* 1061. *Scopa Regia* *Plinii Dalecb.* *Stratiotes* *Gesh.*

MIMOSA spuria di *Pernambuco*, detta *Mimosa Italica* *Zannon.* 151

MOMORDICA *Zeylanica*, pampinea fronde, fructu longiori Inst. R. H. 103

2. *Momordica vulgaris* Inst. R. H. 103. * *Balsamina* *Cæsalp.* 194. & *Matth.* 1349. *Cbarantia* *Dod.* *Balsumino vulgo*

MORVS fructu albo (foliis integris parvis) *C. B. Pin.* 459

2. *Morus* (foliis integris parvis) fructu albo minori ex albo purpurascen-
te Inst. R. H. 589

3. *Morus* fructu nigro minori, foliis eleganter laciniatis Inst. R. H. 589

MOSCATELLINA folio *Fumarizæ* bulbosæ Inst. R. H. 156

MVSCARI arvense latifolium purpurascens Inst. R. H. 347. * *Bulbus syl-vestris*, qui *Cepa Canina*, seu *Anguina*, primus *Cæsalp.* 402. *Hyacinthus co-mosus*, & *Hyacinthus Dioscoridi* *C. B. Bulbus Ang.*

2. *Muscari* flore candicante, staminulis cæruleis

3. Idem staminulis carneis

4. *Muscari* arvense iuncifolium cæruleum minus Inst. R. H. 348. *Bulbus sylvestris* *Cæsalp.* 401. *Hyacinthus racemosus* *Dod.*

5. *Muscari moschatum*, griseo obsoleto flore Inst. R. H. 348

MVSCOIDES squamosum maius atrovirens, foliis subrotundis *Michel.* *Nov. Plant. Gen. 9. Tab. 6. fig. 3*

2. *Muscoides* squamosum medium rotundifolium atrovirens *Michel.* *Nov. Plant. Gen. 9. Tab. 6. fig. 4.*

3. *Muscoides* minimum, foliis alternis, superioribus circinatis, inferioribus cucullatis, flore pediculo ferme carente *Mich. Nov. Plant. Gen. 9. Tab. 6. fig. 6*

MYAGRVM monospermon latifolium Inst. R. H. 211

MYOSOTIS incana repens Inst. R. H. 245. * *Ocymoides Lychnitis* *L. B.*

2. *Myosotis montana* perennis repens maior subhirsuta & subincana, *Li-nariæ* folio, flore maximo, petalis angustis octo lineas longis, bifidis, aper-tura non dilatata

3. Eadem ramulorum summitate viscosa, flore magno, petalis latis & septem lineas longis

4. Eadem flore magno, petalis latis & cordatis
5. Myosotis alpina hirsuta latifolia perennis, parvo flore, calyce longiore
6. Myosotis alpina hyssopifolia, flore maiore
7. Myosotis alpina pumila repens, foliis brevibus ad margines simul cum caule pilosis, flore maiusculo
8. Myosotis alpina minor glabra repens angustifolia, flore parvo, petalis angustis
9. Myosotis alpina minor repens, Polygoni foliis superna parte simul cum caule pilosis, flore parvo, petalis bifidis
10. Myosotis Orientalis perfoliata, Lychnidis folio Coroll. Inst. R. H. 18

MYRRHIS perennis alba minor, foliis hirsutis, semine aureo Inst. R. H. 315

2. Eadem caule maculato
3. Myrrhis annua, semine striato lævi Inst. R. H. 315. * *Antbriscas Plinii I. B. Chærophyllo sylvestre C. B. Onoselinum Tab.*
4. Myrrhis trifolia Canadensis, Angelicæ facie Inst. R. H. 315. * *Angelica Canadensis trifolia Quorumdam*

MYRTVS latifolia Bætica I, vel foliis Laurinis Inst. R. H. 640. * *Mortella di Spagna vulgo*

2. Myrtus communis Italica (baccis nigris oblongis) Inst. R. H. 640. * *Myrtus fructu maturo nigro Casalp. 127. Mortella vulgo, ut & dua sequentes*
3. Eadem baccis rotundis nigris
4. Eadem baccis oblongis ex rubro candicantibus * *Myrtus fructu ex rubro candicante Casalp. 127*
5. Myrtus minor vulgaris Inst. R. H. 640. *Myrti quoddam genus ex Hispania Casalp. 127. Mirto Tarentina Matth. 249*



ARCISSE LEVCOIVM pratense multiflorum Inst. R. H. 387. * *Narcissus aquaticus Casalp. 413. Leucoium bulbosum C. B. Leuconarcissolirion & Opition Theophrasti Cam. in Matth. Leucoium Theophrasti, & Viola alba Plinii C. B.*

NARCISSVS albus, circulo croceo vel luteo Inst. R. H. 353. *Narcissus primus Casalp. 412. Tazzetta vulgo*

2. Narcissus sylvestris minor, flore albo, calyce aureo, odore gravi Michel. H. Pis. * *Giracapo vulgo*
3. Narcissus sylvestris multiplex, calyce carens Inst. R. H. 357. * *Narcissi genus, cuius calyces multiplici complexu constant Rosarum instar Casalp. 413*
4. Narcissus latifolius albus medio aureus Inst. R. H. 357. * *Narciso vulgo*
5. Narcissus maior totus luteus, calyce prælongo Inst. R. H. 306
6. Narcissus sylvestris pallidus, tuba aurea, maior Barr. Obs. 67. n. 719. Icon. 930

7. Nar-

7. *Narcissus iuncifolius*, oblongo calyce, luteus maior Inst. R. H. 335. * *Giunchiglia vulgo*
8. *Narcissus iuncifolius aureus multiplex*, *Anemones forma* Inst. R. H. 357. * *Giunchiglia doppia vulgo*
9. *Narcissus Illyricus liliaceus* Inst. R. H. 357

NERION floribus rubescentibus Inst. R. H. 605. * *Nerio Matth. 1160. Rhododaphne vulgo Oleandrum Casalp. 113. Rhododendron Bellon. Laurus Rosea Lob. Oleandrum Offic. Mazza di S. Giuseppe, Oleandro, Ammazza l' asino, & Alloro d' India vulgo*

2. *Nerion floribus albis* Inst. R. H. 605
3. *Nerion Indicum latifolium*, floribus odoratis plenis Inst. R. H. 605
4. *Nerion latifolium Indicum*, flore variegato odorato pleno Inst. R. H. 605

NICOTIANA maior latifolia Inst. R. H. 117. * *Tornabona Casalp. 344*

2. *Nicotiana maior angustifolia* Inst. R. H. 117. * *Ha dua Nicotiana species, Nicotiana, Petum, Tabacum, Herba Regina, Hoscyanus Peruvianus, & Herba S. Crucis promiscue vocantur & Tabacco vulgo*

3. *Nicotiana minor* Inst. R. H. 117. * *Hiosciammo nero Matth. 1121. Tornabona congener Casalp. 345. Hyoscyamus luteus Dod. Priapeia Gesn.*

NIGELLA angustifolia, flore maiore simplici cæruleo (petalis florum latis, & fructu habitiori) Inst. R. H. 258


2. *Eadem flore minore, petalis angustis, & fructu non ita ventricoso. * Ha dua Nigella species usurpari possunt pro Nigella Offic. & Pianta, che si usa per la Nigella Ric.*

3. *Nigella flore maiore pleno cæruleo* Inst. R. H. 258

4. *Nigella Orientalis, flore flavescente, semine alato plano Coroll. Inst. R. H. 19*

NYMPHAEA alba maior Inst. R. H. 260. * *Nimphaea bianca Matth. 944. Nymphaea vulgo Nenufarum flore candido Casalp. 569. Nenufaro Ric. Nymphaea alba, & Nemuphar album Offic.*

NYMPHOIDES aquis innatans Inst. R. H. 153



BELISCOTHECA *Hydrophylli folio, lobis amplioribus Vaill. Nov. Plant. Gen. in Act. Ac. R. Sc. An. 1720. pag. 426. n. 1*

2. *Obeliscotheca Hydrophylli folio, lobis angustioribus Vaill. Nov. Plant. Gen. in Act. Ac. R. Sc. An. 1720. pag. 246. v. 2*

OCIMUM caryophyllatum *Monachorum, sive Acinos Columnæ Inst. R. H. 203. * Basilico Gariofillato Ric.*

2. *Ocimum vulgatius Inst. R. H. 204. * Basilico mezzano Matth. 563. Ocimum tertium Casalp. 469. Basilico Ric. Ocimum & Basilicon Offic.*

3. *Ocimum minus*, valde odoratum, *Origani folio plano*, & non serrato, floribus albis, spicis brevibus & confertis

4. *Ocimum Citri* odore Inst. R. H. 204. * *Ocimum Citratum* *Casalp.* 469. *Basilico Cedrato* *Ric. & vulgo*

5. *Ocimum minimum* Inst. R. H. 204. * *Basilico minore* *Matth.* 564. *Basilicum nanum* *Casalp.* 469. *Basilico Pino vulgo*

OENANTHE maxima, bulbulis radicum crassissimis napaceis, foliis *Apii Macedonici* amplissimis & nigricantibus, caule altius striato, umbellis primariis nudis, secundariis foliosis aut barbatis, floribus & staminulis albis, apicibus purpureis

2. *Oenanthe Asphodeli* radice, *Apii folio*, umbellis amplis parulis, primariis nudis, secundariis vero foliosis & proliferis, floribus maioribus simul cum staminulis albis, apicibus subluteis. *Oenanthe stellata*, *Cretica Alp. Exot. Raii Hist. Tom. I. 442. Oenanthe Cretica stellata Park. Theatr. 894*

3. *Oenanthe aquatica tenuifolia* maior, bulbulis radicum longissimis (immediate adherentibus, floribus albis, umbellis foliosis) *Michel. H. Pis.*

4. Eadem minor, bulbulis radicum longis & crassioribus, umbellis nudis, radiis brevioribus. *Oenanthe angustifolia aquatica recta vulgaris Mor. Hist. Part. 3. 289. Sect. 9. Tab. 7. fig. 7. Oenanthe angustifolia Lob. Icon. 729. An Filipendula Cast. 188*

5. *Oenanthe aquatica trifolia*, caulibus fistulosis *Mor. Hist. Oxon. Part. III. 289. Sect. 9. Tab. 7. fig. 8. Raii Synops. Ed. 3. 210. v. 2. Oenanthe aquatica, minor luncoides trianthopporos Pluk. Alm. 268. Oenanthe aquatica minor Park. Theatr. 1233. Oenanthe five Filipendula aquatica altera I. B. 3. Part. 2. 192. Inst. R. H. 313*

6. *Oenanthe Filipendulæ* radice, foliis inferioribus *Apii Macedonici*, cæteris *Peucedani*, umbellis albis primariis & secundariis foliosis

7. Eadem foliis inferioribus *Apii tenuioribus* & altius incis. *Oenanthe Apii folio, caule firmiore Mor. Hist. Oxon. Part 3. 288. Sect. 9. Tab. 7. fig. 3. Enantbe II. Matth. 915. Filipendula tenuifolia Tabern. Icon. 141*

8. Eadem maritima, foliis inferioribus minus incis, corymbis umbellæ sparsis. *An Oenanthe Staphylini folio aliquatenus accedens I. B. 3. Part. 2. 191. * Hæ Oenantes species in Offic. promiscue etiam vocantur Filipendula aquatica, vel palustris*

9. *Oenanthe Lusitanica* (humilis tenuifolia, umbellis primariis nudis, secundariis foliosis, floribus & staminulis albis, apicibus purpureis) semine crassiore globoso Inst. R. H.

OLEA sylvestris, foliis angustis, fructu longiusculo tenuiori & interto

ONAGRA latifolia Inst. R. H. 302. * *Lyfimachia lutea corniculata C. B.*

2. *Onagra latifolia flore dilutiore* Inst. R. H. 302

3. *Onagra angustifolia* Inst. R. H. 302

ONOBRYCHIS Italica perennis erecta, foliis *Viciæ*, floribus dilute rubentibus, fructu exiguo non echinato sed rugoso & cristato *Michel. H. Pis.*

ONOPORDON vulgare flore purpureo *Vaill. in A& Ac. R. Sc. An. 1718. pag. 193. num. 1. * Acanthio Matth. 708. Hoc & sequens promiscue vocantur Acanthium, & Spina alba*

2. Idem

1. Idem foliis inferioribus altius incisus

OPVLVS Ruellii Inst. R. H. 607. * *Sambuco aquatico* Matth. 1332. *Sambucus in palustribus Pisanis nascens* Casalp. 92. *Sambucus palustris*, seu *aquatica* Offic.

2. *Opulus* flore globofo Inst. R. H. 607. * *Maggio & Pallone vulgo*

OPVNTIA maior erecta, folio lato oblongo spinis longis munito, flore semipleno, instar serici nitente, & ad æneum colorem tendente. * *Hæc, & sequentes Opuntia species vulgo vocantur Fico d'India*

2. Eadem folio longiore maioribus & crebrioribus spinis munito

3. *Opuntia supina latifolia*, floribus luteis aut citrinis. *An Ficus Indica, humilis* C. B. Pin. 458

ORCHIS, an magna, latis foliis, galea fusca vel nigricante I. B. 2. 759

2. *Orchis barbata*, odore hirci, brevior latioreque folio Inst. R. H. 433

3. *Orchis fucum referens maior*, foliolis superioribus candidis C. B. Pin.

83. *Testiculus figura & colore apem flori insidentem referens* Casalp. 429

4. *Orchis fucum referens maior*, foliolis superioribus purpurascens C. B. Pin. 83

5. *Orchis montana Italica*, flore ferrugineo, lingua oblonga Inst. R. H. 434. * *Spezie di Testicolo III. fig. 1. Matth. 930. Hæ Orchidis species promiscue usurpantur pro Satyrio, ac Testiculo Offic. & Satirii Ric.*

6. *Orchis palmata pratensis maculata*, flore variegato Inst. R. H. 434. * *Palma Christi* Casalp. 430. & Offic.

OREOSELINVM Apii folio maius Inst. R. H. 318. * *Danco II. Matth.*

824. *Cervaria nigra & Libanotis nigra Thal.*

2. *Oreoselinum Apii folio minus alterum* Michel. H. Pis.

3. *Oreoselinum Apii folio minus*, ad singulos nodos ramosum, & in summitate caulis plures umbellas in prælongis & foliosis pediculis proferens Michel. H. Pis.

ORIGANVM silvestre, Cunila bubula Plinii Inst. R. H. 188. * *An Origano vulgare* Matth. 739. *Origanum Italicum vulgo Regamum* Casalp. 464. *Hæc, & sequens Origan species, Origanum vulgare, silvestre, & Onitis promiscue in Offic. audiunt, Regamo & Erba da Acciughe vulgo*

2. Idem foliis brevioribus subrotundis & acrioris saporis

3. *Origanum onites* Inst. R. H. 199. * *Scarsapepe, & Mencipepe* Casalp. 464. *Marum quibusdam Dod. Hyssopus genuina Græcorum* Lob.

4. *Origanum foliis & facie Maioranæ*, floribus albis. * *Maiorana Gentile* Matth. 766. *Persa Ric. Persia nera vulgo*

ORIGANVM vide DICTAMNVS

ORNITHOGALVM umbellatum medium angustifolium Inst. R. H. 378. *An Ornithogalo II. Matth. 572. Ornithogalum vulgo Lac Gallina* Casalp. 405

2. *Ornithogalum maius spicatum*, flore albo Inst. R. H. 379. * *Bulbus Ornithogalo similis* Casalp. 405

3. *Ornithogalum spicatum*, flore viridi lactescente Inst. R. H. 379

4. Or-

4. Ornithogalum spicatum, luteo pallescente flore Pon. Bald. Lat. in 4.
97. * *Bulbus Ornithogalo similis, floribus luteis* Casalp. 405
5. Ornithogalum luteum Inst. R. H. 379
6. Ornithogalum exoticum, magno flore minori innato Inst. R. H. 379
7. Ornithogalum bifolium Germanicum cæruleum Inst. R. H. 380. * *Hya-*
cintbus stellaris C. B. *Bulbus vomitorius* Lon.
8. Ornithogalum autumnale minus, flore dilute purpureo Inst. R. H. 381
9. Ornithogalum cæruleum Lusitanicum latifolium Inst. R. H. 381. * *Hya-*
cintbus Peruvianus I. B.
10. Ornithogalum Lusitanicum flore albo Inst. R. H. 381
11. Ornithogalum maritimum, seu *Scilla radice rubra* Inst. R. H. 381. *
An Marina Cepulla, an Pancration Marc. 148. 149. *Scilla Matth.* 638. *Scyl-*
la cuius bulbi color ruffus Casalp. 403. *Squilla Ric. Scilla Offic.*
12. Ornithogalum eriophorum Peruvianum Inst. R. H. 381. * *Eriophorus*
& *Bulbus eriophorus* C. B.
13. Ornithogalum eriophorum Orientale Inst. R. H. 381

ORNVS Italica excelsior latifolia, fructu longiore. * *Ornus Offic. Orni-*
fructus ut ex Fraxini in Officinis promiscue vocantur Linga Avis

2. *Ornus vulgaris excelsior, racemis florum confertis, fructu longiore acu-*
to Mich. Nov. Plant. Gen. 223

3. *Ornus Italica, præcox, non ita excelsior, folio minori, racemis florum*
confertis, fructu ampliori acuto Michel. Nov. Plant. Gen. 223. Tab. 103. fig. 1

OROBVS alpinus, Galegæ foliis minus acutis, floribus purpurascens
Michel. H. Pif.

2. *Orobis latifolius parvo flore purpureo* Inst. R. H. 393. * *Onobrychis al-*
tera Casalp. 249. *Galega Nemorensis* I. B.

3. *Orobis sylvestris, Vicizæ foliis* Inst. R. H. 393

4. *Orobis sylvaticus, foliis oblongis glabris (radice tuberculosa)* Inst. R.
H. 393. Bot. Par. 155. * *Astragalus sylvaticus* C. B.

5. *Orobis angustifolius, Italicus, flore vario* Inst. R. H. 393

OSMVNDA vulgaris & palustris Inst. R. H. 547. * *Osmunda regalis,*
Filix florida Park. *Filix palustris* Dod. & Offic.

OXYS lutea Inst. R. H. 88. * *Oxytriphyllon* Trag. *Luiula & Alleluia quo-*
rumdam. Hæc, & sequens Oxidis species promiscue usurpantur pro Acetosella,
& Trifolio Acetosæ Ric. & Offic.

2. *Oxys erecta caulifera* Nostras Michel. H. Pif. * *An Oxys vulgo autem*
Alleluia Casalp. 564



AEONIA folio nigricante splendido, quæ mas Inst. R. H. 273.

* *Peonia masculina* Matth. 964. & Ric. *Peonia mas* Offic.

2. *Peonia communis* vel *fœmina* Inst. R. H. 274. * *Peonia fœmina* Offic.

3. *Peonia fœmina*, flore pleno rubro maiore Inst. R. H. 274

4. *Peonia* foliis latis subtus pubescentibus, flore simplici rubro octapetalo, petalis angustis

5. Eadem foliis prælongis. * *Peonia Casalp.* 588

6. *Peonia* foliis latis subtus incanis & lanuginosis

PALIVRVS Inst. R. H. 616. * *Rhamno terzo* Matth. 174. *Iuiaba sylvestris*, *spina Marruca* Casalp. 109

PALMA maior C. B. Pin. 506. * *Palma Casalp.* Palma da Palmizii vulgo

2. Palma minor C. B. Pin. 506. * *Palma quoddam genus humile* Casalp. 80. *Chamaripbes*. Cefaglioni, Palma di S. Pier Martire vulgo

PANICVM vulgare, spica simplici & aspera Inst. R. H. 515. * *Hoc*, & sequens vulgo *Panicastrella* vocantur

2. *Panicum* vulgare, spica simplici molliori Inst. R. H. 515

PARIETARIA Officinarum & Dioscoridis Inst. R. H. 509. * *Helxine* Matth. 1170. *Helxine* vulgo autem *Parietaria* Casalp. 169. *Vetriola* vulgo

2. *Parietaria Alpina* procerior, caule duriore

PARNASSIA palustris & vulgaris Inst. R. H. 246. * *Gramen Parnassii* Gesn. *Hepatica alba* Cord.

PARTHENIVM maius, Tanaceti folio, flore ampliori Michel. Nov. Plant. Gen. 34. num. 1

2. *Parthenium*, quod *Matricaria* Tanaceti folio, flore maiore, semine umbilicato Michel. Nov. Plant. Gen. 34. num. 2.

3. *Parthenium* foliis tenuissimis, *Achilleæ* cæsuris Michel. Nov. Plant. Gen. 34. num. 6. Tab. 29

4. *Parthenium Buphtalmi* folio, floribus solitariis, semiflosculis albis & iuxta discum luteis

PASTINACA sylvestris latifolia Inst. R. H. 319. * *Elaphobosco* Matth. 820

2. *Pastinaca sylvestris altissima* Inst. R. H. 319. * *Pseudocostus* Matth. 60. *Herba costa* Casalp. 310. *Panax Costinum* C. B. *Panax Chironium* Theophrasti Cam. *Costus spurius* Lob.

PENTAGONOCARPOS palustris, *Althææ* folio angustiore virescente & subaspero, flore purpurascente parvo & patulo, longo pediculo infidente, fructu compresso pentagono. An *Althææ hortensis*, sive *peregrinæ Dodonæi*, nomine insignita D. Sberard. Raii Hist. Tom. 3. 321. numer. 18. *Ketmia palustris minor*, folio angusto, flore parvo purpurascente, fructu depresso pentagono Zannich Ist. * *Pentagonocarpus* est novum plantæ genus a Mi-

Michelio institutum in sua Appendice altera ad primam partem Novorum Generum Plantarum iam editam, Plantas quasdam complectens cum Ketmiis batlenus commixtas. Eius characteres sunt, flor quidem Ketmiae, sed fructus compressus, pentagonus, in quinque cellulas divisus Evonymi fructuum instar debiscens, in quarum singulis unicum semen reniforme continetur

PENTAPHYLLOIDES argenteum alatum, seu Potentilla Inst. R. H. 298. * *Potentilla* Matth. 1070. & *Cesalp.* 557. *Argentina* Dod. *Anserina* Trag.
2. Pentaphylloides palustre rubrum Inst. R. H. 298. * *Quinquefolium palustre sive aquaticum* Tabern.

PERIPLOCA Monspeliaca, foliis acutioribus Inst. R. H. 93. * *Scammona Monspeliaca* I. B.

2. Periploca foliis oblongis Inst. R. H. 93. * *Apocino Serpeggiante* Matth. 1156. *Periploca* *Cesalp.* 119

3. Periploca Americana scandens, Nummulariae folio, flore albo Inst. R. H. 493

PERSICA vulgaris, flore pleno Inst. R. H. 624

PERSICARIA Orientalis, Nicotianae folio, calyce florum purpureo Inst. R. H. 38

2. Persicaria Salicis folio, Potamogeton angustifolium dicta (acida, non maculata) Inst. R. H. 509

3. Persicaria mitis maculosa, spicis crassioribus & tenuioribus (brevioribus potius) erectis Michel. H. Pis.

4. Persicaria Florentina urens non maculosa, spicis longis strigosis Michel. H. Pis. * *Persicaria* Ric. *Hydropiper* Offic. ut & duae superiores

PERVINCA vulgaris latifolia, flore caeruleo Inst. R. H. 119

2. Pervinca Italica latifolia subhirsuta, flore magno violaceo H. Pis.

3. Pervinca vulgaris latifolia, flore albo Inst. R. H. 119

4. Pervinca vulgaris angustifolia, flore caeruleo Inst. R. H. 120. * *Clematide prima* Matth. 1006. *Provinca* *Cesalp.* 336. *Vinca Pervinca* Brunf. *Chamaedaphne* *Eiusd.* *Clematis Daphnoides* Dod.

5. Pervinca vulgaris angustifolia, flore rubente Inst. R. H. 119

6. Pervinca vulgaris angustifolia, flore albo Inst. R. H. 119

7. Pervinca angustifolia variegata Inst. R. H. 120

PETASITASTRUM alpinum medium, floribus albis, flosculis inaequalibus, filamentis longis leviter capitatis. * *Petasitastrea* a *Petasitis* distinguit Michelius eo quod prima (ni fallor) praeter flosculos quibus capitulum componitur, semiflosculos exiguos habeant coronae vices repraesentantes, secus ac accidit in *Petasitis*

2. Idem filamentis longis bifidis non capitatis

3. Petasitastrum alpinum maius vulgare, flosculis inaequalibus

4. Petasitastrum, quod Petasites minor, radice repente, crasso non anguloso folio Michel. H. Pis.

5. Petasitastrum, quod Petasites monanthos rotundifolius glaber Vaill. in Act. Ac. R. Sc. Ann. 1719. pag. 403. num. 5

PETA-

PETASITES maior vulgaris flosculis æqualibus Inst. R. H. 451. * *An-
Tossilagine maggiore Matth. 894. Hæc, & sequens in Officinis promiscue vo-
cantur Petasites, Tussilago maior, & Personata*

2. Idem flaminum apicibus capitatis & ovatis

PHALANGIVM parvo flore non ramosum Inst. R. H. 368

PHASEOLVS Indicus cochleato flore Inst. R. H. 414. * Caracollo, &
Caracores vulgo

PHELLANDRIVM Inst. R. H. 306. * *Silaus Plinii Casalp. 291. Cicu-
taria palustris Lob. Cicuta aquatica Gesn.*

PHILLYREA, an latifolia spinosa Inst. R. H. 596. * *Vlivastro vulgo ut
& sequentes*

2. Phillyrea latifolia lævis Inst. R. H. 596. * *Mahalepum Serapionis Tab.*

3. Phillyrea foliis longioribus læviter dentatis

4. Phillyrea folio Ligustri Inst. R. H. 596. *Ilattrum aliis Litternum Casalp.*

74. Lillatro vulgo

PHLOMIS fruticosa, Salvix folio latiore & rotundiore Inst. R. H. 177.
* *Verbascum III. ovvero salvatico Matth. 1205. Verbascum salvifolium C. B.*

2. Phlomis fruticosa Salvix folio longiore & angustiore Inst. R. H. 177

3. Phlomis fruticosa, lutescente tomento obsita, Salvix folio acuminato,
flore luteo

4. Phlomis fruticosa Lusitanica, flore purpurascens, foliis acutioribus
Inst. R. H. 178

PHYTOLACCA Americana maiori fructu Inst. R. H. 299. * *Solanum-
racemosum Indicum H. R. Par.*

PILOSELLA maxima non repens, utraque foliorum parte saturoviridi
Raii Hist. Tom. 3. 147

2. Pilosella repens minor, caule erecto pedali, polyanthes, foliis angu-
stis oblongis Raii Hist. Tom. 3. 147

3. Pilosella alpina minor repens glabra & multiflora

PIMPINELLA agrimonoides odorata Inst. R. H. 157

2. Pimpinella sanguisorba maior Inst. R. H. 156. * *Pimpinella maggiore
Matth. 1087*

3. Pimpinella sanguisorba media, foliis inferne villosis & canescentibus,
semine crassiore profunde rugato, ac quatuor amplioribus & crispatis alis
munito

4. Eadem alpina alba seu pallide virens, floribus virescentibus, semine ob-
longo tetragono pene rugato & nonnihil alato, alis crassioribus integris

5. Pimpinella sanguisorba minor glabra, foliis maioribus, semine profun-
de rugato, ac quatuor crassioribus alis ferme integris aucto

6. Eadem foliis minoribus, semine quatuor membranaceis & crispatis alis
aucto

7. Pimpinella sanguisorba minor rubra lævis, capitulo oblongo flore purpureo

K

8. Ea-

8. Eadem hirsuta. * 2. 3. 4. 5. 6. 7. & 8. *Pimpinella species usurpari promiscue possunt pro Pimpinella, Sanguisorba, & Sorbastrella* Offic.

PINVS sativa (fructu acuto, squamis protensis acutioribus, ossiculis duris) Inst. R. H. 585. * *Pino domestico* Matth. 108. *Pinus Cæsalp.* 129

2. *Pinus sylvestris montana altera* Inst. R. H. 586

3. *Pinus sylvestris montana foliis triuncialibus latiusculis glaucis, conis albicantibus turbinatis habitioribus triuncialibus, squamis parvis copiosioribus. Pinus sylvestris foliis brevibus glaucis, conis parvis albescentibus Raii Syn. Ed. 3. 442*

PLANTAGO latifolia maior crispa, non sinuata, caulibus erectis. *Plantago media* Matth. 236. Ed. 1571. *Valgrif. in 4. & pag. 507. Ed. 1585. Valgrif in fol. An Plantago vulgaris, latifolia* Matth. Lugd. 1254. *Plantago maior* Dod. Pempt. 107. *Tabern. Icon. 731. Arnoglossa, Plantago latifolia laevis* Lob. Icon. 303. *Plantago rubra* Trag. 225. *Piantaggine Cæsalp.* 340

2. *Plantago latifolia glabra, non sinuata, crispa* Michel. H. Pis.

3. *Plantago lato scabro pallido laciniato folio nostras.*

4. *Plantago latifolia laciniata, caulibus reclinatis* Michel. H. Pis. *An Plantago maior Brunf. Tom. 1. 22*

5. *Plantago foliis latis oblongis pallidis, non sinuatis & utrinque acuminate. An Plantago maior Fuchf. Hist. 38. * Hæ Plantaginis species promiscue usurpari possunt pro Agnoglossa, Arnoglossa, Plantagine, Quinquenervia, & Centonertia* Offic. & *Piantaggine Ric. Petacciola vulgo*

6. *Plantago latifolia rosea, floribus quasi in spicam dispositis* Inst. R. H. 126. * *Plantago foliato caule Cæsalp.* 327

7. *Plantago latifolia incana* Inst. R. H. 126. * *Piantaggine maggiore* Matth. 508

8. *Plantago angustifolia maior* Inst. R. H. 127. *Piantaggine lunga* Matth. 509. *Lanceola maior Cæsalp.* 328. *Plantago Lanceolata, & Quinquenervia* Offic.

9. *Plantago alpina folio angusto longo & nigricante* Inst. R. H. 127

10. *Plantago angustifolia albida Hispanica* Inst. R. H. 127. * *Holosteum* I. B.

11. *Plantago maritima maior tenuifolia* Inst. R. H. 127

12. *Plantago gramineo folio maior* Inst. R. H. 127. * *Serpentina* Matth. 523. *Coronopus quedam in Montibus Cæsalp.* 330

13. *Plantago montana crasso glabro canaliculato tenuioreque folio, profundissime radicata* Michel. H. Pis.

PLATANVS Orientalis verus Inst. R. H. 590. * *Platanus* Marc. 54. *Cæsalp.* 41. *Platano* Matth. 148

PLVMBAGO quorundam Inst. R. H. 141. * *Glaſtum sylvestre vulgo Herba S. Antonii Cæsalp.* 359. *Dentellaria* Rond. *Molybdæna* Plinii Ang. *Flammula* Gesn.

POLEMONIVM vulgare cæruleum Inst. R. H. 146. * *Valeriana græca* Dod.

POLIVM Lavandulæ folio Inst. R. H. 206. * *Polio secundo* Matth. 889. *Polium montanum quibusdam Iva Arctica foliolis Rosmarini Coronarii Cæsalp.* 458

2. *Polium montanum incanum*, nunc erectum, nunc supinum, foliis serratis, floribus albis, circa faucem macula sublutea notatis, capitulis subrotundis umbellatim compactis. *Polium montanum supinum alterum* Inst. R. H. 206. * *Polio* Matth. 888. *Polio montano* Ric.

3. *Polium maritimum subincanum serotinum & supinum*, foliis serratis, floribus albis, umbilico pallecente, capitulis maioribus in umbella rariore dispositis. *Polium maritimum supinum Venetum* Inst. R. H. 206

POLYACANTHA annua maior præalta latifolia, venis albis distincta, floribus purpureis. *Cnicus albis maculis notatus*, flore purpureo Inst. R. H. 450. * *Carduus lacteus*, *Bedeguar Arabum Rauwolf*.

2. *Polyacantha vulgaris altissima* Vaill. in Aët. Ac. R. Sc. An. 1718

POLYGALA vulgaris lutea I. B. 3. 388

2. *Polygala purpurea* Inst. R. H. 174

3. *Polygala vulgaris floribus cæruleis* Bot. Par. 160

POLYGONATVM maius, folio lato rotundo, caule striato, flore maiore albo, pediculo brevi appenso. *Polygonatum latifolium*, flore maiore odore Inst. R. H. 78. * *Hæc, & quatuor sequentes Polygonati species in Officinis promiscue usurpantur pro Polygonato, & Sigillo Salomonis*

2. Idem minus, caule anguloso

3. *Polygonatum folio lato oblongo, caule lævi rotundo*, floribus minoribus angustioribus, ternis plerumque longo pediculo appensis

4. *Polygonatum latifolium vulgare* (caule rotundo, floribus pediculo brevi donatis) Inst. R. H. 78

5. *Polygonatum latifolium vulgare* (caule rotundo, floribus longo pediculo fulcitis) Inst. R. H. 78. * *Fraxinella Cæsalp.* 224

6. *Polygonatum angustifolium non ramosum* Inst. R. H. 78. * *Polygonaton angustifolium Cæsalp.* 224

POLYGONVM latifolium Inst. R. H. 510. * *Poligono Mascbio* Matth. 1001. *Polygonum vulgo Centinodia flosculis candicantibus* Cæsalp. 168. *Hæc & sequentes Polygoni species usurpari possunt pro Polygono maiore, Centinodia, & Corrigiola Offic.*

2. *Polygonum maritimum Hispanicum*, caulibus longissimis, calyce florum albo Inst. R. H. 510

3. *Polygonum maritimum latifolium* Inst. R. H. 510. * *Polygonum terzium in maritimis* Cæsalp. 281

4. *Polygonum oblongo angusto folio* Inst. R. H. 530

POLYPODIVM Cambrobritannicum, pinnulis ad margines laciniatis Inst. R. H. 540

2. *Polypodium vulgare* (pinnulis undulatis) Inst. R. H. 540. * *Hæc, & sequens Polypodii species usurpari promiscue possunt pro Polypodio Offic. & Polypodio Quercino* Ric.

3. Idem pinnulis altius serratis

4. *Polypodium maius, acuto folio Viterbienne* Inst. R. H. 540

5. *Polypodium angustifolium, folio vario* Inst. R. H. 540

POPVLAGO maior præcox, Cacaliæ foliis dilute virentibus, flore luteo non splendente, petalis uncialibus subrotundis. *An Populago flore maiore*. Inst. R. H. 273. * *Farfarugio* Matth. 895. *Caltha palastris* Offic. ut & sequentes

2. *Populago flore pleno* Inst. R. H. 273
3. *Populago flore minore* Inst. R. H. 273
4. *Eadem petalis acutis*

POPVLVS nigra Inst. R. H. 592. * *Popolo nero* Matth. 153. *Populus nigra* Casalp. 120. *Albero Ric.* *Albero & Pioppo vulgo*

2. *Populus alba maioribus foliis* Inst. R. H. 592. * *Popolo bianco* Matth. 152. *Populus alba*, vulgo *Albarus vocata* Casalp. 120. *Farfarus antiquorum* Cord. *Gattice vulgo*
3. *Populus tremula* Inst. R. H. 592. * *Popolo Libico* Matth. 154. *Populus que in Alpibus nascitur*, nigriori aspectu Casalp. 120

PORTVLACA latifolia sive sativa Inst. R. H. 236. * *Portulaca domestica* Matth. 502. *Portulaca latioribus foliis* Casalp. 263. *Portulaca* Offic. *Porcellana domestica vulgo*

2. *Portulaca angustifolia sive sylvestris* Inst. R. H. 236. * *Portulaca saluatica* Matth. 503. *Portulaca angustioribus foliis* Casalp. 263. *Porcellana Ric.*

POTAMOGETON alpinum, Plantaginis folio Inst. R. H. 233

2. *Potamogeton foliis crispis*, sive *Lactuca Ranarum* Inst. R. H. 233

PRIMVLA veris floribus ex singularibus pediculis, pallidis, maioribus, simplicibus Inst. R. H. 125. * *Hæc & sequentes pro Primula veris, & Paralyfi* Offic. usurpari possunt

2. *Eadem foliis multiplicibus*
3. *Primula veris floribus ex singularibus pediculis, purpureis maioribus*
4. *Primula veris montana incana (umbellata) lutea* Inst. R. H. 124

PRVNVS silvestris, fructu maiore cerasiformi cæruleo dulciore ac suaviore

PSEVDODICTAMNVS acetabulis Moluccæ Inst. R. H. 188

2. *Pseudodictamnus Hispanicus*, amplissimo folio candicante & villosa Inst. R. H. 188
3. *Pseudodictamnus Hispanicus*, amplissimo folio nigricante & villosa Inst. R. H. 188
4. *Pseudodictamnus verticillatus inodorus* Inst. R. H. 188. * *Dittamo falso* Matth. 745. *Quadam ex Creta ad nos allata pro Pseudodictamo* Casalp. 440. *Dittamo falso*, & *Pseudodittamo* Ric. 35

PSEVDORVTA Patavina, floribus luteis umbellatis Micheli Nov. Plant. Gen. Part. 1. pag. 22. Tab. 19

PSEVDOSPONGIA crustacea fluviatilis Michel. Nov. Plantar. Gener. Part. 2. Tab.

* *Planta hæc aquis perpetuo submersa, parietes piscinæ in centro borti sitæ vestit Byssorum & Lichenum crustaceorum in morem. Structura spongiis simi-*

similis est, e filamentis nempe ramosis virentibus varieque implicitis contexta, quibus ad basim numerosi adhaerent fructus exigui lutescentes, binc complanati ac excavati, inde vero globosi, seminibus minutissimis repleti. Plantae superficies viridis est, pluribus fossulis radiatim distincta. Haec autem melius patebunt in Icone quam ante multos annos Michellius aeri insidi curavit, & in secunda Parte eius Novorum Generum Plantarum inter Submarinas proponetur

PSEVDOSTACHYS montana nigra maior, Betonicæ folio longiore, flore variegato, calycibus admodum villosis

PSYLLIVM maius erectum Inst. R. H. 128. * *Psillio Matth. 1122. Psyllium Offic. Psillio Ric. ut, & sequens*

2. *Psyllium maius supinum* Inst. R. H. 128. * *Psillio H. Matth. 1723*

PTARMICA, quæ Ageratum (maius) foliis serratis C. B. Pin. 221. * *Eupatorio di Mesue, Canforata, Erba Giulia, Santonico Ric. ut & sequens*

2. *Ptarmica*, quæ Ageratum (minus) foliis serratis C. B. Pin. 221. * *Canforata Casalp. 480*

3. *Ptarmica alpina*, foliis profunde incisis Inst. R. H. 497

4. *Ptarmica incana*, Linariæ foliis angustioribus cristatis & quasi Coronopi cæsuras mentientibus, floribus luteis

5. *Ptarmica Linariæ* folio angustissimo, cum margine peculiariter dentato & veluti squamoso, floribus albis

6. *Ptarmica incana* pinnulis cristatis Coroll. Inst. R. H. 37. * *Affenzo Scripchio di Egitto Matth. 726*

7. *Ptarmica Orientalis*, foliis Tanaceti incanis, semiflosculis florum pallide luteis Coroll. Inst. R. H. 37

PVLMONARIA Italorum ad Buglossum accedens Inst. R. H. 136. * *Vn'altra Polmonaria Matth. 1094. Pulmonaria Casalp. 434. Symphytum maculosum C. B. Pulmonaria Offic. ut & sequentes*

2. *Pulmonaria maxima*, foliis quasi saccharo incrustatis Raii Hist. Tom. 3. 266

3. *Pulmonaria* foliis magis maculatis, maculis albis

4. *Pulmonaria* foliis latis acutissimis, maculis albidis magnis undique infectis

5. *Pulmonaria* maculosa, maculis rarioribus & minus apparentibus

6. *Pulmonaria* foliis minoribus & minus acutis, maculis parvis

7. *Pulmonaria alpina*, foliis prælongis utrinque acutis, maculis rarioribus parvis & vix apparentibus notatis

8. *Pulmonaria* (alpina minor,) viridi subrotundo (molli) non maculato folio Inst. R. H. 137

PVNICA flore pleno maiore Inst. R. H. 336. * *Punica sterilis, sed peregrina in Italia Casalp. 141. Balauſti Ric.*

2. *Punica silvestris* Inst. R. H. 636. * *Punica cuius fructus succus acidus Casalp. 141. Melagrane forti Ric. & vulgo*



VAMOCLIT Americana, folio Hederæ flore coccineo Boerh.
Ind. Alt. H. L. Bat. 1. 247

QVINQUEFOLIUM erectum maximum, flore pallide luteo, petalis cordatis

2. Quinquefolium alpinum erectum latifolium hirsutum (caule patulo, & dichotomo) flore luteo parvo, petalis angustioribus cordiformibus Michel. H. Pis.

3. Quinquefolium montanum erectum hirsutum, foliis subtus incanis, amplo luteo flore, petalis cordatis Michel. H. Pis.

4. Quinquefolium montanum erectum hirsutum, foliis profunde & eleganter incis, flore luteo, petalis cordatis Michel. H. Pis.

5. Quinquefolium erectum luteum Inst. R. H. 297

6. Quinquefolium folio argenteo Inst. R. H. 297. * *Pentafillo bianco* Matth. 1074

7. Quinquefolium, an minus repens alpinum aureum Inst. R. H. 297

8. Quinquefolium erectum minimum luteum, radice repente, vernum

9. Quinquefolium maius repens Inst. R. H. 297. * *Cinquefoglio* Matth. 1072. *Quinquefolium* Casalp. 554. *Pentaphyllum* & *Quinquefolium* Offic.

10. Quinquefolium repens maius alterum, foliis amplioribus. * *Cinquefoglie* Ric.

11. Quinquefolium alpinum album ramosum, foliis amplioribus, in apice incis, utraque parte lanuginosis, petalis florum cordiformibus Michel. H. Pis.



ANVNCVLVS nemorosus luteus Inst. R. H. 285

2. Ranunculus phragmites albus vernus Inst. R. H. 285

3. Ranunculus nemorosus trifolius Inst. R. H. 285

4. Ranunculus nemorosus, flore cæruleo, foliis maioribus, Apennini Montis Inst. R. H. 285. *Anemonoides monanthos, cærulea maior* Vaill. in *Act. Ac. R. Sc. Ann. 1710. pag. 40. num. 5*

5. Ranunculus nemorosus, flore cæruleo, foliis minoribus, Apennini Montis Inst. R. H. 285. *Anemonoides monanthos cærulea minor* Vaill. in *Act. Ac. R. Sc. Ann. 1710. pag. 40. num. 4*

6. Ranunculus vernus maior, foliis rotundis, per basim sinuatis, vel dentatis, non maculatis, aut maculis glaucis vix apparentibus interdum notatis, flore decapetalo luteo, extus luteoviridi

7. Idem foliis oblongis neque sinuatis neque splendentibus, sed secundum costam linea nigra notatis, flore luteo

8. Idem medius, foliis rotundis, læviter sinuatis, maculis albicantibus atque dilute viridibus vix apparentibus notatis, flore enneapetalo vel decapetalo intus luteo extus luteo viridi, calyce triphylo. *Chelidonium minus* Trag. 113. *Cord. Hist.* 121. * *An Favagello vulgo, & Scrophularia minor* Casalp. 546. *Hæ tres Ranunculi verni species promiscue usurpantur pro Scrophularia minore, & Chelidonio minore* Offic.

9. Ra-

9. *Ranunculus tridentatus vernus*, foliis amplioribus, maculis albis notatis, lobis rotundis, flore dilute purpureo maiore, petalis sex lineas longis & tres latis. *An Ranunculus tridentatus vernus, folio variegato* Inst. R. H. 287
10. Idem foliis minoribus non maculatis, lobis acutis, flore purpureo minore
11. Idem foliis minoribus maculatis, lobis acutis, flore minore dilute cæruleo. * *Hæ tres Ranunculi tridentati species promiscue vocantur Hepatica nobilis, Trifolium Hepaticum, Trinitatis Herba, & Trinitas*
12. *Ranunculus palustris echinatus* Inst. R. H. 286
13. *Ranunculus arvensis echinatus* Inst. R. H. 289
14. *Ranunculus Lusitanicus*, folio subrotundo, parvo flore Inst. R. H. 286
15. *Ranunculus Alepus*, grumosa radice, flore purpureosanguineo maximo Inst. R. H. 288
16. *Ranunculus Alepus*, grumosa radice, flore lineis rubris & luteis striato Inst. R. H. 288
17. *Ranunculus Asphodeli radice*, flore sanguineo Inst. R. H. 288
18. *Ranunculus Romanus gigas*, miniato flore Inst. R. H. 288
19. *Ranunculus Asphodeli radice*, flore pleno albo rubris striis distincto Inst. R. H. 288
20. *Ranunculus Asphodeli radice*, flore pleno rubello, apicibus purpureis & roseis Boerh. Ind. Alt. H. L. Bat. Part. 1. 33. num. 50
21. *Ranunculus lanuginosus*, Apii folio, Asphodeli radice Inst. R. H. 289
22. *Ranunculus chærophyllus*, Asphodeli radice Inst. R. H. 289
23. *Ranunculus rutaceo folio*, flore suaverubente Inst. R. H. 289
24. *Ranunculus alpinus Fumarizæ folio* Inst. R. H. 289
25. *Ranunculus grumosa radice*, folio *Ranunculi bulbosi* Inst. R. H. 291
26. *Ranunculus pratensis erectus dulcis & maculatus*
27. *Ranunculus nemorosus*, Vitis folio non maculato, lobis in acutas laciniis incis, flore aureo, calyce non reflexo, fructu rotundo
28. *Ranunculus alpinus hirsutus serotinus*, foliis parvis non maculatis, flore aureo, calyce non reflexo, fructu rotundo
29. *Ranunculus alpinus hirsutus*, foliorum sectionibus in acutas laciniis divis, flore aureo, calyce non reflexo
30. *Ranunculus nemorosus*, foliis profunde sectis, fuscis & albopallidis maculis notatis
31. *Ranunculus rectus*, foliis pallidioribus hirsutis Inst. R. H. 289
32. *Ranunculus repens flore pleno* I. B. 3. 420
33. *Ranunculus pratensis repens*, foliis pallidioribus rugosis non maculatis & nonnihil pilosis, flore luteo. * *An Ranunculo* II. Matth. 645
34. Idem foliis parvis viridibus & maculis albis notatis
35. *Ranunculus alpinus pratensis*, repenti similis, sed minor. *Michell* H. Pis.
36. Idem foliis minoribus
37. *Ranunculus pratensis*, radice verticilli modo rotunda, minor hirsutus, foliis pallidioribus dumtaxat trilobatis, lobis contiguis acute incis & ab exortu albida macula notatis, flore luteo splendente, calyce reflexo. * *An Ranunculus* V. Matth. 648. *Hic & tres sequentes Flammula aquatica in Officinis vocantur*
38. Idem foliis parvis atrovirentibus, lobis contiguis minus laciniatis, laciniis obtuse mucronatis & ad sinus albida macula notatis

39. Idem

39. Idem foliis in tres lobos divisus, lobis inferioribus in suprema basis parti admodum sinuatis, omnibus ad laciniarum exortum albida macula notatis

40. Idem maior & minus hirsutus, foliis trilobatis, lobis inferioribus ab intermedio longe distantibus, omnibus secundum margines nigricantibus, & laciniis secundariis minus laceratis

41. Ranunculus alpinus serotinus hirsutus non maculatus, foliis parvis

42. Ranunculus montanus Aconiti folio, albus, flore maiore Inst. R. H. 290

43. Ranunculus palustris Apii folio, lævis Inst. R. H. 291. * *An Ranunculo I. Matth. 644. Ranunculus & Sardonias Dioscoridi C. B. Apiastrum Cord.*

44. Ranunculus arvensis annuus lævis, interdum hirsutus, foliis trilobatis lobis parum incisus, & ad exortum macula nigra notatis, flore luteo splendente, calyce reflexo, capitulo subrotundo, seminibus ad latera subasperis. *Ranunculus III. Matth. ed. Valgrif. lat. in fol. 458. & Ital. 646.*

45. Ranunculus arvensis, foliis Chamæmeli, flore minore atrorubente Inst. R. H. 291. * *Flor Adonis Clus. Eranthemum Dod.*

46. Ranunculus palustris, Plantaginis folio ampliore Inst. R. H. 292. * *Piantagine aquatica Matth. 510. Plantago aquatica Cæsalp. 552*

47. Ranunculus palustris, Plantaginis folio angustiore Inst. R. H. 292

48. Ranunculus palustris (annuus) Plantaginis folio, humilis & supinu Inst. R. H. 292

RAPISTRVM maximum rotundifolium monospermon Inst. R. H. 211

RAPVNCVLVS spicatus albus Inst. R. H. 113

2. Rapunculus alpinus cæruleus, angusto raro & subinde dentato folio Michel. H. Pis.

RESEDA Plin. L. 17. cap. 12. *Reseda candida* Lugd. 1199. *An Reseda foliis Calcitrapæ, flore albo* Inst. R. H. 423

RHAMNOIDES fructifera, foliis salicis, baccis aureis Coroll. Inst. R. H. 53

RHAMNVS Catharticus Inst. R. H. 593. * *Spina infestoria Matth. 175. Spina Cervalis Cæsalp. 101. Spincervino Ric.*

RHAMNVS vide IASMINOIDES

RHVS Africanus trifolius, foliis non serratis angustis & acutis H. Pis.

2. Rhus Virginianum Inst. R. H. 611

3. Rhus folio Vlmi Inst. R. H. 611. * *Rhu Matth. 233. Rhus obsoniorum Cæsalp. 77. Rhus Coriaria Dod. Sommacco Ric.*

RICCIA minima pinguis, foliis latiusculis ample sulcatis e glauco virecentibus Michel. Nov. Plant. Gen. 107. num. 2. Tab. 37. fig. 4

RICINOIDES ex qua paratur *Toarnesol* Gallorum Inst. R. H. 655. * *Helitropio minore Matth. 1364. Helitropium, Tricoccum Cæsal. 381*

RICI-

RICINVS vulgaris Inst. R. H. 537. * *Phaselus Romanus* Marc. 29. *Ricino* Matth. 1310. *Ricinus* vulgo *Girasole* Casalp. 381

ROSA rubello flore maiore multiplicato sive pleno, incarnata vulgo I. B.
2. 36. * *Rosa* Offic.

2. *Rosa* omnium Calendarum, flore pleno, carneo Inst. R. H. 639. * *Rosa* d'ogni Mese vulgo

3. *Rosa* centifolia Batavica Clus. Hist. 113. * *An Rosa Centifolia* Casalp. 96

4. *Rosa* flore albo pleno (staminulis donato) Inst. R. H. 637

5. *Rosa* flore albo pleno (staminulis destituto) Inst. R. H. 637. * *An Rosa Anconitana* Marc. 60

6. *Rosa* rubicunda, saccharina dicta, Græcula Plinii Cam. Hort. *Bottoni di Rose rosse* Ric. *Rosa* Offic.

7. *Rosa* versicolor Inst. R. H. 637

8. *Rosa* lutea simplex Inst. R. H. 637

9. *Rosa* lutea multiplex Inst. R. H. 638

10. *Rosa* moschata simplici flore Inst. R. H. 637. * *Rosa Damascena* Marc.

60. *Rosa muscatula* Casalp. 96. *Rosellina* Dommaschina vulgo ut & sequens

11. *Rosa* moschata flore pleno Inst. R. H. 637

12. *Rosa* silvestris seu dumetorum scandens sempervirens, Myrti folio lucido, flore albo odorato (in umbellam disposito) fructu parvo rotundo, & hispido Michel. H. Pis. * *Hæc, & due sequentes pro Rosa Canina, Cynobato, & Cynorrhodo* Offic. usurpari possunt

13. *Rosa* silvestris repens, foliis parvis acuminatis glabris & simpliciter dentatis, flore albo odorato, petalis cordatis, fructu ovato lævi

14. *Rosa* alpina, foliis subrotundis molliter hirsutis & quasi canescentibus ac multipliciter dentatis, flore incarnato odorato, petalis cordatis novem lineas longis & tres latis, fructu rotundo hispido

15. *Rosa* spinosa pumila, foliis odoratis & pulchre dentatis, flore odorato, externe aureo, interne phœniceo, fructu rotundo Michel. H. Pis.

16. *Rosa* pumila spinosissima, caule non ramoso singulis annis pereunte, foliis Pimpinellæ glabris, flore albo odore parvo, petalis cordatis, fructu pyriformi depresso glabro. *An Rosa pumila spinosissima* Inst. R. H. 638

ROSMARINVM spontaneum seu maritimum, foliis longioribus angustioribus & peracutis, flore cæruleo minore

2. Idem foliis angustis brevioribus & minus acutis

3. Idem latifolium, flore cæruleo maiore, cum labio inferiori fimbriato.

* *Hæc Rosmarini species Rosmarinus coronarius, Cassia Latinorum, Cassia nigra Theophrasti, Libanotis coronaria* Offic. & *Ramerino* Ric. promiscue vocantur

RVBEOLA alpina latifolia lævis, floribus purpurascentibus

2. *Rubeola*, quæ *Aparine* latifolia humilior montana Inst. R. H. 114

3. *Rubeola* rotundifolia glabra, floribus albis paniculatim nascentibus

4. *Rubeola* maritima quadrifolia, viticulis crassioribus (foliis ad radicem hirsutis latiusculis & rotundioribus) floribus purpurascentibus (aut albis) Michel. H. Pis.

5. *Rubeola* arvensis supina annua, floribus cæruleis quadripartitis, in parvis & foliosis umbellis dispositis, fructu coronato. *Rubeola arvensis repens*

caerulea C. B. Pin. 334. Prodr. 145. *Rubia parva*, flore caeruleo, se spargens I. B. 3. 719. *Aparine supina pumila*, flore caeruleo Inst. R. H. 114
6. *Rubeola arvensis erecta* flore caeruleo H. Pis.

RVBIA tinctorum sativa Inst. R. H. 114. * *Rubia domestica* Matth. 970. *Rubia quam Officinae Rubia Tinctorum vocant sativa* Casalp. 323. *An Kobbia da Tintori* Ric. *Erythrodanum*, *Rubia* Offic.

2. *Rubia silvestris Monspessulana maior* Inst. R. H. 114. * *An Rubia silvestris* Casalp. 323. *Rubia* Offic.

RVBVS vulgaris, sive *Rubus fructu nigro* Inst. R. H. 614. * *Rovo* Matth. 1063. *Rubus floribus subrubentibus* Casalp. 98. *Huius fructus vocantur Mora, Mora bati, Mora rubi, Vaccinia & More di Siepe* Ric.

2. *Rubus vulgaris spinosus*, flore plenissimo roseo H. Pis.

3. *Rubus flore albo* Inst. R. H. 614. * *Rubus floribus candidis* Casalp. 98

4. *Rubus vulgaris spinis carens* Inst. R. H. 614

5. *Rubus montanus repens*, sarmentis longissimis & rotundis, spinis tenuissimis exasperatis, amplo Coryli folio, flore albo, fructu nigro crassiore Michel. H. Pis.

6. *Rubus vulgaris repens*, sarmentis rotundis spinosis, flore albo, petalis subrotundis parvis. * *Ab Rubi genus alterum humilius* Casalp. 98

7. *Rubus spinosus*, foliis Cotylaceis subtus incanis, flore roseo, petalis oblongis

8. *Rubus repens*, fructu caesio Inst. R. H. 614

RVSCVS myrtifolius aculeatus, fructu rubro Inst. R. H. 79. * *Rusco* Matth. 1274. *Ruscus* Casalp. 221. *Brusco* Ric. *Ruscus* Offic. *Pugnitopo vulgo*

2. *Ruscus myrtifolius aculeatus*, fructu ochroleuco Michel. H. Pis.

3. *Ruscus latifolius*, fructu folio innascente Inst. R. H. 79

4. *Ruscus angustifolius*, fructu folio innascente Inst. R. H. 79 * *Hippoglossa* Matth. 1254. *Bonifacia & Bislingua Anguil. Voularia* Brunf. *Laurus Alexandrina* Tab. *Radix Idaea Dioscoridis* Column.

5. *Ruscus angustiore folio*, fructu folio innascente Inst. R. H. 79

6. *Ruscus angustifolius*, fructu summis ramulis innascente Michel. H. Pis.

RVTA hortensis latifolia Inst. R. H. 257. * *Ruta* Matth. 775. *An Ruta* Casalp. 574

2. *Ruta hortensis altera* Inst. R. H. 257



ABINA folio Tamarisci Dioscoridis C. B. Pin. 487. * *Sabina senza Bacche* Matth. 138

2. *Sabina folio Cupressi* (baccis rubris.) C. B. Pin. 487. * *An Sabina vulgaris* Casalp. 136. *Sabina con le bacche rosse* Matth. 136

3. *Sabina folio Cupressi* (non fructifera) C. B. Pin. 487. * *Hæc, & superior Sabina species promiscue usurpantur pro Sabina, & Savina* Offic.

SALICARIA vulgaris purpurea, foliis oblongis Inst. R. H. 253. * *Vn altra Lysimachia* Matth. 1000. *Lysimachia quæ purpuream edit florem* Casalp. 261

2. *Salicaria Hyslopi folio angustiore* Inst. R. H. 253

SALICORNIA geniculata sempervirens Coroll. Inst. R. H. 51. *Salsoleæ genus multis ramulis fruticans, lignosum & grandius, perpetuum* Casalp. 171

2. *Salicornia geniculata*, annua Coroll. Inst. R. H. 51. * *Salsoleæ genus simplicius & brevius, dodrantali altitudine, rectum annuum* Casalp. 171. *Hæc duæ Salicorniæ species pro Kali Arabum in Offic. usurpantur*

SALIX vulgaris alba arborescens Inst. R. H. 590

2. *Salix Tini folio utrinque glabro, inferne subcinereo, auriculato, & non auriculato* H. Pis.

3. *Salix folio subrotundo latiore, utrinque glabro, aurito*

4. *Salix arborescens, Mespili folio aurito & villoso*

5. *Salix alpina, foliis laurinis ample auriculatis, ad oras crispis & dentatis*

6. *Salix humilis, capitulo squamoso* Inst. R. H. 591

7. *Salix Orientalis flagellis deorsum pulchre pendentibus* Coroll. Inst. R. H. 41

SALVIA montana maxima, foliis Hormini, flore flavescente (punctato) Inst. R. H. 180. * *Melinum aliis Melligo* Casalp. 443. *Colus Iovis* Lob.

2. *Salvia Orientalis frutescens, foliis circinatis, acetabulis* Moluccæ Coroll. Inst. R. H. 10

3. *Salvia Orientalis latifolia hirsutissima viscosa pennata, flore & calyce purpureis, inodora* Boerh. Ind. Alt. H. L. Bat. Part. 2. 167

4. *Salvia bifaurita, floribus ex cæruleo purpureis.* * *An Salvia minore* Matth. 748. *Hæc, & sequentes Salvia species promiscue usurpantur pro Salvia* Offic.

5. *Salvia foliis auritis & non auritis, floribus candidis*

6. *Salvia maior, foliis ex luteo & viridi variegatis* Inst. R. H. 180

7. *Salvia maior, foliis versicoloribus* Inst. R. H. 180

8. *Salvia latifolia maior (tota viridis) flore purpureo, verticillis florum foliosis* Michel. H. Pis.

9. *Eadem tota rubra vel purpurea.* *An Salvia nigra vel rubra* I. B. 3. 304

10. *Salvia maior incana, caule tomentoso, flore purpureo parvo, calyce ventricoso*

11. *Eadem flore albo*

12. *Salvia foliis subrotundis undulatis & ferratis.* *An Salvia latifolia, serrata* Inst. R. H. 180

13. *Salvia foliis tenuissime ferratis, flore parvo violaceo*

L 2

14. Sam-

14. *Salvia Hispanica angustifolia*, Lavandulæ odore (flore magno) Michel. H. Pif. * *Salvia di Spagna vulgo*

SAMBVCVS fructu in umbella nigro Inst. R. H. 606. * *Sambucus Casalp.* 91. *Sambuco Ric.*

2. *Sambucus laciniato folio* Inst. R. H. 606

3. *Sambucus humilis*, sive *Ebulus* Inst. R. H. 606. * *Ebulus Casalp.* 209. *Ebulo Matth.* 1333. *Ebbio Ric.* *Ebulus Offic.*

4. *Sambucus humilis*, sive *Ebulus folio laciniato* Inst. R. H. 606. * *Ebulus Creticus laciniatis foliis* Donn. Cat. Hort. Flor.

SAMOLVS Valerandi Inst. R. H. 143. * *Anagallis aquatica* C. B.

SANICVLA officinarum Inst. R. H. 326. * *Diapensia* ovvero *Sanicola* Matth. 1073. *Sanicula Casalp.* 556. *Consolida quinquefolia* Tabern.

SANTOLINA non viscosa, glauca & glabra, foliis inferioribus angustis & vermiculatis, cæteris Holostei aut Psyllii, capitulis maioribus aureis, flosculis erectis, ramulorum cacuminibus striatis. *An Santolina foliis Rorismarini*, maior Inst. R. H. 461. *An Abrotanum fœmina viridis* C. B. Pin. 137. Mor. Hist. Part. 3. pag. 12, num. 22. Sest. 6. Tab. 3. fig. 22

2. *Santolina viscosa glabra viridis*, foliis graveolentibus, imis vermiculatis, cæteris planis & ad latera cristatis, capitulis aureis maioribus, flosculis surrectis, ramulorum cacuminibus striatis. *Santolina foliis Ericæ vel Sabinæ* Inst. R. H. 460. *Santolina foliis obscure virentibus*, flore aureo Eiusd. 461. Vaill. Act. Ac. R. Sc. Ann. 1719. pag. 412

3. *Santolina alpina* humilis atrovirens tota glabra & ferme inodora, foliis vermiculatis, capitulis maioribus albis, flosculorum tuba & vagina luteis

4. *Santolina Garganica* glabra, foliis obscure virentibus vermiculatis, caulibus canescentibus, capitulis maioribus albis, flosculorum tuba & vagina ochroleucis

5. *Santolina fruticosa erecta*, foliis vermiculatis, imis magis tomentosis & incanis, cæteris viridibus, & ferme glabris, capitulis maioribus luteis, flosculis reflexis. *Santolina flore maiore, foliis villosis & incanis* Inst. R. H. 460. *Polii altera species maior* Col. Part. 1. 49

6. *Santolina foliis vermiculatis*, primariis incanis tomentosis brevibus cum denticulis dense congestis, cæteris virentibus, capitulis mediæ magnitudinis luteis, floribus reflexis, cauliculatorum summitatibus pilosis & striatis. *An Santolina tomentosa crispa Hispanica* Vaill. Act. Ac. R. Sc. Ann. 1719. pag. 412. num. 5

7. *Santolina viscosa*, foliis vermiculatis brevibus, imis viridibus vermiculis minus confertis, cum surculis canis & lanuginosis, cæteris vero pallide virentibus, capitulis luteis mediæ magnitudinis, flosculis reflexis. *An Santolina subviridis, glutinosa* Vaill. Act. Ac. R. Sc. Ann. 1719. pag. 412. num. 6. *Santolina foliis minus incanis* Inst. R. H. 461. *An Abrotanum fœmina Hispanicum tenuifolium virens* Barr. Obs. 91. num. 1020. Icon. 429

8. *Santolina foliis vermiculatis*, primariis subincanis cum caulibus canescentibus, cæteris pallide virentibus, capitulis mediæ magnitudinis luteis, flosculis reflexis

9. *Eadem foliis superioribus viridibus*, ramulis secundariis candidis & tomentosis

10. San-

10. *Santolina* foliis vermiculatis viridibus, caulibus canescentibus, capitulis mediæ magnitudinis luteis, flosculis reflexis

11. *Santolina* foliis vermiculatis viridibus, caulibus novellis & secundariis incanis & tomentosis, capitulis sulphureis mediæ magnitudinis, flosculis reflexis. *An Santolina foliis obscure virentibus flore sulphurei coloris* Inst. R. H. 461. *An Abrotanum fœmina ex viridis semine degener, flore sulphureo* Schol. Bot. Mor. Hist. Oxon. Part. 3. 12. sub num. 22

12. *Santolina* foliis vermiculatis, primariis simul cum caulibus incanis & tomentosis brevibus cum vermiculis dense congestis, secundariis viridibus, capitulis parvis luteis, flosculis admodum reflexis

13. *Santolina* foliis vermiculatis subviridibus, vermiculis minus confertis, ramulis prælongis, primariis canescentibus, cæteris glabris, capitulis parvis luteis, flosculis nonnihil reflexis

14. *Santolina* foliis vermiculatis brevibus, vermiculis minus confertis, imis subincanis, cæteris viridantibus, capitulis parvis, flosculis luteis reflexis, tuba aurea

15. *Santolina* erecta, ramis novellis confertioribus & brevioribus incanis & tomentosis, foliis vermiculatis viridibus, vermiculis confertis, capitulis parvis luteis, flosculis non vel vix reflexis

16. *Santolina* parva repens, foliis vermiculatis, imis incanis & tomentosis, cæteris subincanis, capitulis parvis luteis, flosculis semper erectis, calyce turbinato. *An Santolina repens, & canescens* Inst. R. H. 460. * *Santolina species Abrotanum fœmina in Officinis vocantur, & Crespolina vulgo*

SATVREIA sativa Inst. R. H. 197. * *Satureia* II. Matth. 762. *Santoreggia vulgo*

SAXIFRAGA verna annua humilior Inst. R. H. 252. * *Sedum tridactylites tectorum* C. B. *Paronychia altera* Dod.

SCABIOSA montana latifolia non laciniata rubra & prima Inst. R. H. 464

2. *Scabiosa* latifolia, an rubra non laciniata secunda Inst. R. H. 464

3. *Scabiosa* folio integro hirsuto (capitulo rotundo) Inst. R. H. 466. * *An Morsus Diaboli* Matth. 658. *Hæc & sequens usurpari possunt pro Succisa, & Morsu Diaboli* Offic.

4. *Eadem* minor, capitulo oblongo

5. *Scabiosa* fruticans angustifolia alba Inst. R. H. 464

6. *Scabiosa* Fraxinellæ folio Inst. R. H. 466

7. *Scabiosa* peregrina (glabra) capitulo oblongo nigricante, odore Zibethi Inst. R. H. 465

8. *Eadem* hirsuta

9. *Scabiosa* perennis Italica peregrinæ similis, capitulo oblongo odore nigricante. *An Scabiosa Lustanica peregrina similis* Inst. R. H. 465

10. *Eadem* capitulo rubro

11. *Eadem* capitulo albo

12. *Scabiosa*, an altissima annua, foliis Agrimonis nonnihil similibus Inst. R. H. 464

13. *Scabiosa* maritima perennis minima tenuifolia laciniata subhirsuta, flore cæruleo, semine stellato Michel. H. Pis. *Scabiosa maritima parva* Inst. R. H. 463

SCAN-

SCANDIX femine rostrato, vulgaris Inst. R. H. 326. * *Pettine di Vene-*
re Matth. 557. Scandix vulgo Acicula Casalp. 290

SCIRPOCYPERVS maritimus altissimus, caule rigido pallide virente,
panicula ampliore sparsa, capitulis oblongis inter se distantibus ferrugineis
Michel. Nov. Plant. Gen. 47. num. 1. Tab. 31

2. Scirpocyperus palustris, caule molli atrovirente, panicula sparsa mino-
re, capitulis subrotundis pluribus simul iunctis Michel. Nov. Plant. Gen. 47

3. Scirpocyperus maritimus humilis, caule pallide virenti, panicula glome-
rata Michel. Nov. Plant. Gen. 47

SCIRPOIDES maritimum, capitulis non omnibus in pediculis insidentibus
foliis & scapo supra paniculam carinam ferentibus albicantem Michel.
Nov. Plant. Gen. 52

SCIRPVS Equiseti capitulo maiori Inst. R. H. 528

2. Scirpus omnium minimus, capitulo longiori Inst. R. H. 528

SCLAREA Inst. R. H. 179. * *Sclarea Matth. 939. Sclarea aliis Scar-*
leggia Casalp. 442. Gallitricum Cam. Orvala Cast.

2. Sclarea maxima, foliis amplissimis subrotundis rugosioribus, coma
purpurea odorata, floris labio inferiori albo, superiori subcæruleo. *Sclarea Sy-*
riaca flore albo Inst. R. H. 179

3. Sclarea Asphodeli radice Inst. R. H. 179

4. Sclarea Italica (longifolia) maxima altius radicata, sanguineis maculis
(interdum) notata, flore ex cæruleo purpurascente Michel. H. Pif.

5. Sclarea Italica præalta, flore albo parvo Michel. H. Pif. *Horminum syl-*
vestre maius, flore albo, integris foliis Barr. Icon. 187

6. Sclarea, quæ Horminum Orientale, Betonica folio acutissimo, flore
cæruleo Coroll. Inst. R. H. 10

7. Sclarea, quæ Horminum Orientale, Betonica folio acutissimo, coma
purpurascente Coroll. Inst. R. H. 10

8. Sclarea pratensis, foliis serratis, flore cæruleo Inst. R. H. 179. * *Gal-*
litricum vulgo, & Sclarea sylvestris appellata, ab aliis Chiarella Casalp. 442

9. Sclarea folio Salvæ minor sive glabra (floribus violaceis parvis) Inst.
R. H. 180

10. Sclarea folio Salvæ subtilissime dentato

11. Sclarea Italica pratensis, foliis in profundas lacinias & crenas incisis,
flore cæruleo Michel. H. Pif.

12. Eadem folio subrotundo ampliori, in rotundas lacinias inciso, ac æsti-
vo tempore viridi, brumali vero purpurascente

13. Sclarea Affisiana minor, foliis brevioribus profunde incisis, flore cæruleo

14. Sclarea minor angustifolia, Verbenæ laciniiis, flore cæruleo dilutiore.
Horminum Verbenæ laciniiis, angustifolium Triumph. Obs. 66

SCOLYMVS Chrysanthemos perennis, foliorum venis lacteis simplicioribus &
vix apparentibus notato, caule albicante

2. Idem foliis latis obscure virentibus, caule admodum alato, floribus ra-
rioribus

3. Idem foliis obscure virentibus altius laciniatis, caule vix alato

4. Idem

4. Idem spinosior, foliis obscure virentibus profunde lacinatis ac lacteis venis & maculis notatis, floribus crebris

5. Scolymus foliis latis longioribus ac venis albis simpliciter notatis, caule albicante, flore aureo maiore & rariore, semine tribus dumtaxat aristis munito

SCORZONERA alpina angustifolia perennis, caule ramoso fistuloso, flore maiore suavepurpurascente inodoro, semine striato lævi octo lineas longo

2. Scorzonera latifolia sinuata Inst. R. H. 476. *Scorzonera* Matth. 569. & *Casalp.* 518

3. Scorzonera latifolia non sinuata, semine aspero * *Scorzonera* Offic. ut & *superior*

SCROPHULARIA flore luteo Inst. R. H. 166

2. Scrophularia foetida, radice strumosa, foliis Vrticæ ad petiolum æqualibus. * *Scrophularia* Matth. 1188. *Scrophularia* & *Millemorbia* Offic. ut & *sequens*

3. Eadem foliis ad petiolum acutis

4. Scrophularia foliis Vrticæ nigricantibus altius incis, incisuris dentatis, flore saturo rubro

5. Scrophularia subhirsuta, Vrticæ folio profunde dentato Michel. H. Pis.

6. Scrophularia hirsuta, Melissæ rugoso nigricante & altius dentato folio, ad petiolum Aristolochiæ Saracenicæ instar excavato, flore tres lineas longo, rubro, cum labello inferiori viridi, fructu pyramidato acuto. *An Scrophularia Melissæ folio* Inst. R. H. 166

7. Scrophularia Teucrii folio, glabra, flore parvo, superne saturorubro ad phœniceum tendente, labello inferiori viridi

8. Scrophularia aquatica maior (caule alato) Inst. R. H. 166. * *Betonica aquatica*, & *Scrophularia aquatica* Offic. ut & *sequens*

9. Eadem flore ochroleuco

10. Scrophularia palustris non foetida seu aquatica minor Inst. R. H. 166. * *Scrophularia femina* Cam.

11. Scrophularia Hispanica, Sambuci folio glabro Inst. R. H. 166

12. Scrophularia maxima Lusitanica, Sambuci folio lanuginoso Inst. R. H. 167

13. Scrophularia Raphani folio, flore maximo phœniceo, fructu habitiori peracuto

14. Scrophularia, an Lusitanica frutescens Verbenacæ foliis Inst. R. H. 167

15. Scrophularia, seu Ruta canina maior, Ambrosiæ folio, flore partim saturate purpureo partim albicante, fructu crassiore acuto. *An Siderite* III. Matth. 1058. *Sideritis* III. Matthioli Lugd. 118. *Sideritis altera* Dioscoridis Tabern. Icon. 128

16. Eadem fructu crassiore rotundo. *Scrophularia affinis minor in montibus, foliis brevioribus, divisura ferme Rutæ* *Casalp.* 350. *An Herba mora* Lugd. 1339

17. Eadem folio tenuiter diviso, racemis florum longioribus & magis sparsis, fructu rotundo exiguo. *An Scrophularia minor Ruta Canina dicta.* Inst. R. H. 167

SECVRIDACA lutea maior Inst. R. H. 399

SEDVM maius arborescens Inst. R. H. 262. * *Vn altro Semprevivo* Matth. 1179. *Sempervivi maioris alterum genus ex Sicilia Casalp.* 577

2. Sedum maius vulgare Inst. R. H. 262. * *Semprevivo maggiore* Matth. 1175. *Sempervivum maius Casalp.* 577. *Sedum & Sempervivum maius* Offic. Sopravivolo & Semprevivo vulgo

3. Sedum montanum tomentosum Inst. R. H. 262

4. Sedum Romanum pallide luteum, ramulis inflexis, maius (umbellis florum semper erectis) Michel. H. Pif.

5. Sedum alpinum minus teretifolium luteum non acre, umbellis & radiis florum semper erectis

6. Sedum minus luteum ramulis inflexis, foliis teretibus pallide virentibus, umbellis & radiis florum initio pendulis deinde erectis

7. Idem foliis tenuioribus glaucis acutis & expansis

8. Idem foliis crassis acutis glaucis & expansis

9. Sedum parvum acre, flore luteo Inst. R. H. 263. * *An Semprevivo minimo* Matth. 1177. *Aizoon acre Cord. Vermicularis sive Illecebra* Ger.

10. Sedum minimum luteum non acre Inst. R. H. 263

11. Sedum minus teretifolium album Inst. R. H. 262. * *Semprevivo minore* Matth. 1179. *Vermicularis & Illecebra maior* Lob. *An Vermiculare An. Semprevivo* Rsc. *Erba Pignuola & Pinocchiella* vulgo

12. Sedum montanum tetraphyllum floribus albis, foliis planis Michel. H. Pif.

13. Sedum echinatum vel stellatum, flore albo Inst. R. H. 263. * *Cotyledon stellata* C. B.

14. Sedum minus, folio circinato Inst. R. H. 263

SENECIO minor vulgaris Inst. R. H. 456. * *Senecio* Matth. 1191. *Casalp.* 537. *Erigeron* L. B. *Senecio* Offic.

SERIPHIVM maritimum Italicum incanum, foliis Lavandulæ, in furculis non floriferis partim integris partim multifidis, in floriferis vero integris, panicula surrecta contracta seu cupressina, capitulis bilinearibus erectis invicem appressis. *Absinthium maritimum, foliis superioribus in aliquot lacinias divisis* C. B. Pin. 139. Inst. R. H. 458. *Artemisia subincana, foliis inferioribus trifidis vel quinquefidis* Bot. Par. in Act. Ac. R. Sc. Ann. 1719. pag. 375. n. 5. * *An Assenzo Marino* Matth. 725. *Absinthium maritimum* Offic.

2. Idem foliis inferioribus multifidis, superioribus integris & ad Linariam accedentibus. *Seriphium Lavandulæ folio minus ramosum* Zannich. Ist. 135

3. Idem foliis ab imo ad medium laciniatis, in summitatibus vero integris & obscure mucronatis

4. Seriphium maritimum Italicum incanum, foliis multifidis, coma sparsa, capitulis cylindraceis bilinearibus nutantibus & inter se distantibus. *Seriphium Lavandulæ folio* Zannich. Ist. Tab. 156

5. Idem montanum Italicum, foliis tenuissime divisis, capitulis angustioribus. *Absinthii alterum genus in collibus argillofis agri Senensis, brevius, odoris & saporis minus ingrati* Casalp. 479. * *Absinthium montanum* Offic.

SERPILLVM maius latifolium (glabrum, floribus albidis perexiguis) C. B. Pin. 220. *An Serpillo* Matth. 763. *An Serpillum* Casalp. 465. *Sermollino* vulgo ut & sequentes

2. Ser-

2. *Serpillum maius*, caulibus hirsutis, foliis Maioranæ glabris, floribus maiusculis purpurascens, staminulis longis
3. Idem foliis Maioranæ longioribus, caulibus subhirsutis, spica interrupta, floribus exiguis ex albo purpurascens, staminulis brevioribus
4. *Serpillum latifolium hirsutum*, floribus purpureis maioribus. *An Serpillum latifolium hirsutum* Inst. R. H. 197
5. *Serpillum glabrum*, foliis minoribus subrotundis, flore purpureo maiusculo
6. *Serpillum alpinum latifolium præcox glabrum*, foliis Maioranæ, floribus purpurascens, exiguis, in spicam brevem & densam congestis, staminulis brevissimis
7. *Serpillum vulgare minus* Inst. R. H. 197. * *Vn altro Serpillo* Matth. 764. *Serpillo* Ric. *Serpillum* Offic.
8. *Serpillum maritimum glabrum*, Hyssopi folio, ferme inodorum & quasi insipidum, flore maiusculo purpurascens

SHERARDIA Dill. Nov. Plant. Gen. in Suppl. Floræ Gif. 96. *Verbena nodiflora* C. B. Prodr. 125

SIDERITIS, an Orientalis, Phlomidis folio Coroll. Inst. R. H. 12

2. *Sideritis frutescens*, folio incano Oleæ Boerh. Ind. Alt. H. L. Bat. Part. 1. 172
3. *Sideritis vulgaris hirsuta erecta*, foliis oblongis, floribus albidis vel pallidis, circa faucem & in inferiori labio maculis & punctulis sanguineis notatis. *An Sideritis vulgaris hirsuta erecta* C. B. Pin. 233. * *Tetrahitis* Lugd. *Sideritis Heraclea* Cord. *Ferruminatrix* Lob.
4. *Sideritis vulgaris hirsuta*, foliis brevibus subrotundis
5. *Sideritis maritima procumbens*, folio angusto crenato, flore maiore albedo vel ochroleuco punctulis sanguineis notato

SILIQVA edulis Inst. R. H. 578. * *Siliqua* Marc. 70. *Casalp.* 110. *Siliqua* Matth. 257. *Carrubbio* Ric. *Siliqua dulcis* Alp. *Ceratia* Bellon. *Ceratonina* Dod.

SILIQVASTRUM Inst. R. H. 647. * *Siliqua sylvestris* *Casalp.* 111. *Arbor Iudæ* Bellon.

SINAPI Indicum maximum, Lactucæ folio Inst. R. H. 228

SISARUM Germanorum Inst. R. H. 309. * *Sisaro* Matth. 470. *Sifer Germanicum* *Casalp.* 314

SISYMBRIVM aquaticum Inst. R. H. 226. * *Sisymbro aquatico* Matth. 516. *Sisymbrium aquaticum* vulgo *Crescione* *Casalp.* 362. *Sisymbrium aquaticum* Offic.

2. *Sisymbrium palustre repens latifolium maius*, foliis inferioribus Erythralis instar laciniatis, cæteris integris, floribus luteis, siliquis brevissimis
3. *Sisymbrium aquaticum repens minus*, foliis in profundas lacinias divisis, sectionibus pulchre dentatis, floribus luteis, siliqua brevi nonnihil incurva. *An Raphanus minimus repens luteus, foliis tenuiter divisis, seu Ra-*

phanus minimus repens luteus, Nasturtii vulgaris bortenſis facie Mor. Hiſt. Oxon. Part. 2. 236. Sect. 3. Tab. 7. fig. 1

4. Idem foliis in profundas anguſtas & acutas lacinias diviſis. *An Raphanum aquaticum Tabern. Icon. 475. Rapiſtrum aquaticum Ger. Emac. 234. An Siſymbrio aquatiko affinis prima Caſalp. 362*

5. Siſymbrium paluſtre minus, ſiliqua glabra Inſt. R. H. 226

6. Siſymbrium Erucæ folio glabro, flore luteo, maius, ſiliquis expanſis

7. Idem ſiliquis ad caulem ferme contractis

8. Siſymbrium Erucæ folio anguſtiori, in multos aſſiduos & non auritos lobos diviſo, floribus luteis, petalis obtuſis quatuor lineas longis ac decuſſatim poſitis, ſiliquis duas uncias cum dimidio longis craſſioribus & expanſis. *Barbarea foliis minoribus & frequentius ſinuatis Raii Hiſt. Tom. 1. 809*

9. Siſymbrium, quod Sinapi aquaticum Patavinum I. B. 2. 867

10. Siſymbrium annuum, Abſinchi minoris folio Inſt. R. H. 226. * *Acipitrina Caſalp. 361. Sophia Chirurgorum Dod.*

SISYRINCHIVM maritimum Apulum polyanthes

1. SIVM aquaticum ad alas floridum Inſt. R. H. 308

2. Sium (aquaticum) ad alas floridum, caule tenuiori, erectius & elatius Michel. H. Piſ.

3. Sium, ſive Apium paluſtre, foliis oblongis Inſt. R. H. 308. * *Sio vero Matth. 511. Laver, Creſcione vulgo, & Herba Cannella Caſalp. 300*

4. Sium arvenſe ſive ſegetum Inſt. R. H. 308

5. Sium aromaticum, Siſon Officinarum Inſt. R. H. 308. * *Siſone Ric. Amomum C. B.*

SMILAX ſarmentis aculeatis & non aculeatis, Ariſtolochiæ rotundæ folio plerumque lævi, flore ſubrubente H. Piſ.

2. Smilax folio haſtato longiſſimo maculato. * *Smilace aſpra Ric.*

3. Smilax aſpera, Thamni folio minus aculeato, fruſtu rotundo rubro H. Piſ.

4. Smilax ſpicata, Polygonati folio Inſt. R. H. 654

5. Smilax unifolia, humiſſima App. Inſt. R. H. 654. * *Vniſolium Dod.*

SMYRNIVM vulgare annuum, Angelicæ folio & facie, umbellis pallidis, primariis nudis, ſecundariis vero folioſis, ſemine craſſiore nigro. *Smyrnium Inſt. R. H. 316. * Smirnio Matth. 817. Olusatrum, vulgo Macerone Caſalp. 303. Hippofelinum Dod.*

2. Smyrnium Luſitanicum minus, Apii folio Inſt. R. H. 316

SOLANVM Officinarum acinis nigricantibus Inſt. R. H. 148. * *Solatro Hortolano con le bacche nere Matth. 1127. Solanum minus, fruſtu in maturitate nigro Caſalp. 213. Solatro Ric.*

2. Solanum Officinarum acinis puniceis Inſt. R. H. 148. * *Solatro Hortolano con le bacche verdiccie Matth. 1187*

3. Solanum Officinarum acinis e luteo viſcentibus Inſt. R. H. 148. * *Solanum minus fruſtu in maturitate flavo Caſalp. 213*

4. Solanum ſcandens, ſeu Dulcamara Inſt. R. H. 149. * *Vite Salvatica Matth. 1345. Salicaſtrum Plinii Caſalp. 20*

5. Solanum pomiferum frutescens Africanum spinosum nigricans, flore Borriginis, foliis profunde laciniatis H. L. Bat. 572. * *Solanum spinosum perenne arboreescens non descriptum* Donn. Cat. H. Flor.

6. Solanum flore purpurascens, foliis parvis integris, baccis perexiguis rubris

7. Solanum tuberosum, esculentum Inst. R. H. 149. * *Arachidna Theophrasti*, *Papas Peruanorum* Clus.

8. Solanum Guineense fructu magno instar Cerasi, nigerrimo, umbellato Boerh. Ind.

9. Solanum fruticosum bacciferum Inst. R. H. 149. * *Strychnodendros* I. B. *Pseudocapsicum* Dod.

SOLDANELLA alpina rotundifolia Inst. R. H. 82

SOLIDAGO palustris altissima, Salicis folio ferrato & subtus incano. *Virga Aurea*, sive *Solidagini angustifoliae affinis*, *Lingua Avis*. Dalecampii I. B. 2. 1063. *Lingua maior* Lugd. 1037. *Conyza maxima ferratifolia* Thel. Tab. III.

2. Eadem folio altius ferrato, utrinque virente aut inferne dumtaxat subcinereo, & per basim auriculato. *An Consolidia Palustris* Tabern. Icon. 555

SONCHVS laevis laciniatus latifolius Inst. R. H. 474. * *Soncho liscio* Matth. 526. *Cicerbita* Ric. & vulgo. *Sonchus laevis* Offic.

2. *Sonchus asper* laciniatus, folio *Dentis Leonis* Inst. R. H. 474. * *Soncho aspero* Matth. 525. *Sonchus alia in rudribus* Casalp. 511. *Sonchus aspera* Offic. *Cicerbita vulgo*

3. *Sonchus asper* non laciniatus Inst. R. H. 474. *Sonchus quae vulgo Cicerbita vocatur*, & alicubi *Crespinulus* Casalp. 511. *Intybus sylvestris*, seu *eratica* Offic.

4. *Sonchus repens*, multis *Hieracium maius* Inst. R. H. 474. * *An Hieracio maggiore* Matth. 808

5. *Sonchus angustifolius maritimus* Inst. R. H. 474

SONCHVS vide **CREPIS**

SORBVS fativa Inst. R. H. 630

2. *Sorbus aucuparia* Inst. R. H. 634. * *Sorbo salvatico* Matth. 283. *An Sorbus sylvestris in Alpibus* Casalp. 145. *Fraxinus Bubula* Dod. *Fraxinus aucuparia* Gesn.

SPHONDYLIVM, an maius, sive *Panax Heracleum* quibusdam Inst. R. H. 320. * *An Panace Heracleo* Matth. 783. *An Panax Herculeum vulgo a nostris Panacea* Casalp. 311. *Panace Herculeo di Dioscoride* Ric.

SPIRAEA Hyperici folio non crenato Inst. R. H. 618

STACHYS maior Italica, foliis amplioribus undulatis

2. *Stachys maior*, Germanica Inst. R. H. 186. * *Stachi falso* Matth. 878. *An Salvia sylvestris a quibusdam Matrisalvia appellata* Casalp. 441

3. *Stachys*, an alba latifolia maior Barr. Obs. 26. n. 243. Icon. 297. *Stachys Cretica latifolia* Inst. R. H. 186. & *Voyag. du Levant*. Tom. I. II. Tab. I

4. *Stachys maior latifolia*, flore variegato, verticillis spinosis crassis & rarius dispositis
5. *Stachys maior Italica*, spica florum tenuissima, flore purpureo variegato, calyculis non pungentibus
6. *Stachys maior*, *Salviæ folio pyramidato flore dilute purpureo variegato*
7. *Stachys minor Italica* Inst. R. H. 186. * *Stachi* Matth. 877
8. *Stachys alba angusto Salviæ folio* Barr. Icon. 279
9. *Stachys incana*, *Salviæ folio*, floribus luteis, punctis purpureis notatis
10. *Stachys alpina omnium maxima*, *Viburni folio*, flore dilute purpureo variegato
11. *Stachys*, quæ *Galeopsis montana*, *Betonicæ folio angustiore*, flore variegato Michel. H. Pis.

STAPHYLODENDRON Inst. R. H. 616. * *Staphilodendro* Matth. 295. *Staphylodendron* Casalp. 120. *Nux Vesicaria* Trag.

STATICE Inst. R. H. 341

STOECHAS purpurea Inst. R. H. 201. * *Stecba* Matth. 736. *Spica Italica* genus sylvestre *Stichados* vulgo vocatum Casalp. 459. *Stæchas Arabica* & *Stichas* Offic.

STRAMONIVM fructu spinoso oblongo, flore albo Inst. R. H. 119. * *Solanum somniferum* Bellon. *Solanum Manicum* Col. *Datura Turcarum* Eysf.
 2. *Stramonium Ægyptiacum*, flore pleno intus albo foris violaceo Inst. R. H. 119
 3. *Stramonium ferox* Inst. R. H. 119

STYRAX folio Mali Cotonei Inst. R. H. 598. * *Stirace* Matth. 100. *Arbore simile al Melo Cotogno, del quale è Gomma la Storace* Calamita Ric. 68

SVBER latifolium perpetuo virens Inst. R. H. 584. * *Pbellos* Dod. *Sughero vulgo*
 2. *Suber perpetuo virens*, cortice tenuiori, Cerri folio, glande maiore cylindræa obtusa, cupula crinita H. Pis. * *Pbellodrys* C. B. *Cerrosughero vulgo*

SYLIBVM albis maculis notatum, flore purpureo Vaill. in Aët. Ac. R. Sc. Ann. 1718. pag. 219. num. 1. * *Cardo Santa Maria. Herba del Latte* Matth. 702. *Cardui sylvestris aliud genus Lac Divæ Mariæ appellatum* Casalp. 527
 2. *Sylibum non maculatum*, flore purpureo Vaill. in Aët. Ac. R. Sc. An. 1718. pag. 219. num. 2

SYMPHYTVM *Consolida maior*, flore purpureo, quæ mas Inst. R. H. 138. * *Consolida maggiore da fiori porporei* Matth. 1012. *Consolida* Casalp. 434. *An Consolida maggiore* Ric.
 2. *Symphytum Consolida maior*, flore variegato Inst. R. H. 138
 3. *Symphytum Consolida maior*, flore albo vel pallide luteo, quæ scæmina Inst. R. H. 138. * *An Consolida maggiore da fiori gialli, e bianchi* Matth. 1012

4. Sym-

4. Symphytum maius, tuberosa radice Inst. R. H. 138. * *An Consolida al-
tera minor Casalp. 435. Consolida Ric. Consolida tuberosa vel nodosa. Sym-
phytum tuberosum Offic. ut, & sequens*

5. Symphytum, an minus, tuberosa radice Inst. R. H. 138

6. Symphytum Echii folio angustiore, radice rubra, flore luteo Inst. R. H. 138

SYRINGA alba, five Philadelphus Athenæi Inst. R. H. 617. * *Siringa
Casalp. 95. Salindia vulgo*



AMARISCVS Germanica Inst. R. H. 661

2. Tamariscus Narbonensis Inst. R. H. 661. * *Myrica Ca-
salp. 126. Tamarix. Tamariscus Offic. Tamerigia vulgo*

TAMNVS racemosa, flore minore luteopalescente Inst. R.
H. 103. * *An Vite nera Matth. 1348. An Tamarum vulgo, alijs. Cerafiola
Casalp. 206. Bryonia nigra Offic.*

TANACETVM vulgare luteum Inst. R. H. 461. * *Tanaceto Matth.
958. Tanacetum Casalp. 479. Athanasia Lac. Artemisia Dioscoridis Tab. Ta-
nacetum Offic.*

2. Tanacetum foliis crispis Inst. R. H. 461

3. Idem maius

TANACETVM vide BALSAMITA

TAXVS florifera, & non fructifera H. Pis. * *Taxus vulgo Nassus voca-
ta, flosculos amentaceos ferens interfolia sine fructu Casalp. 134. Smilax ar-
bor Cam. Albero della morte & Nasso vulgo*

TELEPHIOIDES Græca humifusa, flore albo Coroll. Inst. R. H. 50

TEREBINTHVS vulgaris Inst. R. H. 579. * *Terebintho Matth. 125. An
Terebinthus Casalp. 78*

2. Terebinthus Indica Theophrasti, Pistacia Dioscoridis Inst. R. H. 580.
Pistacchi Matth. 294. Pistacchio vulgo

TEVCRIVM supinum perenne palustre Apulum glabrum, foliis lacinia-
tis, flore albo Michel. H. Pis. Tab. 49. fig. 1

THALICTRVM maius, filiqua angulosa aut striata Inst. R. H. 270.
* *Ruta sylvestris altera humilior Casalp. 371. Saxifraga lutea, & Ruta pra-
tensis Gessn.*

2. Thalictrum maius flavum, staminulis luteis, vel glauco folio Inst. R. H. 270

3. Thalictrum minus, Adianti folio, floribus pendulis, staminulis glaucis,
feminibus crassioribus bilineraribus striatis

4. Tha-

4. *Thalictrum alpinum* præcox, caule purpurascente, foliis Aquilegiæ, staminulis florum albis cum apicibus citrinis, fructu trilatere acuto quinquelineari

5. Idem staminulis florum purpurascens, fructu dense collecto

6. Idem serotinum, caule subpurpureo, foliis atroviridibus minoribus & quasi complicatis, apicibus pallidis

7. Idem caule viridi, Aquilegiæ foliis minoribus quasi complicatis, staminulis florum purpurascens, apicibus subpallidis, fructu obtuso semunciali

8. Idem serotinum foliis minoribus, apicibus subluteis, fructu obtuso semunciali

9. Idem humile, foliis minoribus & rotundioribus ac parum incis, fructu habitiori semunciali

10. Idem humile, caule viridi, foliis rotundioribus rugosis, floribus purpurascens, apicibus citrinis, fructu brevi obtuso, pediculo longo appenso

THAPSIA sive Turbith Garganicum, semine latissimo Inst. R. H. 322.

* Turpetum ex Gargano Apuliæ Monte de Thapsia radicibus concinnatum Garz.

2. Thapsia montana omnium maxima, foliis lobatis (umbellis luteis) Michel. H. Pis.

THLASPI alpinum fruticosum sempervirens, foliis carnosissimis sesquiunciam longis & duas latis, floribus albis, petalis latiusculis inæqualibus. *Tblaspi Alpinum fruticosum sempervirens album, foliis angustioribus carnosissimis Michel. H. Pis.*

2. Thlaspi fruticosum sempervirens, foliis biuncialibus lineam latis, floribus albis spicatis, petalis angustis inæqualibus: *An Tblaspi e Racusa non descriptum Donn. Cat. Plant. H. Flor. 64*

3. Thlaspi Creticum quibusdam, flore rubente & albo Inst. R. H. 213.

* *Tblaspi III. Matth. 600. Tblaspi Creticum Casalp. 367*

4. Thlaspi arvense filiquis latis Inst. R. H. 212. * *Tblaspi II. Matth. 598. Tblaspi Casalp. 366. Tblaspi Ric. 69*

THLASPIDIVM fruticosum, Leucoii folio, semperflorens Inst. R. H. 214

2. Thlaspidium Apulum spicatum Inst. R. H. 215.

THYMBRA altera vulgaris, radicibus tenuibus sparsis H. Pis. * *Saffragia vera di Dioscoride Matth. 1028*

THYMELAEA Lauri folio, sempervirens, sive Laureola mas Inst. R. H. 595. * *Laureola & Mezercon Arabum Offic.*

THYMVS vulgaris, folio tenuiore Inst. R. H. 196. * *An Pepolina ab aliis Piperella Casalp. 466. Thymo Ric. 69*

2. Thymus vulgaris subincanus, foliis lanceolatis, floribus subpurpureis

3. Thymus vulgaris, repens vel supinus, vix aut nequaquam incanus, Serpilli folio angusto, floribus purpurascens. *An Thymus supinus candicans odoratus Inst. R. H. 196*

4. Thymus virens, odore Hirci, Italicus Barr. Obs. 29

TILIA foemina folio maiore Inst. R. H. 611. * *Tilia* Marc. 58. *Tilia* femina Matth. 191. *Tilia* foemina Cæsalp. 41. *Tilia* Offic. Tiglia vulgo
2. *Tilia* foemina folio minore Inst. R. H. 611

TINVS prior Inst. R. H. 607
2. *Tinus* alter Inst. R. H. 607
3. *Tinus* tertius Inst. R. H. 607
4. *Tinus* sive *Laurus* sylvestris, semine rotundo H. Pis. * *Laurus* sylvestris Offic. ut, & superiores & Lentaggine vulgo

TITHYMALVS silvaticus, lunato flore Inst. R. H. 85
2. *Tithymalus* caracias Cæsalp. 373
3. *Tithymalus* latifolius, Cataputia dictus Inst. R. H. 86. * *Latbiri* Matth. 1321. *Cataputia* Cæsalp. 377. *Catapucia*, & *Latbyris* Offic.
4. *Tithymalus* palustris fruticosus Inst. R. H. 87. * *Tithymalus* palustris Cæsalp. 374. *Esula* maior Offic.
5. *Tithymalus* myrsinites latifolius Inst. R. H. 86. * *Tithymalo* Myrsinite Matth. 1312. *Tithymalus* Myrsinites Cæsalp. 376
6. *Tithymalus* sive *Esula* exigua Inst. R. H. 86. * *Tithimalo* leptisillo Matth. 1317
7. *Tithymalus* montanus, non acris Inst. R. H. 85
8. *Tithymalus* cyparissias maior. * *Hec*, & *dua* sequentes *Tithymali* species usurpari promiscue possunt pro *Esula* minore, & *Tithymalo* Cyparissia Ric.
9. *Tithymalus* cyparissias Inst. R. H. 86. * *Tithymalus* *Esula* in Officinis vocatus Cæsalp. 374
10. *Tithymalus* cyparissias Matth. 1315
11. *Tithymalus* palustris repens, Salicis folio, caule punctis sanguineis notato H. Pis.
12. *Tithymalus* repens, folio *Esulae* minoris Dodonæi, glauco tamen, & elatior Lel. Triumf. ap. fratr. 65
13. *Tithymalus* repens elatior, Salicis aut *Olea* folio glauco, umbella amplissima, fructu ad angulos verrucoso
14. *Tithymalus* arboreus altissimus, folio Salicis, caulibus rubescentibus Boerh. Ind. Alt. H. L. Bat. Part. 1. 255. * *Tithymalus* arboreescens Cæsalp. 376
15. *Tithymalus*, an folio longo glauco, caule rubente, feminibus verrucosis Raii Syllog. 249
16. *Tithymalus* nemorosus, acutiori folio, dulcis Barr. Obs. numer. 24. Icon. 834
17. *Tithymalus* saxatilis, glauco folio, umbella lutea, altius radicans
18. *Tithymalus* maritimus, glauco folio. * *Tithimalo* Paralio Matth. 1313. *An Maritimus Tithymalus* Cæsalp. 375
19. *Tithymalus* arboreus linifolius Inst. R. H. 87
20. *Tithymalus* Lini folio, maior, Italicus Barr. Icon. 821
21. *Tithymalus* (annuus) argenteus maritimus leptophyllos Lel. Triumf. ap. fratr. 65
22. *Tithymalus* Helioscopius Inst. R. H. 87. * *Tithimalo* Helioscopio Matth. 1314. *Tithymalus* Helioscopius Cæsalp. 378
23. *Tithymalus* rotundis foliis non crenatis Inst. R. H. 87. * *Peplo* Matth. 1322. *Pepalus* Cæsalp. 378. *Esula* rotunda Ric.

24. *Ti-*

24. *Tithymalus exiguus glaber*, Nummulariæ folio Inst. R. H. 87. * *Chamaesyce* Offic. ut & sequens

25. *Tithymalus exiguus villosus*, Nummulariæ folio Inst. R. H. 87

TORDILIVM *Italicum*, minus Michel. H. Pis. *Seseli Creticum maius* C. B. Pin. 161

TORMENTILLA maior erecta, foliis altius crenatis. An *Tormentilla sylvestris* Inst. R. H. 398. * *Tormentilla* Matth. 998. & Ric. Hac, & sequentes promiscue usurpantur pro *Tormentilla*, & *Heptaphyllo* Offic.

2. *Tormentilla minor procumbens*, foliis læviter crenatis

3. Eadem gracilior, foliis angustioribus

TOXICODENDRON triphyllon glabrum Inst. R. H. 610. * *Hedera trifolia Canadensis* Corn.

TRACHELIVM azureum umbelliferum Inst. R. H. 170

TRAGOPOGON pratense luteum maius Inst. R. H. 477. * *Tragopogon* Matth. 567. *Tragopogon vulgo Salsifraga* Casalp. 517.

TRAGOSELINVM maius, umbella candida Inst. R. H. 309. *Pimpinella saxifraga* Matth. 1086. *Saxifraga Hircina maior* I. B.

2. *Tragoselinum minus subhirsutum*, foliis Apii tantum circa radicem, caule nudo altiori & ramosiori, umbellis albis primariis & secundariis non foliosis, semine candicante

3. *Tragoselinum minus* foliis inferioribus Sanguisorbæ, cæteris Millefolii, umbella alba

4. Idem foliis superioribus Oenanthes, umbella nuda, semine glabro

TRIBVLVS terrestris, Ciceris folio, seminum integumento aculeato Inst. R. H. 266. *Tribolo terrestre* Matth. 1026.

TRIFOLIASTRVM pratense corymbiferum maius repens, folio subrotundo duabus falcatis maculis insignito, quarum maior albida altera ferruginea, capitulis suave rubentibus, siliquis

2. *Trifolium pratense corymbiferum repens minus*, folio subrotundo macula alba sagittata minima, siliquis tetraspermis Michel. Nov. Plantar. Gen. 27. num. 11

3. *Trifolium annuum corymbiferum album & procumbens*, folio cordato subtus atrovirente splendente, siliqua tetrasperma inferne falcatim discriminata Michel. Nov. Plant. Gen. 27. Ord. 2. n. 2. Tab. 25. fig. 6

4. *Trifolium arvense sive Lupulinum minus*, folio cordato, partim supinum partim erectum, capitulis florum crassioribus initio e luteo virescentibus postea albicantibus & tandem fulvis, pediculis semiuncialibus & uncialibus insidentibus, siliqua compressa monosperma Michel. Nov. Plant. Gen. 29. Ord. 6. n. 5

TRIFOLIVM bitumen redolens Inst. R. H. 44. * *Trifoglio Asphaltite* Matth. 882. *Trifolium bituminosum* Casalp. 242. Hoc, & sequens *Trifolium* promiscue in Officinis vocantur *Trifolium Asphaltite*, seu *Bituminosum*

2. Tri-

2. *Trifolium bitumen redolens, angustifolium* Boerh. Ind. Alt. H. L. Bat. Part. 2. 32.
3. *Trifolium pratense (præcox) flore monopetalo* Inst. R. H. 404. * *Hæc, & sequens Trifolii pratensis species promiscue in Officinis usurpantur pro Trifolio vulgari, & vulgo Trifoglio vocantur.*
4. *Trifolium pratense (serotinum) flore monopetalo* Inst. R. H. 404.
5. *Trifolium pratense hirsutum maius (foliis oblongis rerufis & nonnihil abscissis) flore (monopetalo) albosulphureo seu ochroleuco* Raii Synopf. Ed. 2. 193. & Ed. 3. 328. num. 3.
6. *Trifolium montanum, spica longissima rubente* Inst. R. H. 405. * *Cytisus Trag. Pes Milvi Pandectarii.*
7. *Trifolium montanum purpureum maius* Inst. R. H. 404.
8. *Trifolium montanum, foliis oblongis ad margines pilosis.*
9. *Trifolium Fragiferum nostras purpureum folio oblongo* Inst. R. H. 406.
10. *Trifolium arvense humile spicatum, sive Lagopus* Inst. R. H. 405.

TVLIPA præcox lutea Inst. R. H. 373. * *Hæ Tulipa species Lilionarcifus quibusdam vocantur.*

2. *Tulipa præcox rubra* Inst. R. H. 373. * *Narcisso V. Matth. 1305.*
3. *Tulipa præcox alba* Inst. R. H. 373.
4. *Tulipa minor lutea Italica* Inst. R. H. 376. * *Lonchitis Casalp. 412.*
5. *Tulipa variegata Persica* Inst. R. H. 376.

TVRRITIS Inst. R. H. 223. * *An Accipitrina quadam cauliculo simplicis Casalp. 361. Turritis Lob. Turrita Clus. Vaccaria Tabern.*

2. *Turritis foliis inferioribus Cichoriaceis, cæteris Perfoliatæ* Inst. R. H. 224.
3. *Turritis vulgaris ramosa* Inst. R. H. 224. * *Pilosella filiquata Tbal.*

TVSSILAGO vulgaris Inst. R. H. 487. * *Tossilaggine Matth. 893. Tussilago, quæ vulgo Farsura, ab aliis Vngula Caballina vocatur Casalp. 490 Bechium, Vngula Caballina, Lactuca Vstularia, & Tussilago Offic.*



VALERIANA hortensis, Phu folio Olusatris Dioscoridis Inst. R. H. 132. * *Valeriana Marc. 12. Phu maggiore Matth. 43. Valeriana Casalp. 48. Phu verum, vel maius. Valeriana optima. Carpesium Offic. Valeriana Domestica, o maggiore Ric.*

2. *Valeriana silvestris maior* Inst. R. H. 132. * *Phu minore Matth. 44. Valeriana silvestris Casalp. 148. Hæc, & sequens promiscue usurpantur pro Valeriana silvestri, seu minore Offic. & Valeriana salvatica e minore Ric.*
3. *Eadem foliis angustioribus, floribus prorsus albis.*
4. *Valeriana alpina prima* Inst. R. H. 131. * *An Valeriana inodora Casalp. 150?*
5. *Valeriana rubra* Inst. R. H. 131. * *Valeriana tertia inodora Casalp. 150. Beben rubrum Offic.*

6. *Valeriana alpina* Nardo Celticae similis Inst. R. H. 131.

VERATRUM foliis glabris, caule simplici virescente, floribus parvis atropurpureis in spicis hinc inde ad caulem dispositis. *An Veratrum flore atrorubente* Inst. R. H. 273. *An Ellebori alba alterum genus* Casalp. 580?

2. *Veratrum* flore subviridi Inst. R. H. 273. * *Elleboro bianco* Matth. 1274.
6. *Ric. Elleborus albus* Casalp. 580. *Veratrum album*, & *Elleborus albus* Offic.
3. *Veratrum alpinum* parvum præcox.

VERBASCUM tomentosum ramosum latifolium maximum, & minus incanum, foliis ferratis (per basim laciniatis) caule non alato, flore luteo magno Michel. H. Pis.

2. *Verbascum mas* (annuum tomentosum) latifolium luteum (caule alato, foliis non ferratis, flore parvo) Inst. R. H. 146. * *Verbascum prima* Matth. 1202. *Verbascum. Tapsus barbatus* Offic. Tasso Barbassio vulgo.

3. *Verbascum nigrum* latifolium annuum, pulvisculo candidissimo undique obductum (caule rotundo) flore luteo parvo, staminulis croceis lanugine alba præditis Michel. H. Pis. * *An Verbascum Lichnide* Matth. 1206.

4. *Verbascum montanum* annuum tomentosum lutescens, caule non alato, foliis non ferratis, spica compacta, floribus parvis luteis, staminulis & lanugine concolore, apicibus croceis. *Verbascum montanum tomentosum luteum, unica florum spica densissima* H. Pis. Tab. 50. fig. 1

5. *Verbascum nigrum* perenne, folio cubitali crenato, caule non alato, flore luteo parvo, staminulis concoloribus, & lanugine alba (purpurascens potius) præditis Michel. H. Pis.

6. *Verbascum maritimum* perenne incanum & tomentosum, caule rotundo simplici, foliis angustis ferratis, flore luteo parvo, staminulis cum lanugine purpurascens.

7. *Verbascum perenne* glabrum, angusto & viridi subtus incano folio (caule non alato) flore luteo parvo, staminulis croceis & lanugine alba testis Michel. H. Pis.

8. *Verbascum annuum præaltum*, *Mandragoræ* folio læviter ferrato inferne subincano, caule præalto ramoso & striato, floribus parvis albis, staminulis & lanugine concolore, apicibus croceis. *An Verbascum Lychnitis flore albo parvo* Inst. R. H. 147.

9. *Verbascum nigrum*, folio *Papaveris corniculati* Inst. R. H. 147. * *Vn altro Verbascum* Matth. 1207.

VERBENA communis cæruleo flore (foliis dissectis) Inst. R. H. 200. * *Verbena* Casalp. 450. * *Hec, & sequens promiscue usurpantur pro Verbena, Herba Sacra, Hierobotane, Herba S. Ioannis, & Berbena.*

2. *Eadem* foliis non, vel parum dissectis * *Verbenaca* Matth. 1107.

3. *Verbena Vrticæfolia* *Canadensis* Inst. R. H. 200.

4. *Verbena Vrticæfolia* *Canadensis*, foliis incis, flore maiore Inst. R. H. 200.

VERONICA minor (frutescens, caule rotundo) foliis imis rotundioribus (superioribus oblongis & acuminatis, floribus purpureis vel saturate cæruleis) Inst. R. H. 144. * *Teucrium pratense Chamaedryoides* Lob.

2. *Eadem* foliis profunde & eleganter incis, floribus amœne cæruleis.

3. Ve-

3. Veronica mas supina & vulgarissima Inst. R. H. 143. * *Veronica Maschio* Matth. 730. *Veronica mas* Offic.
4. Veronica minor angustifolia ramosior & procumbens Inst. R. H. 144
5. Veronica maxima Inst. R. H. 144
6. Veronica, an pratensis serpillifolia Inst. R. H. 144
7. Veronica alpina glabra, rotundo Alfine Plantaginis folio Bocc. Mus. Part. 2. 18. Tab. 7
8. Veronica aquatica minor, folio subrotundo Inst. R. H. 145. * *Becabungia*, *Anagallis aquatica*, *Veronica aquatica* Offic.
9. Veronica spicata purpurea erecta ramosa hirsuta & subincana (foliis brevibus leviter & rotunde crenatis, floribus compactis) Michel. H. Pis. *Auricula muris quarta in Pratis Casalp.* 336
10. Veronica spicata subhirsuta erecta, foliis acutis, rarioribus crenis incis, floribus cæruleis parvis non compactis
11. Veronica spicata erecta ferme glabra, foliis rarius dentatis, floribus majusculis rarius dispositis
12. Veronica spicata ferme glabra, foliis imis rotundioribus serratis, cæteris angustis & a medio ad summum leviter crenatis, floribus cæruleis rarius dispositis
13. Veronica spicata erecta angustifolia
14. Veronica minima, Clinopodii minoris folio, glabra Romana Inst. R. H. 144

VIBURNUM Inst. R. H. 607. * *Viburno* Matth. 235. *Lantana Casalp.* 76

VICIA maxima dumetorum Inst. R. H. 397

2. Vicia multiflora Cassubica frutescens, Lentis siliqua Breyn. Prodr. 1. 45
3. Vicia, an sylvestris multiflora maxima Raii Hist. 913
4. Vicia annua glabra, foliis latis ex rotunditate acuminatis, floribus pallidis amplioribus ad singulos nodos quaternis, siliquis fuscis glabris, semine parvo variegato subamaro
5. Vicia supina, latissimo folio non serrato Inst. R. H. 397. * *Fava salvatica* Matth. 446

VIOLA martia foliis nitidis, flore pleno purpureo. An *Viola Martia*, *multiplaci flore purpureo* Inst. R. H. 419. *Viola Mammola doppia vulgo*

2. Viola martia purpurea, flore simplici odore Inst. R. H. 419. * *Viole porporee* Matth. 1239. *Viola purpurea vulgo Mammola Casalp.* 391. *Viole, & Viviole Mammole Ric. Viola & Viola purpurea*, Offic. *Viola Mammola vulgo*
3. Viola martia inodora silvestris, an foliis maioribus & rotundioribus Inst. R. H. 419
4. Viola martia alba Inst. R. H. 419. * *Viola purpurea vulgo Mammola candida Casalp.* 393
5. Viola alpina rotundifolia, lutea Inst. R. H. 420
6. Viola martia silvestris caulifera, foliis mucronatis, flore violaceo inodoro
7. Viola martia glabra, foliis mucronatis, viticulis longis, flore dilute cæruleo inodoro
8. Viola martia arborescens purpurea Inst. R. H. 420
9. Viola arvensis annua erecta fruticosa, foliis crenatis, imis rotundioribus, cæteris longis & angustis, omnibus per basim pulchre auriculatis, flore minimo tricolore * *Suocera e Nuora vulgo ut & sequentes*

10. Eadem flore albo, & luteo
11. Eadem flore luteo, & cæruleo
12. Eadem flore luteo
13. Eadem flore albo

VIRGA AVREA vulgaris latifolia Inst. R. H. 484. * *Virga Aurea* Cæsalp. 503. *Virga aurea* Offic.

2. Virga Aurea, foliis longioribus ferratis subhirsutis & nonnihil crispis, floribus luteis, semisflosculis plerumque septenis perangustis & utrinque acuminatis

3. Virga Aurea, foliis minoribus ferratis glabris & non crispis, floribus luteis, semisflosculis plerumque quinis obtusis & tricuspidatis. *An Virga aurea latifolia ferrata Zannich. Tab. 271*

4. Virga aurea foliis Laurininiis asperis & non ferratis, semisflosculis obtusis & tricuspidatis

5. Virga aurea Canadensis hirsuta, panicula minus speciosa Inst. R. H. 484

6. Virga aurea Limonii folio, panicula uno versu disposita Inst. R. H. 484

7. Virga aurea maior, foliis glutinosis, & graveolentibus Inst. R. H. 484.

* *Conyza mas Theophrasti*; maior *Dioscoridis* C. B. Cespita & Ceppita vulgo

8. Virga aurea angustifolia, minus ferrata, flore albo Inst. R. H. 484

9. Virga aurea Virginiana annua Inst. R. H. 484

VITEX foliis angustioribus, Cannabis modo dispositis (non ferratis) Inst. R. H. 603. * *Vitice* Matth. 214. *Vitex* vulgo *Agnus Castus* Cæsalp. 128. *Aгно*, & *Aгно* Casto Ric. *Agnus castus* Offic.

VITIS quinquefolia Canadensis scandens Inst. R. H. 613

VLMARIA Inst. R. H. 265. * *Regina Prati* Dod. *Vlmaria* Offic.

VRTICA maior vulgaris urens perennis, foliis angustioribus. *Vrtica maior* Fuchs. Hist. 107. Dod. Gall. 98. Brunf. Tom. I. pag. 151. *Vrtica vulgaris maior* I. B. 3. 445

2. Eadem foliis amplioribus. *Ortica* II. Matth. 1184. *An Vrtica vulgaris urens* I. Trag. 2. *Vrtica sylvestris asperior* Tabern. Icon. 534. *Vrtica urens altera* Dod. Pempt. 151. *Vrtica urens* Ger. Emac. 706. *Vrtica media sylvestris* Park Theatr. 441. * *Vrtica* Offic. ut, & superior

3. *Vrtica peregrina* perennis non urens, amplo Coryli folio, racemis florum magis sparsis, semine cordato. *An Vrtica racemosa Americana*, amplo Coryli folio Inst. R. H. 535. *An Vrtica maxima racemosa Canadensis* Eiusdem Ibid.

4. *Vrtica annua minor* magis urens, foliis subrotundis, racemis florum longissimis purpurascens, seminalibus vero brevibus & viridibus. *Vrtica minor annua magis urens*, foliis subrotundis, floribus purpurascens H. Pis. *Vrtica tertia*, flosculis purpurascens Cæsalp. 157. *An Vrtica in eodem caule racemulis floriferis, & fructiferis* Raii Meth. Plant. 19

5. Eadem racemis florum viridibus. *Vrtica minor annua magis urens*, foliis subrotundis, floribus subviridibus H. Pis.

6. Eadem minus urens, foliis altius & eleganter incisis & fere splendentibus, racemis florum purpureis

7. *Vrtica minor annua urens* (viridis) foliis subrotundis, fructifera & non florifera H. Pis. *Vrtica urens minor* C. B. Pin. 232. *Vrtica minor annua* I. B. 3. 449. *Vrtica minor acrior* Lob. Icon. 522. *Vrtica urens minor* Dod. Pempt. 152. *Vrtica* 3. Matth. 1185. *An Vrtica quarta flosculis candicantibus* Cæsalp. 157

8. Eadem rubra, foliis simpliciter dentatis, spicis brevissimis. *Vrtica* III. Matth. 1185. Lugd. 1244. C. B. in Matth. 790. *Vrtica minor acrior* Lob. Icon. 522. *Vrtica urens minima* Dod. Pempt. 152

9. Eadem foliis oblongis. *Vrtica minor* Park Theatr. 441

10. *Vrtica Florentina annua urens minor & eleganter* (foliis oblongis parvis, altius & simpliciter dentatis, spicis brevibus florem fructumque simul ferentibus) Michel. H. Pis. *Vrtica minor* Brunf. Tom. 1. 154

VVLNERARIA pentaphyllos Inst. R. H. 391. * *Trifolium Halicacabum* sive *vesicarium* I. B.



ANTHIVM album, fructu crassiori creberrimis spinis in apice hamatis munito. *Xanthium* Inst. R. H. 439. * *Xanthio* ovvero *Lappa minore* Matth. 1263. Hac, & subsequens *Xanthii* species promiscue usurpantur pro *Xanthio*, *Lappa minore*, *Bardana minore*, & *Strumaria* Offic.

2. Idem rubrum, fructu angustiori rarioribus spinis in apice hamatis munito

3. *Xanthium Canadense* maius, fructu aculeis aduncis munito Inst. R. H. 439

4. *Xanthium Lusitanicum* laciniatum, validissimis aculeis munitum Inst. R. H. 439

5. *Xanthium Creticum* præaltum, fructu subrotundo validioribus aculeis munito D. Sesler

XIPHION angustifolium violaceum Inst. R. H. 364. * *Iris Bulbosa* C. B.



VCA foliis Aloes C. B. Pin. 91

2. *Yuca Indica* arborea, radice non tuberosa, foliis Aloes rigidis serratis & atrovirentibus, floribus albis

* Ad duodecim quandoque *spithamarum* altitudinem assurgit hac *Yuca* hiemis rigoribus invicta. Candex *spithamam* crassus ab imo ad medium usque lævis est, superne vero scaber & foliorum marcidorum reliquiis muricatus. Summitas in plura capita dividitur, quorum unumquodque densa stipatur congerie foliorum (fig. 1.) robustiorum ac crassiorum quam *Yucæ* foliis Aloes C. B. Pin. saturatius virentium, marginibus dense minutis.

nutissimeque serratis, & in oblongum ac validum aculeum abeuntium. Ex borum foliorum sinu quotannis erumpit elegans spica ramosa floribus (fig. 2.) cernuis onusta, structura, odore, & colore floribus supradicta. Yucæ foliis Aloes similibus, magis tamen carnosiss ac sectionibus nonnihil angustioribus. Pistillus singulorum florum, sive embryo, abit in fructum (fig. 3.) per maturitatem nigropurpureum, propendentem, fructibus Aloes Americanæ a Thobia Aldino in Horto Farnesiano depictis pag. 96. similem, sed per omnia quadruplo maiorem. Tribus hic latis laminis auctus videtur, quæ marginibus foliaceis non congruentibus sulcos tres latos constituunt, adeo ut fructus sex veluti alis & tribus sulcis per longitudinem distinguatur. Præterea ad petioli insertionem circulo prominente seu corolla instructus est, sex armata dentibus, qui staminum reliquæ sunt. Semina (fig. 4.) ex rotunditate in acumen desinentia compressa dura & cortice nigro rugoso tecta, in sex cellularum (fig. 5.) seu loculamentorum series universam fructus longitudinem (fig. 6.) excurrentes digesta sunt. Quoniam verò cellularum singulorum ordinum plana non in eadem præcise linea disposita sunt, fit ut horizontaliter secto fructu (fig. 5.) tria tantum appareant semina, quæ nempe in eodem Plano superiori collocata sunt, at in tribus aliis intermediis ordinibus vix ullum appareat seminis vestigium, nisi tantillum adhuc eadem directione secetur fructus. Tunc enim & hæc quoque inferiora conspectui se præbent superioribus jam fere oblitteratis omnino similia. Pulpa parietum & septorum mollis est, nigropurpurea, sapore dulci, levi aromatico vinosoque admixto, per siccitatem vero pulpæ Cassiæ solutivæ quodammodo similis. Huius Yucæ arbor satis procera conspicitur in prædio quodam prope Regiam Villam Castelli; Aliæ insuper in Horto Nosocomii Senensis in Horto Pisano, & in Horto Nostro. Yuca foliis Aloes C. B. licet communis Nobis sit, & quotannis floreat, nunquam tamen (quod sciam) fructum edidit.



ANNICHELLIA palustris maior, foliis gramineis acutis, flore cum apice quadricapsulari, embryonis clypeolis integris, & vasculo non barbato, capsulis seminum ad costam dentatis Michel. Nov. Plant. Gen. 71. n. 1. Tab. 34. fig. 1

ZIZIPHVS fativa, fructu rotundo H. Pis. * Iuiuba Offic. Giuggiolo tondo vulgo

F I N I S

APPEN-

IO. TARGIONII TOZZETTII
A P P E N D I X

A D

PETRI ANTONII MICHELII
CATALOGUM PLANTARUM
HORTI CAESAREI FLORENTINI

Qua PLANTAE a MICHELIO descriptae
illustrantur,

*Pluresque aliae vel ab eo praetermissae, vel post
eius obitum in Hortum inlatae recensentur.*



IO. TARGIONII TOZZETTII

A P P E N D I X.



Pag. 1.



ABROTANI speciebus praefige:

ABIES Taxi folio, fructu sursum spectante Inst. R. H. 585. **Abies** Offic.
2. **Abies** tenuiore folio, fructu deorsum inflexo Inst. R. H. 585. **Picea**, &
Abies rubra Offic. Priorem e Monte Baldo attulit **Michelius**; posteriorem ex
Alpibus nostris Vallis Umbrosae deferri curavi.

ABROTANO 1. subiunge.

Hujus speciei flores in spicas laxas triunciales distributi sunt duodecim, vel ad summum viginti: constant autem flosculis exiguis duplicis formae, quod & tribus insequentibus speciebus contingit. Calycis squamae in prima hac specie albicantes, nonnihil lanuginosae, margine foliaceo auctae, dorsum compressum, & fere complanatum habentes, Capitulum totum vestiunt. Thalamus (quemadmodum & in insequenti specie) tenuissima, ac brevissima lanugine obductus est. E Gargano Appuliae Monte olim attulit Michelius.

ABROTANO 2. subiunge.

Corymborum basis, & discus latus est, & fere complanatus: squamae calycis adeo breves sunt, ut dimidiam tantum Capituli molem vestiant; duplo item latiores sunt, quam in praecedenti specie, & margine foliaceo auctae; dorsum praeterea gibbosum habent, & valde prominentem. In quibusdam Agri Florentini locis sponte provenit.

ABROTANO 3. subiunge.

E Glandulis per universam Plantae superficiem sparsis & intra villos latentibus extillat, diebus praesertim siccioribus, Balsamum quoddam pellucidum, Campborae odorem spirans, quod magni usus in Medicina esse possit. Nostri certe Agricola ad contusiones, & ecchymoses resolvendas felici cum successu utuntur Oleo Olivarum, in quo huius Abrotani folia diebus Canicularibus infusa Solique exposita diu fuerint.

ABROTANO 5. subiunge.

Capitula habet rotunda, nutantia, quorum singula duodecim circiter flosculos perfectos, seu vagina staminea instructos, & sex imperfectos continent. Placenta villis omnino destituta est, sed papillis quibusdam exasperatur, quibus adhaerent flosculi; quod & Absinthio Pontico tenuifolio incano Inst. R. H. contingit.

Pag. 2.

ABSINTHIO 2. subiunge.

Ex seminibus a Michelio in ultimo suo Itinere collectis nata est Absinthii Pontici, seu Romani Officinarum species, cuius folia profundius incisa sunt, divisaque in praetenuis, & acutas lacinias: talem vero se constanter hactenus exhibuit. Duae praecedentes species capitula lata, compressa, & nutantia proferunt, flosculos luteos duplicis formae (non secus ac superiores Plantae) ibalamo villis obfiso adhaerentes, & semina glabra.

ABUTILI speciei, adde sequentes.

2. Abutilon Althaeodes, flore carneo, fructu globofo H. Eltham. 1. Tab. 1.
3. Abutilon Lavaterae flore, fructu cristato H. Eltham. 3. Tab. 2.
4. Abutilon vesicarium crispum, floribus Melinis parvis H. Eltham. 6. Tab. 5.
5. Abutilon perenne, molle, & incanum, flore roseo, non descriptum, ex Providentiae Insula D. Dillenii, qui huius, & superiorum specierum semina nobiscum perhumaniter communicavit.
6. Abutilon repens Alcaeae foliis, flore helvolo H. Eltham. 5. Tab. 4. quod Michelius in hoc ipso Catalogo Pag. 62. appellaverat Malvindam Americanam procumbentem, Alcaeae folio, flore phoeniceo parvo.

Descriptioni ACACIAE 2. adde sequentia.

Flos accuratius observatus conicus apparuit, ore in sex partes, quales descripsi, ad medium usque diviso, quae rotatim complanantur Alaterni florum instar. Ex angulis quos sectiones istae efficiunt, perpendiculariter surgunt stamina villis pellucidis ad basim obfisa. Nullum embryonis rudimentum in masculinis hisce floribus videre licuit: nec vero femininos, seu fecundos, qui in celsiore arboris parte proveniunt, in tot florum exiguum chiliadibus discernere facile est. Anno 1740. filiquas tres protulit ab ea quam pingi curaveram nonnihil aberrantes: breviores siquidem, latiores, magis complanatae, acutiores, & tortuosiores erant; adeo ut perbelle referrent filiquam Acaciae Americanae Abruae foliis triacanthi, sive ad axillas foliorum spina triplici donatae Pluk. Mant. 2. cuius icon exhibetur Tab. 21. Catalogi Plantarum tum exoticarum, tum domesticarum, quae in Hortis haud procul a Londino sitis in venditionem propagantur.

paganur: Quinimmo totius Plantae facies ab illa non multum abludit, si valis-
dissimas, & triplices spinas excipias, quibus nostra prorsus caret. Pulpa pa-
rietum, & septorum filiquae stuppota est, initio acida, deinde resinosa, austera,
ingrati, & fere urentis saporis: tandem filiqua sicca, & quassata strepit.

ACANTHI speciebus adde.

4. Acanthus mollis minor Asplenii folio.

Folia plerumque palmaria, atrovirentia in plures subrotundos lobos Asplenii
vel Dentis Leonis in morem divisa sunt. Flos a prima specie non abludit: Ca-
lycis squama, seu valva superior integra, & linguata est; inferior in apice
dentata, & foliolis duobus longis graminiformibus ad latera stipata; neutra
vero spinosa est. Ex ultimo Michellii Itinere per Venetam Ditionem habemus.

ACARNA maior, caule folioso C. B. Pin. 379. Vaill. in A& Acad. R. Sc.
A. 1718. Pag. 208. n. 1. Cnicus polycephalus canescens, aculeis flavescens
munitus Inst. R. H. 451.

Pag. 3.

ACERI 5. subiunge.

Huius arboris flores petala decem, totidemque stamina habent.

ACETOSAE 1. subiunge.

Florifera & fructifera simul est. Eius fructus vestiuntur tribus alis mem-
branaceis, quae tria calycis, seu floris folia interiora fuerant; exteriora enim,
& minora in situ suo manent.

In speciei quintae, & duarum sequentium floribus animadversione dignum est,
quod tria folia minora & exteriora calycis, quae pendula primum erant, dum
embryo maturescit, eriguntur, & petiolo applicantur: tria vero interiora, &
ampliora persistunt in eodem fere situ, & nullatenus embryonem vestiunt. Con-
tra vero in speciebus 10. & 11. (de 12. enim certus non sum) quae individua
alia florifera tantum seu sterilia, alia vero florifera & fructifera simul profe-
runt, florum secundorum tria folia exteriora pendula semper consistunt; tria autem
interiora, & exigua embryoni ita exacte applicantur, ut capsulam, seu folliculum
fructus quodadmodum constituent. Speciei 14. flos, seu calyx folia tria exteriora
habet non dentata, sed Cochlearis instar excavata; tria vero interiora den-
tata, seu laciniata. Stamina quinque e centro attolluntur, inter quae sedet embryo
trigonus, e cuius vertice acetabula, seu nectaria tria fimbriata erumpunt, &
calycis foliis interioribus applicantur, petiolo tenuissimo adnexa.

Pag. 4.

ALATERN0 subiunge.

Huius Plantae flos non monopetalus, sed proculdubio rosaceus est, ut a Mi-
chelilio quoque adnotatum repperi. Quinque enim segmenta, in quae dispartiri
creditus est, sunt totidem petala pyramidata exigua, quae simul cum stamini-
bus decem numero, brevissimis, pistillum stipantibus, adhaerent fimbriae, seu

margini calycis: decidunt autem seorsim petala singula, ut in rosaceis floribus contingit, & calycem scutellatum relinquunt. Embryo globosus tuba trifariam scissa in apice munitus adnectitur fundo calycis, coque ad medium usque vestitur, non secus ac Glandes Cupula.

ALCEAE species addo.

4. *Alcea serrata* flore incarnato Boerh. Ind. Alt. H. Lugd. Bat. 270.

ALCHIMILLAE species addo.

4. *Alchimilla alpina* Linariae foliis, calyce florum albo in foliorum aliis (ferme sine pediculis) Mich. H. Pis. *Cassiae lignae similis parvus frutex in Alpibus primus* Caesalp. 155.

ALKEKENGII 2. subiunge.

Huius species flores a reliquis congeneribus abludunt; infundibuliformes enim, seu campanulati sunt, non rotati.

3. *Alkekengi Indicum minimum*, fructu virescente Inst. R. H. 151.

ALNO 1. subiunge.

Folia uncias quatuor longa sunt, tres cum dimidia lata: fructus 5. ferme lineas longus est, quatuor vero in ampliore diametro habet. In sicco solo colitur.

ALOES speciei 1. subiunge.

Planta haec ex America primum ad nos delata, climati nostro adeo adsuevit, ut non solum ubique frigoribus invicta perennet, & radicum ope propagetur ad ornatum summopere expetita; sed etiam pluribus in locis flores proferat. Probe Liburnum circa Valetudinarium D. Iacobi quotannis id accidit. Apud Morronam etiam, apud Castrum Florentinum, & in Agro Imbrunetano nuper floruit. Quinimmo in ipsa Urbe Florentia in interioribus Moenibus ad Hortum Sanctimonialium Annae Helenae quandoque Populo mirante floriferum caulem extulit. Anno 1739. floribus onustam videre mihi contigit in suburbano DD. Bellucciorum in Agro Quercetano. Nihil autem in ea diversum deprehendi a descriptione & icona proposita in Horto Farnesiano Thobiae Aldini, seu verius Petri Castelli Pag. 95. Peculiarem huius ipsius Aloes varietatem a paucis annis in hoc Regio Horto colimus, quae scilicet folia elegantis pallido Margine venusta profert; non tamen hactenus compertum mihi est quo nomine a ceteris distinguatur.

ALOES speciei 3. subiunge.

Est Aloe Africana maculata spinosa maior H. Eltham 17. Tab. 14. Apud nos quotannis in aere libero floret, & fructus perficit. Caulis flores substens in tres vel quatuor ramos divaricatur. Neque haec tantum Aloes species in Horto nostro quotannis absque hypocausti auxilio flores producit; sed quinta etiam, & haec a Michelio omissa.

8. *Aloe Africana erecta triangularis & viscosa* Commel. Prael. 82. H. Amst. 13. Tab. 13.

9. *Aloe Africana erecta rotunda, folio parvo, & in acumen rigidissimum exeunte* Commel. Prael. 83. H. Eltham. 16. Tab. 13.

10. *Aloe Africana margaritifera minor* Commel. H. Amst. Part. 2. 21. H. Eltham 19. Tab. 16.

11. *Aloe*

11. Aloe Africana Margaritifera minima Commel. Prael. 43. H. Eltham. 20. Tab. 16.

Pag. 5.

ALSINANTHEMO 2. subiunge.

Fructus vasculosus in apice tantum debiscens, Lychnidis fructuum ad instar, ab *Alfines* speciebus has seiungit. Vaillantius in Bot. Par. novum Genus constituerat nomine Lychnoidis, quod nomen a Rario T. 3. 489. alii plantis tributum fuerat.

ALSINE 3. subiunge.

Planta annua est, foliis Hederaceis vestita: Calycis florum sectiones ferquid lineam longae sunt; Petala vero quinque alta, duas tertias lineae partes longae sunt, quartam lata, & usque ad centrum bifida.

ALSINE 10. subiunge.

An *Alfina* *Spergulae* facie marina perennis, flore violaceo Moris. Hist. Oxon. part. 2. 551. *Alfina* *Spergulae* facie media C. B. Pin. 251. Bot. Monsp. 24. *Spergula* marina nostras I. B. 3. 722. *Spergula* marina Lugd. 1389. ex Michx. Rar. Petala sesquilineam longa sunt; margo seminum albicans, & fere pollucidus est. In Maritimis Pisanis abunde prevenit.

ALSINE 13. subiunge.

Est *Alfina* Alpina saxatilis glabra perennis, folio capillaceo in externa parte tribus nervis instructo, flore pentapetalo albo, petalis subrotundis lineam longis, & indivisis, &c. Michx. Rar.

ALSINE 14. subiunge.

Annua est, proindeque diversa ab insequenti; glabra item, folio capillaceo, flore herbido tetrapetalo, petalis subrotundis vix conspicuis, fructu orbiculato: Ex Michx. Rar.

ALSINE 15. subiunge.

Petala florum ferme orbiculata sunt.

ALSINE 16. subiunge.

Est *Alfina* Alpina saxatilis glabra, caulibus longioribus, foliis perangustis deorsum reflexis, floribus pentapetalis albis, petalis angustis trilinearibus, & indivisis, semine reniformi nigro splendente. *Alfina alpina* glabra foliis reflexis Pluk. Phytogr. Tab. 75. fig. 5. saxifraga Bavarica Ponae Bald. Ital. 159. Park. Theat. 427. Michx. Rar.

17. *Alfina* maritima annua glabra, sive *Spergula* marina media, foliis longioribus angustis succulentis, floribus pentapetalis purpurascensibus ferme sine pediculo, petalis subrotundis integris lineam longis, semine exiguo non marginato Michx. Rar. In palustribus Agri Liburnensis, praecipue in vestigiis Portus Pisani inveni.

Quedam ad ALTHAEAS spectantia habes inferius in adnotatis ad Malvae spectes.

Pag. 6.

ALYSSO 3. subiunge.

Petala florum alba sunt, & bifida: siliqua autem oblonga est, trilinearis.

ALYSSO 4. subiunge.

Petala florum alba sunt, & integra. Ob silicarum formam speciem hanc, & superiorem ad Camelinae genus revocavit Michellius Rar.

AMARANTHO 3. subiunge.

Planta annua est, foliis macula sagittata alba Persicariae instar distinctis ornata. Plures florum spicas ramosas profert, quarum medietas superior floribus masculinis, seu sterilibus tantummodo onusta est. Hi ad centrum usque dividuntur in quinque acutas sectiones cochlearis instar excavatas, in aculeum inermem desinentes, externe virides, intus vero candicantes, calycis Nymphaeae albae florum ad instar, & stamina quinque alba apicibus citrinis instructa in sinu gerunt: Inferiori spicae parti consentim adhaerent flores feminini, seu embryonem foventes, quorum perianthium dimidio minus est quam sterilius. Germen bovini cranii forma, album, hirsutum, duobus corniculatis tubis in apice munitur, Capsula horizontaliter dehiscit, & unicum semen nigrum splendens includit.

AMARANTHO 5. subiunge.

Flores masculinos, seu steriles in hac planta nullos inveni; sed eorum vicem gerunt squamae coloratae cristam efformantes: feminini vero, seu secundarii calycem habent tribus linearibus, & acutis foliolis constantem, quorum duo corollam arte complectuntur; medium vero simul cum brevissimo pediculo florem sustinente erumpit. Corolla quinque, vel sex foliolis constat lineas duas cum dimidia longis, in acumen desinentibus, rubris, margine albo donatis. Stamina quinque sunt, capillaria, rubra, longitudine calycem aequantia, circa centrum coalita, & saccum globosum membranaceum efformantia, in quo Embryo nidulatur tuba exerta per foramen apertum in sacci summitate, quo loci stamina divaricantur. Apices carnei sunt, Tubae stigma simplex. Embryo crescens saccum descriptum distrabit, basin versus comprimit, talique via sibi facta erumpit, & abit in capsulam globosam lineari ferme diametro, stilo sesquilineari in vertice donatam, transversa trifariam dehiscentem, & 7. vel 8. semina splendentia fundo affixa continentem.

6. *Amaranthus caudatus Phytanozaic. Tab. 59. Amaranthus maior serotinus. arborecens nutantibus roseis flagellis, semine carneo Barr. Ic. 663. Discipline vulgo.*

7. *Amaranthus tricolor luteus ruber viridis H. Eyf. Aut. o 2. f. 6. f. 1. Phytanozaic. Tab. 94.*

8. *Amaranthus tricolor luteus albus & viridis Phytanozaic. Tab. 95.*

De AMBERBOI speciebus V. adnotata ad Cyanum pag. 31.

AMBROSIAE subiunge.

Flores huius plantae in spicam digesti duplicis naturae sunt, alii nempe masculini, alii feminini: masculini superiori caulis, ramulorumque parti adfixi, calycem

calycem habent campanulatum in ore dentatum, Thalamo seu placentula in centro donatum, e qua erumpunt 35. circiter flosculi totam calycis cavitatem occupantes. Flosculi hi monopetali sunt, lutei, ad medium usque conici & solidi, deinceps ampliuntur, concavique evadunt, rursusque coarctantur, ita ut ovales quodadmodum appareant quinquefariam in apice scissi sectionibus acutis. Ex horum fundo tuba surgit, quam stipantur quinque brevissima stamina apices praelongos biventres, tubamque respicientes, gerentia, & in cuspidem lanceatam desinentia. Tandem singulorum forme flosculorum basi adnascuntur filamenta quaedam peculiaria, succosa, tortuosa capreolorum instar, superficie scabra, seu verrucosa, quae longitudine flosculos nonnihil excedunt.

Pag. 7.

ANEMONI. 1. subiunge.

Huius flores petala duodecim proferunt unciam longa, lineas tres. vel 4. lata.

ANEMONI. 2. subiunge.

Serotina est; folia Aconiti profert coniugata; ramusculos item coniugatos. Flores calyce destituuntur, & sex vel septem petalis constant leucophaeis, externe hirsutis, interne glabris & concavis. Embryo fragaeformis, glaber, pluribus staminibus virentibus stipatur, apice lanceolato instructis.

ANONIDI. 3. subiunge.

Est Cicer sylvestre Theriacaria vocatus Caesalp. 238. Ononis in montibus Senensibus Spigelia Isagoge in Rem Herbariam lib. 1. cap. 18. Planta annua est decem plerumque uncias alta, tenuibus, & fibratis, lignosis tamen radicibus praedita. Ramulos plures quaquaversum emittit, & ferme in globum diffunditur. Universam eius superficiem, exceptis florum petalis, brevissimi, teretes ac pellucidi pili vestiunt, e quorum summitate erumpit exilissima guttula Balsami pellucidi, odoris medicati ad Theriacam accedentis. Balsamum hoc unice plantam odoratam facit, illo enim deterso, nullum alium nisi herbaceum odorem habebis. Exillare ipsum in maiori copia observavi in planta adulta, & tempestate sicca; Augusto vero mense, dum planta ferme effeta est, densius, & ferme cereum apparet, colorem lutescentem assumit, gravius olet, & plantae etiam siccae diu adheret, ut notavit Spigelius. Folia primaria terna ovalia sunt, novem lineas longa, quinque lata, in ambitu serrata, mollissima, Ciceris foliorum aemula, ut Caesalpinus recte adnotavit, & alternatim disposita, ad basim praeterea appendices duas habent acuminatas, quae conniventes nodum cingunt. Ex harum sinu ad angulum ferme rectum erumpit capreolus; seu pediculus teres, rectus, & sesquuncialis, in aculeum inermem, quem Caesalpinus appendicem vocat, desinens, qui ad decem linearum ab origine distantiam pediculum secundarium linearem emittit, cui flos pendulus adfigitur. Flos dilute luteus est, vexillo quatuor lineas longo, duas, dum expansus est, lato, alis sesquilinearibus. Calycis quinquefidi sectiones longae, & acutae florem quodadmodum occultant. Siliquae ferme cylindricae sunt, semunciam longae, sesquilinearum diametro, & ipsae pendulae, ac laeves. Semina tandem Apybae familiae sunt, rotunda, subflava. In Agro Florentino locis sterilibus abunde provenit: Rustici Millaghera, vel Erba bacia vocant eius enim pulverem adversus Lumbricos

hricos exhibent felici, ut aiunt, eventu, quemadmodum animadvertit etiam Caesalpinus. Praestantiores tamen, ni fallor, in Medicina habere posset usus, praesertim in morbis Nervorum.

4. Anonis Asiatica frutescens, floribus luteis amplis Inst. R. H. 409. Boerh. Ind. Alt. H. Lugd. Bat. II. 34.

Pag. 8.

ANTHEMIDI 3. subiunge.

Aestate Anni 1744. semiflosculos coronales protulit, non flosculis discoidis coloribus, nempe aureos, sed pallidos, albidosve, lingua lineari rotunda instructos.

ANTIRRHINI specierum nomina ita emendari debent.

1. Antirrhinum maius Italicum sempervirens, Leucoii silvestris folio angustiori, flore maiore rubro cum rictu ex albo pallido. Antirrhinum I. Matth. 1255. Ed. Valgr. Ital. in fol. A. 1585. Os Leonis vulgo, Linariae folio, flore roseo Caesalp. 350. Mich. Rar. In moenibus Urbis nostrae in quibus Caesalpinus etiam observavit, copiose provenit & perennat. Folia inferiora tres uncias longa sunt, utrinque acuminata, quatuor lineas lata, & ferme rhomboidalia; superiora vero, & ramorum secundariorum, dimidio minora. Flores 15. lineas longi sunt, galea vero 8. lata. Calyx in quinque bilinearia foliola dividitur; fructus tandem lineas sex longus est.

Huius varietas est Antirrhinum secundo loco descriptum, cuius synonyma ex Michellii Rar. sunt: Antirrhino II. Matth. 1256. Os Leonis vulgo Linariae folio, flore albo Caesalp. 350. Ex iisdem moenibus in quibus sponte provenit, in Hortum translatum est, simul cum insequenti.

Idem flore purpureo dilutior, & fere albicante.

Species tortosa florem purpureum saturationem profert, variatque rictus colore albo & aureo.

4. Antirrhinum maius Italicum brevioribus & latioribus foliis subhirsutis, amplo pallecente flore. Os Leonis foliis brevioribus latiusculis subhirsutis, floribus pallecentibus Caesalp. 350. Antirrhinum luteo flore C. B. Pin. 211. Inst. R. H. 168. Antirrhinum latifolium pallido amplo flore Barr. Obs. 20. num. 190. Icon. 556. Bocc. Mus. part. 2. 49. Tab. 41. Inst. R. H. 168. Mich. Rar. Flor. quatuordecim lineas longus est, pallecens, labio superiori bifido, interne venis rubris distincto; inferiori circa rictum aureo, quadrifariam scisso, cordato, villisque pellucidis obfuso. Notari meretur flores antequam pateant foliolo cochlearis instar excavato occultari. A pluribus annis in Horto colitur; sponte autem, & latissime germinantem inveni circa Stazzemam Pagum Comitatus Petrasanctani.

APARINE 3. subiunge.

Est Aparine annua minor foliis brevibus lineam circiter latis, spinis creberrimis deorsum spectantibus in margine munitis, floribus albis, seminibus asperis Mich. Rar.

Aparine 4. est Aparine annua minor foliis brevibus, spinulis rarioribus perexiguis sursum spectantibus in margine munitis, floribus albis, fructu verrucoso Eiusd.

5. Tandem est Aparine minima annua foliis tres lineas longis, semilinem latis, in margine spinulis sursum spectantibus munitis, floribus obsolete purpureis, fructu subaspero Eiusd.

APHACAE subiunge.

2. Aphaca semine nigro Caesalp. 236. Aphaca Lob. Icon. 70. Inst. R. H. 399. Siliquas longiores, & graciliores quam superior profert.

Pag. 9.

APOCYN 4. subiunge.

Planta ferme arborea, si caudicem spectes, videri potest; truncus tamen per se non subsistit, sed varias arbores complectitur. Sarmenta vetustiora cinerea sunt, iuniora autem virentia, & foliis coniugatis subrotundis, seu potius cordiformibus vestita. Verno tempore in ramulis recentibus ex alis foliorum ramusculus prodit in quatuor alios subdivisus, quorum singuli quinos flores pediculis quinque linearibus fulctos substinent. Flores campaniformes, multifidi fig. C. Tab. 20. Inst. R. H. similes, ad centrum usque scissi, segmentis lineas quatuor longis, lineam ubique latis, & in vertice rotundatis, candidi primum sunt, effeti vero pallescunt. In eorum centro embryonis exiguum rudimentum nidulatur pyramidatum, ex duabus siliquis invicem appressis constans, ad cuius basin quinque adnascuntur antherae lutescentes, & in apicem foliaceum desinentes. Stipantur hae staminulis quinque brevissimis, complanatis, pellucidis, in quorum summitate apices reperire nullatenus contigit: nullum propterea odorem spirant, & steriles sunt flores hi, nec unquam, quod sciam, fructum protulerunt, eo fortasse quia pro lubitu summa arborum fastigia conscendere Planta non potest. Idem prorsus accidit Periplocæ foliis oblongis Inst. R. H. quemadmodum pluries observavi in nemoribus Agri Pisani, praesertim la Fagiania, & le Calcine dictis; eae siquidem Periplocæ plantae, quae celsissimas arbores conscenderant, folia amplissima ferme rotunda, flores innumeros, siliquasque plurimas Neris similes proferebant; contra vero illae quae tali fulctura carebant, strigosae erant, steriles, & folia oblonga angustaque gerebant. Granadilla item descripta pag. 46. Bignonia Fraxini folio, Vitis Canadensis quinquefolia scandens; quinimmo plures aliae Plantae scandentes lacte non virent, & fructus nullatenus perficiunt nisi fastigia summa petierint, & libero aere perfruantur. Phaenomeni huius causas, & corollaria quae ad Agriculturam perficiendam peti inde possunt, Physicis relinquo, adnotare contentus Apocynum nostrum radicem repentium ope hactenus propagatum fuisse. Planta tota foetidissima est, & lac subpallidum inspidum vel levissima incisione fundit. Unde nam in Hortum translata fuerit, ignoramus, iam enim ibi colebatur An. 1718. quo Hortus Societati Botanicae datus fuit, & fortasse aliqua est ex plantis a Casabona delatis; eius namque sceleta observavi in quibusdam Herbariis saeculo superiori confectis. Plurimum accedit figurae & descriptioni Apocyni primi latifolii Clus. Rar. 124. Bauh. in Matth. 774. & descriptioni Periplocæ Syriacæ non repentis Caesalp. 119.

5. Apocynum Americanum foliis Androsæmi, flore Lili convallium suaverubentis Par. Bat.

6. Apocynum ex Barbados nomine Radicis Indicae missum D. Dillenii.

114 *Append. ad Catal. Plant.*

AQUIFOLIUM, five *Agrifolium* vulgo L. B. 1. 114. Inst. R. H. 600.

De ARISARO 2. *Vide inferius adnotata ad Arum, eique subiunge.*

3. *Arisarum* flore in tenuem caudam abeunte Inst. R. H. 160. *Arisarum* minus *probofideum* Boëc. Obs. Mas. Part. 2. 61. Tab. 50. *Arisarum latifolium* minus repens *cespitosum* Bar. Obs. 19. n. 182. Ison. 1250.

ARTEMISIAE 3. *subiunge.*

Specierum harum flores, seu corymbi conici sunt, calyce squamoso muniti. Flosculi autem duplicis formae sunt; tres siquidem in quolibet capitulo includuntur perfecti, octo autem imperfecti, ut vocant, seu tubo unico donati, e quo embryonis stilus divaricatus erumpit. Thalamus conicus est, & nudus, cui flosculi immixti adhærent nullis squamis seu dissepimentis intercedentibus.

ARTEMISIAE 4. *subiunge.*

Planta insipida est, & caules nitidos rubentes profert. Folia iuniora Verno tempora hirsuta sunt, & Abrotani maris similia; in Aestate vero atrovirentia, glabra, & quasi splendentia. Capitula profert exigua, pyramidata, erecta, in quibus flosculi duplicis naturae, quemadmodum in superioribus speciebus continentur.

5. *Artemisia tenuifolia* canibus rubentibus Vaill. in A& Acad. R. Sc. 1719. pag. 376. num. 7.

Pag. 10.

ARI *speciei 1. subiunge.*

Fructus protulit A. 1740. Ari vulgaris similes, sed maiusculos, acuminatos, & latoscentes. Flores odore non insuavi se commendant: An igitur est Arum Aethyopicum flore albo odorato Commel. H. Amstel. T. I. 95. Arum Aethyopicum flore albo odorato Moschum olente Boerh. Ind. Alt. H. Lugd. Bat. P. 2. 74. Phytanotac. Tab. 174.

ARO 2. *subiunge.*

In huius, & trium insequentium specierum flore adnotari meretur Spadicis. graciliori parti adnasti series aliquot papillarum, quae crassiuscula hirsutiae pubescunt, & in oblongum, ac praetenuis filamentum terminantur, exiguo deinde intervallo succedere series aliquot apicum, seu corporum pyramidalium, quae quatuor tubis conoideis cavis invicem adnatis, & in apice perforatis constant; e quatuor autem foraminulis hisce erumpere pulvisculum seminale, qui in tuborum cavitate nidulatur; aequali deinde intervallo alias papillarum prioribus similium series spectari, quas immediate subsequuntur embryones inam spadiceis, seu pistilli partem occupantes.

ARO 6. *subiunge.*

Saepius flores protulit, quorum structura a superiorum specierum floribus abludit. Spatha quidem Ari vulgaris facie est, sed crassior, ferme coriacea, & undulata, colore luteo extus sauro, intus dilatiore. Ex eius basi convoluta
erum-

erumpit penis exiguus acuminatus, caudae murinae similis, ochroleucus, cuius basi confertim adnascuntur plurimae series apicum, seu antherarum, quae constant quinque, sex, vel septem filamentis, vel tubis invicem connexis, in inferiori parte communi quodam brevique pediculo fulctis, in superiori vero excavatis & dilatatis, ut flosculum exapetalum quodadmodo referant. Has inter, & embryonum series spectantur aliquot, sed laxiores, series corpusculorum (quae Nectaria appellare possis) conicorum, ex angusta basi sensim crassescens, & in haemisphaerium granulatum desinentium. Haec immediate consequuntur series embryonum, quibus admixta cernere est aliquot ex superius descriptis Nectariis. Embryones autem globosi, brevi stigmate in summitate instructi, abeunt in baccam unilocularem exilibus, oblongis, ac ferme cylindricis seminibus fetam. Planta, utpote iuxta rivulos nasci solita, in siccilibus non perforatis, ac uberrime irrigatis colitur, & laetissime germinat; Hieme vero, quo tempore foliorum decore orbatur, & veluti mortua apparet, in hibernaculo adservatur, rariusque irrigatur.

7. Arum Scorzonerae folio Inst. R. H. 160. quod superius pag. 9. inter Arisari species num. 2. descriptum fuerat.

Pag. 11.

ASPARAGO 2. subiunge.

Folia capillaria sunt, lineas 7. longa. Flores plerumque duo, raro tres e singulis nodis pendent. Eorum pediculus capillaris lineas quatuor cum dimidia longus, duobus segmentis articulatis constat, quorum prius portio, seu ramulus plantae est, posterius autem, & trilineare, floris propago. Flos monopetalis potiore iure accensendus, pendulus semper est, lineas tres longus & quodadmodo cylindricus, lineari diametro. Petala ad basim coalita tria exteriora herbacea, seu lurida, & acutiora sunt, tria vero interiora latiuscula, in summitate dilatata, & alba. Stamina pariter alba e fundo floris egredientia, & petalis ad medium usque inserta, intra florem latent, & apices luteos subfluent pulvisculo aureo refertor.

ASPARAGO 3. subiunge.

Flos die 1. Masi observatur, strigosior quam subsequenter speciei apparuit.

ASPARAGO 6. subiunge.

Flores fructusque protulsi Vere Anni 1740. & eorum structuram in peculiari scheda adnotavi, quam nescio quomodo amisi; sed, ni male memini, ad Smilacis potius, quam ad Asparagi species plantam hanc referendam esse cognovi.

ASPHODELO 4. subiunge.

Aprilis initio flores profert in praelongis spicis digestos, Liliaceos monopetalos, in sex partes ad centrum usque scissos, quarum quinque erectae sunt, sexta vero & inferior pendula; omnes autem retro reflexae, luteae, nervo viridi utrinque conspicuo per medium distinguuntur. Stamina sex, & embryonis stilus in apice bifariam scissus, falcata pariter sunt. Speciem. 5. in Horto Elthamensi descriptam, & affabre pictam cernere est pag. 310. & 231.

Pag. 12.

ASTERI 10. subiunge.

Semina villosa & pappo instructa profert, thalamo cellulato affixa.

ASTERI 11. subiunge.

In singulis floribus duodecim, vel quindecim semiflosculos coroneales gerit.

ASTERI 14. subiunge.

Annus est, corona floris rosea, vel purpurea, disco aureo.

15. Idem corona candida.

16. Aster ramosus annuus Canadensis H. R. Blef. 236. Inst. R. H. 482. *Leucanthemum Bellidis facie, umbelliferum, semine papposo Boerb. Ind. Alt. H. Lugd. Bat. part. 1. 108. num. 11. Vaill. in Act. Ac. R. Sc. 1720. pag. 404. num. 45.*

17. Aster annuus flore papposo rubente: sub hoc titulo ex Sibiria missus D. Amman.

18. Aster maritimus Salicis folio longiore & angustiore peracuto, floribus caeruleis parvis, semiflosculis copiosioribus. *An Aster Salicis folio, flore caeruleo, radice repente Mor. Hist. Oxon. part. 3. sect. 7. Tab. 22. fig. 26. Amel. Virgilii Matth. 1734. Ed. Valgrif. 1585. in f. Tripolium Camerarii Hort. 179. Mich. Rar. ex Insulis Venetis adtulit Michelius.*

19. Aster montanus luteus, Salicis glabro folio. C. B. Pin. 266. *Aster Acti-
cus alter in rudibus Caesalp. 469.*

20. Aster montanus luteus subhirsutus nigrovirente folio Mich. Rar.

21. Aster palustris parvo flore globoso Inst. R. H. 483. *Aliquas ex his
Asteris speciebus Vaillantius ad Helenii species revocavit in Actis Ac. R. Sc.
A. 1720. pag. 391.*

ASTEROIDI 1. subiunge.

*Plantam hanc Michelius Rar. Vaillantium sequutus ad Asterisci genus re-
vocavit, appellavitque: Asteriscus perennis, villosus, ferratus, imo calyce non
folioso Vaill. in Act. Ac. R. Sc. A. 1720. pag. 430. num. 10. Asteriscus ca-
lyce brevi, angustifolius Boerb. Ind. Alt. H. Lugd. Bat. part. 1. 105. n. 10.
Asteroidea hirsuta latifolia Patavina Micheli H. Pis. Aster luteus maior fo-
liis Succisae C. B. Pin. 266. Aster III. Austriacus Clus. Hist. XIII. In Plani-
tie quae ad radices Collium Arquae in Agro Patavino est, invenisse se ait, &
exempla etiam ex Agro Viennensi accepisse. In Adversariis autem alterius ope-
ris quibus paucis ante mortem mensibus incumberebat, diversam fecit ab Aste-
risco Vaillantii, eo quod illa squamas, quae semina ab invicem distinguunt
aristatas proferat, hic vero partim aristatas, partim retusas, & veluti
laceras?*

ASTEROIDI 2. subiunge.

*Lin. 2. semilineam latis, corrige sesquilineam latis. In libro Rar. Michelius
huic nomen fecit: Asteriscus Alpinus Salicis folio angusto, & subhirsuto, flore
minore, calyce nudo, &c. Praeter Bocconii synonymon aptari hoc etiam ei posse
suspiciatur: Asteriscus alpinus simplici caule, floribus luteis Caesalp. 496. Fo-
lia*

lia Mense Februario circa radicem renascentia angusta erant, hirsuta praesertim in margine, quaedam subinde dentata, sive verrucis vesiculisque Balsamo rubente repletis donata, non secus ac in Hyperici petalorum margine accidit. In Alpibus Petrae Apuanae sponte provenit.

ASTEROIDI 3. subiungo.

Semilineam circiter latis, corrige lineam circiter latis.

Hanc quoque ad Asteriscum revocavit Michelius, atque aptari illi posse iconem Asteris Montani flore luteo magno, hirsuti, quibusdam Oculis Christi I. B. 2. 1046. Folia prima Februario Mense observata maiora quam superioris sunt, ex angusto principio magis dilatata, hirsuta, & verrucis, vesiculisque similibus donata.

Pag. 13.

ASTRAGALO 6. subiungo.

7. Astragalus purpureus perennis spicatus Pannonicus Mor. Hist. Oxon. part. 2. 106. Inst. R. H. 415.

8. Astragalus pumilus filiqua Epiglottidis forma Inst. R. H. 416.

9. Astragalus Orientalis altissimus, Galegae foliis amplioribus, flore parvo flavescente Coroll. Inst. R. H. 29.

ASTRANTIAE subiungo.

Atractylis lutea C. B. Pin. 379. Vaill. in Act. Ac. R. Sc. 1718. pag. 217.

ATRIPLICI 4. subiungo.

Semen unicum in pericarpio quolibet continetur cochleatum istar seminis Kalk Gramineo folio, seu Chenopodii maritimi semina splendens, inclusum fallionis lentiformi in basi tantummodo pervio, ac tuba bifurcata instructo: Flos hermaphroditus laciniis acutas habet.

ATRIPLICI 5. subiungo.

Flores profert unius tantum formae, hermaphroditos nempe. Calyx constat duobus foliolis virescentibus, cucullatis, ad basin coniunctis; & pelvin quaedam adnatis, e qua embryo surgit ellipticobomboidalis compressus, stylo ac stigmatibus laciniatis munitus: stipatur hic ternis ex utroque latere staminibus ad originem pyramidalis, & apices carnosos subfluentibus. Ambiant haec petala, seu foliola duo elegantissima, candida, cochlearis instar excavata, quae initio expansa sunt Circaeae florum instar, deinde vera eriguntur, & invicem adpressantur, adeo ut embryonem maturentem claudant, quemadmodum ceteris Atriplicis speciebus contingit.

6. Atriplex hortensis alba, sive pallide virens C. B. Pin. 119. Inst. R. H. 505. Spinacione vulgo. Duas huius varietates observasse me memini, unam nempe perianthio diphylo floris faminei acuminato, alteram eo rotundo. Notandum meretur ad floris feminei basin duos ex utroque latere flosculos hermaphroditos nasci, minimos, herbaceos, monopetalos rotatos, quinquefariam sectos, & staminibus quinque donatos apicem subfluentibus, ac ex incisuris florum prodeuntibus. Flosculi hi plerumque steriles sunt; in nonnullis tamen embryo abest in fructum orbicularem depressum nigrum, quem laciniis florum arte amplexantur.

Pag. 14.

AURANTIO 14. subiunge.

12. *Aurantium* foliis angustis ex flavo albo & subluteo-variegatis, fructu subrotundo sessili luteo, costis virescentibus, cortice trilineari amaro, succo acido. An *Aurantium virgatum angustifolium* Inst. R. H. 620. *Malus Aurantia angustioribus foliis, & fructu variegatis* H. L. Bat. *Aurantium virgatum multiflorum folio, fructuque striato* Clarici Istor. e Colt. delle Piant. 738. *Arancio con frutto, e foglia variegata* Wolkam Hesp. Norib. T. 2. 193. *Arancio Turco vulgo* Mich. Rar.

16. *Aurantium Laurinis foliis* H. Pis. *Malum Aurantium Lauri angustis foliis* Bocc. Rar. 3.

AZEDARACH subiunge.

Præcox est; floris item petala caerulea profert, & nectarium saturocaeruleum; proindeque distinguenda est ab insequenti specie, quæ serotina est, petalæque habet albida, vel dilute carnea, trilinearia, in acutum apicem desinentia, & externe nervo rubente notata; Nectarium tandem nigro purpureum.

2. *Azedarach foliis ramosis amplioribus, flore albo, vel carneo. Pseudosycomorus* H. Eyf. Aut. O. 1. f. 2. *Tuber, quam vulgo falsum Sycomorum vocant* Caesalp. 107. In pluribus Etruriae locis, ac præsertim in nemoribus *Aucupariis* lætissime ambæ proveniunt, & folia vel bieme retinent, licet peregrinae sint.

BALSAMITAE 1. subiunge.

Flosculi integri & unius omnes formæ sunt, invicem stipati, nullisque foliolis, seu squamis ab invicem distincti. Folia adulta alveolis quibusdam re-ferta conspiciuntur villo incurvo in margine munitis, in quorum fundo glandula hæmisphaerica nidulatur, e qua Balsamum peculiare pellucidum exsudat, quod odoris plantæ sedes est, & a Sole inspissatum lutescentem colorem assumit, resinaeque instar concrevit. Exsudat vero potissimum Aestatis initio, dum folia non nimis tenera ac succosa sunt.

BALSAMITAE 2. subiunge.

Flosculi similes superioribus sunt, verum ii qui floris peripheriam occupant, foliolis quibusdam imbricatis, & acuminatis ab invicem distinguuntur.

BARBAE CAPRAE 1. subiunge.

Flos sesquilineam longus petalis quinque constat ex angusto principio sensim dilatatis ac rotundatis, & cochlearis instar excavatis. Calyx stellatus est, sive in quinque acutas lacinias divisus. Dum hæc fructus ad maturitatem perducit, sequens species flores suos explicat, qui petalis ferme ovalibus componuntur, & staminulis duodecim circiter albis, apice luteolo munitis, adeo exilibus ut vix a centro se attollant, & nudum oculum eludant.

Pag. 15.

BARBAREAE 2 subiunge.

Respondet figuræ Eurucæ Palustris Lugd. 650. & *Herbæ S. Barbaræ* Cast. 287. ut

287. ut adnotavit Mich. Rar. Petala florum cordata sunt, duas lineas longa, unam lata; siliquae autem unciam circiter longae sunt.

BARBARBAE 4. subiunge.

Eadem est cum *Sisymbrii* specie 8. per errorem descripta pag. 90. Ad hoc *Barbarbae* genus pertinent alias quoque *Sisymbrii* species ibidem descriptae sub numer. 5. 6. & 7.

BELLIDI subiunge.

2. Bellis hortensis flore pleno, eoque magno, albo C. B. Pin. 261. Inst. R. H. 491.
3. Bellis hortensis flore pleno, eoque magno, vario C. B. Pin. 261. Inst. R. H. 491.

BERMUDIANAE subiunge.

2. Bermudiana Graminea flore minore caeruleo H. Eltham. 49. Tab. 41. fig. 49.

BETONICAE 4. subiunge.

Odorem *Chamaedryos vulgaris* spirat. Folia utrinque acuminata sunt, uncias duas plerumque longa, lineas novem lata. Flores verticillatim digesti sunt, eorumque labium superius intus & extra candidum est, in margine autem circa fauces punctulis sanguineis notatum; inferius e luteo pallefcit. In ceteris convenit cum descriptione. Raii Hist. T. 1. 566. Figura *Alyffi maioris* Tabern. Ic. 541. optima est.

5. Betonica maior Danica Inst. R. H. 203.
6. Betonica maritima (*Salviae* folio) flore ex luteo pallefciente Inst. R. H. 203. *Sideritis Heraclea latifolia* Dioscoridis. *Sideritis marina* *Salvifolia* nostra Donat. Bocc. Mus. 164. Mich. Rar.

BIDENTI 1. subiunge.

Semina *Sphandylis* seminum similia sunt, duas lineas longa, transversim fissura, & squamis canaliculatis in aculeum desinentibus ab invicem distincta.

Pag. 16.

BIDENTI 6. subiunge.

Semina lineas quatuor longa sunt, duas lata, aristis sesquilinearibus munita, circulariter disposita, & squamis foliaceis ab invicem distincta.

BIDENTI 9. subiunge.

10. *Bidens palustris* annua, caule anguloso, foliis oblongis serratis, non divisis, flore parvo luteo minus specioso & erecto, semine binis aristis munito, *Bidens folio non dissecto* Caesalp. 488. an *Eupatorium Cannabinum* semina Septentrionalium stellato & odorato flore Lob. Ic. 528? Mich. Rar.

11. *Bidens palustris* annua, caule rotundo, imum versus nonnihil hirsuto, ac purpurascente, folio *Salicis* longiore & angustiore, nitido, semineciam lato, & nonnihil serrato, flore specioso aureo nutante, semine quatuor aristis armato. An *Eupatorium Cannabinum chrysanthemum* Barr. Icon. 1209. ? Mich. Rar.

Utram-

Utramque attuli A. 1742. e Palustribus Blentinensibus, in quibus lactissime praeveniunt, floresque Octobri Mense explicant.

12. *Bidens palustris* annua foliis subrotundis, latioribus, imis plerumque trilobatis, ceteris integris, flore luteo minus specioso, semine binis aristis armato Mich. Cat. Plant. A. Flor. In salictis Arni fluvii prope Uniani Pagum repertam in Hortum olim transfudit Michelius, quum autem periisset, attuli ego A. 1743. e Paludibus inter Petram sanctam & Massam Rosam obviis, ubi copiose germinantem inveni simul cum sequenti.

13. *Bidens* quae *Verbesina palustris* annua, caule rotundo purpurascente, foliis Salicis coniugatis & serratis, flore luteo radiato, semiflosculis sterilibus. *Eupatorium aquatile* folio non diviso, flore aureis undique petalis radiato Lacl. Triumph. apud Fratrem 63. Mich. Rar.

BLATTARIAE 1. subiunge.

Flores ampliores quam sequentium specierum sunt: stamina, & lanugo qua ipsa stipantur purpurea est, apices autem crocei. Villi quibus spicae florum in hac, & sequentibus speciebus vestiuntur, vascula excretoria sunt, e quorum summitate Verno & matutino tempore succus quidam pellucidus, & nonnihil glutinosus exsudat.

Pag. 17.

BLITO 2. subiunge.

3. *Blitum* totum purpureum, spicatum, latifolium, erectum, foliis Betaceis acuminatis, calyce pentaphyllo; semine spadiceo splendente. *Figurae Bliti* Cam. Epit. 233. & *Bliti maximi*, sive *Amaranthi maioris* I. B. 2. 968. huic perbelle aptari possunt. Mich. Post. Flores masculini lineares sunt, rubri, foliolis quinque ovatoacuminatis constantes, & staminulis quinque albis apices luteos sustentibus instructi, nullo embryonis vestigio apparente. Inter acervos florum masculinorum feminini flores conspiciuntur; calyces nempe quinquefariam fissi, in quorum fundo embryo nidulatur, filamentis quatuor pennatis in apice instructus, qui deinde abit in fructum globosum Octobri Mense maturiscentem, bifariam horizontaliter debiscentem, valva superiori purpurea, inferiori constanter viridi, & semen unicum lentiforme erectum includentem. Haec florum sterilium & fecundorum differentia in superioribus etiam duobus *Blitis* obtinet; sed notari meretur ipsorum flores trifariam tantum, non vero quinquefariam divisos esse, ac masculinos seu steriles tribus staminibus donari; Embryonis item apicem tribus tantum filamentis instructum esse.

4. *Blitum fragiferum* maximum polyspermon Amman. Rarior. 166.

BOLETO subiunge.

Talem *Boleti* huius descriptionem ex Michelianis schedis elicui. Pollices ferme quatuor longus est, quorum duos pileolus occupat. Pediculus interne cavus, non prorsus albus, sed leucophaeus, ad radicem ventricosus, & septem lineas in diametro habens, sensim deinde angustior fit, praesertim qua parte extremo pileoli margini subest. Pileolus autem subfuscus olivarem quodammodo figuram induit; e margine siquidem collecto, pediculoque appresso, sensim dilatatur, & in acutum fastigium definit, crebris per longitudinem costulis seu sulcis undosis distinctus, quos inter frequentes lacunae, seu cellulae conspiciuntur

siuntur figura irregulari. Die 30. Martii in Arboreto Horti collegit Micheli.

BRYONIAE subiunge.

Fertilis, seu fructifera est. V. Pontad. Anthol. 280. Florum sectiones acuminatae lineas tres longae sunt, unam ferme latae, ex albo palléscentes; Tuba autem revoluta pelvisiformis est, & quinquefariam scissa.

Pag. 18.

BUGULAE 4. subiunge.

Huius folia quandoque inferne purpurascunt; secundae autem speciei dum tenera planta est, viridia prorsus sunt, dum vero senescit Mense Iulio prorsus atrovirentia.

Bupthalmi species, quae in Horto colantur sic aptius describentur. **BUPHTHALMUM** Tanacetii minoris foliis (flore luteo minore) C. B. Pin. 134. Inst. R. H. 495. Chrysanthemum in ruderibus Caesalp. 444. Bupbithalmo Matth. 959. Cast. 81. Mich. Rar.

2. Idem flore maiore Mich. Rar.

3. Buphtalmum Tanacetii minoris folio, flore albo Inst. R. H. 495.

4. Idem maius. Chrysanthemum Tanacetii folio, flore albo, montanum Italicum Barr. Icon. 466. an Bupbithalmum alpinum flore candido Triumph. Obs. 79. Mich. Rar.

BUPLEUROIDI subiunge.

Plantae huius, quae hieme Anni superioris periit, florem procul dubio rosaceum, qualemque describit Boerhaavius observasse me memini, eiusque petala seorsim singula, non autem cohaerentia decidere.

Pag. 19.

CACHRYDI 3. subiunge:

Est Panacis Herculei alterum genus ex Sicilia Caesalp. 311.

CACHRYDI 4. subiunge.

Praecoce est, foliorum lobos profert angustiores, nitidos, & quasi lucidos, serratos, umbellasque albas nudas.

CALAMINTHAE 3. subiunge:

Utraque foliorum iuniorum facies, praesertim inferna, nudo oculo inspecta apparet quodadmodum perforata, per microscopium vero alveolis rotundis excavata, in quorum fundo glandula nidulatur haemisphaerica laevis, assidue Balsamum pellucidum exstillans, quod in guttulas coacervatur, & crassescit, plantamque odoratam facit: Reliqua foliorum superficies rarissimis villis vestitur.

CALAMINTHAE 6. subiunge.

Humilis Planta est, in plures ramulos divaricata: Folia lineas decem la-

ta profert, duodecim longa, raris pilis vestita, & glandulis odoratis undique confersa. Verticilli florum lati & variis digesti sunt, pediculi autem florum lineas ferme quatuor longi sunt, & calyces sesquilineam longi; flores tandem dilute carnei sunt, tubo quadrilineari instructi, ac labia inferiora macula circulari alba, punctatisque rubris variegato.

CALAMINTHAE 7. subiunge.

Est Thymbra flosculis candidis Dod. Pempt. 288. Satureia montana flosculis candidis C. B. Pin. 288. Satureia durior I. B. 3. 272. Thymum Italicum floribus candidis Caesalp. 460 Mich. Rar. Flos quandoque totus niveus est, quandoque circa rictum punctis carneis variegatus. Apices initio carnei sunt, deinde violaceum colorem induunt. In Montis D. Iuliani, & Montium Avanensium Agri Pisani facie meridionali ipsa etiam hieme tepida, in Alpibus item Lucensibus Auxeri Fluvio proximis, & in ipsis Petrae Apuanae iugis, licet frigori ferme perpetuo damnatis, laetissime in rupium fissuris germinat simul cum sequenti specie, seu majori varietate.

9. Calamintha frutescens Satureiae folio facie & odore, flore dilute purpureo. Satureia montana floribus purpureis C. B. Pin. 218. Thymbra flosculis dilute purpureis Dod. Pempt. 288. Thymum Italicum floribus modice purpurascens Caesalp. 461. Mich. Rar. Colore florum vel dilatiore vel saturatiore plurimum variat. Utraque autem species odorem suavissimum & vivacem spirat, cuius sedes est Balsamum, quod larga satis copia e Glandulis per totam foliorum superficiem conspicuis exsudat.

CALCITRAPAE subiunge.

2. Calcitrapa Officinarum flore purpurascens Vaill. in A& Acad. R. Sc. 1718. pag. 209. num. 1. Carduus stellatus, sive Calcitrapa Inff. R. H. 440.

3. Calcitrapa Officinarum flore albo Vaill. Ibid. Carduus stellatus, sive Calcitrapa flore albo Inff. R. H. 440.

CALCITRAPOIDI 3. subiunge.

Flosculi bifformes sunt; marginales nempe steriles, tuba destituti, quinqueviam & inaequaliter secti; discoidei vero integri, coronati, tuba vaginaque instructi. Semina papposa non sunt, verum corolla lineari villosa ornantur, insidentque Thalamo villis vestito.

Pag. 20.

CALTHAE subiunge.

Planta perennis est, semperque virens, & fruticosa. E radice plures emittit caules lignosos ulnam ferme longos, procumbentes, & extrema tantum parte in altum sese attollentes: folia ipsos undique ornantia crassa sunt, valida, integra, ad oras undulata, aut crispata; iuniora item cuticula squamosa alba decidua in margine vestiuntur. Basis foliorum caulem dimidium amplectitur, eorumque costa per caulis superficiem tantillum propagatur. Flores e summis ramulis prodeuntes intus, & extra lutei, unciam lati, semiflosculis 23. coronabulis constant, lineas novem longis, tubo hirsuto, linguaque in tres acutas partes leviter scissa; flosculos item discoideos gerunt tubo pariter hirsuto donatos. In ceteris, ac praesertim seminum forma, a Caliba vulgari non abluat, si villos

los excipias denflores, quibus planta universa integitur, quique Balsamum non adeo glutinosum, nec graveolens ut in Caliba aruensi, & vulgari fundunt.

2. Caltha vulgaris flore pallido C. B. Pin. 275. Inst. R. H. 498.
3. Caltha vulgaris flore citrino C. B. Pin. 275. Inst. R. H. 498.
4. Caltha vulgaris flore rufo C. B. Pin. 275. Inst. R. H. 498.
5. Caltha polyanthos maior, flore aureo C. B. Pin. 276. Inst. R. H. 498.
6. Caltha polyanthos maior, flore melino C. B. Pin. 276. Inst. R. H. 498.
7. Caltha prolifera maioribus floribus C. B. Pin. 276. Inst. R. H. 498.
8. Caltha prolifera maioribus floribus, flore mellino H. R. Par. 35. Inst. R. H. 498. V. Vaill. in Act. Acad. R. Sc. A. 1720. pag. 372. Fior rancio vulgo promiscue vocantur a colore Mali Aurantis corticem imitante.

CAMPANULAE 1. subiunge.

Foetida est, glabra, & lactescens, floribus caeruleis.

CAMPANULAE 2. subiunge.

Flores intus pilosi sunt, insidentque calyci patulo.

CAMPANULAE 13. subiunge.

14. Campanula Alpina saxatilis, foliis angustis ferratis subincanis & tomentosis, floribus parvis albis in capitulum sphaericum digestis. Campanula Alpina sphaerocephalos C. B. Pin. 94. Inst. R. H. 110. Trachelium maius petraeum Pona Bald. in foliis CCCXXXIII. I. B. 2. 801. Trachelium maiori petraeo Pona simile, si non idem I. B. 2. 802. Mich. Rar. qui e Monte Baldo attulit.

CAMPHORATAE subiunge.

Calyx florum bilinearis est, ventricosus, ore angusto in quatuor tantummodo partes secto, quarum duae se invicem respicientes ceteris ampliores sunt. Semen oblongum est, ferri Equini figura, seu seminis Kali hirsuti simile; proindeque a charactere Camphoratae Tournefortiano abluat. In Littore Liburnensi inter Urbem Montemque Nigrum copiose fruticat.

CANNABINASTRO 4. subiunge.

Floris labium superius integrum est, & cochlearis instar excavatum; inferius autem in tria segmenta divisum, quorum medium longius est, & fimbriatum, lateralia vero exigua, obtusa, & prominentissimis stiliformibus circa faucem munita. Pistillus abit in quatuor semina pyramidata, quae nidulantur in calyce campaniformi.

5. Cannabinastrum campestre annuum foliis oblongis ferratis ad petiolum rotundatis, flore parvo albo, calycibus brevibus, radiis trilinearibus. Mich. Rar.

6. Idem flore rubente Eiusd. In Agro Bargini in reditu Bargum a Molendino quod Corsannae Fluvio adiacet, copiosum utrumque invenit florens exoriente Octobri.

CAPRIFOLIO 3. subiunge.

Flores sensu e quolibet verticillo seu acetabulo prodeuntes sesquiquintales sunt, inter-

interne candidi, externae carnei, per senectutem flavicantes, odorati, quorum labium superius latius est, in quatuor rotundas lacinias eleganter divisum. Stylus, & stamina breviora sunt quam in praecedentibus speciebus. Semina rotatim posita, nullis squamis ab invicem distincta, ovata sunt, & eleganter coronata.

CARDAMINE 1. subiunge.

Radice repente donata est, floribusque albis.

CARDAMINE 5. subiunge.

Petala obtusa sunt, sesquilineam ferme longa, semilineam lata, & candida: Stamina item candida sunt, apices ochroleucos sustinentia.

CARDIACAE 2. subiunge.

3. Cardiacae foliis tenuius & profundius incis, villosa Amman. Rar. 50.

CARDUO 2. subiunge.

3. Carduus moschatus flore amplo, capite reflexo Pluk Alm. 83. Carduus nutans I. B. 3. 56. Inst. R. H. 440. Vaill. in Act. Acad. R. Sc. A. 1718. pag. 195. num. 1.

Cardui species duas in Catalogo descriptas Michelius Rar. ad Cirsii genus revocavit; Primam autem appellavit Cirsium palustre altissimum, Alphon deli radice, foliis lanceatis, caule alato, capitulis parvis confectis. Cirsium palustre lanceatum, caule alato, polyanthemum Vaill. in Act. Acad. R. Sc. A. 1718. pag. 202. num. 14. Alteram vero Cirsium parvum annuum, Acanthi folio, flore purpurascens.

Pag. 22.

CARLINAE 3. subiunge.

4. Carlina caulescens magno flore albicante C. B. Pin. 380. Vaill. in Act. Acad. R. Sc. A. 1718. pag. 220. num. 3. In Alpibus Apuanis copiosam invenit, praesertim circa Mercurii Metalla Levilianensia, & Argenti Metalla vulgo à Bottino dicta.

Thalamus, seu fundus florum Carlinae duplici substantia consistit, quae per senectutem facile disjungitur, quemadmodum in pilulis Scillorum accidit. Inferior enim Thalami pars carnea est, & per senectutem fungosa; superior vero cartilaginea, & in plurimas cellas quadratas distincta, Onopordi instar. Cellulae singulae fundum concavum habent, & foramine ovali pervium, quo per arterias ab inferiori parte nutrimentum in semina distribuitur. Membrae quae cellulae parietes constituunt ab invicem disjunguntur, & in filamenta plura scinduntur eleganter capitata, sterculorumque tubarum aculantia. In unaquaque cellula nidulatur semen pappo instructum. Petala plana, seu squamae coronatae constituentes, inferiori calycis parti adhaerent. Non tantum quarta haec, sed etiam prima species, aestivo tempore, e foliis aculeatis calycem cingentibus copiosum Gummi fundunt, quod Ixia in Officinis vocatur. Radicum cortex aromaticus est, & Saccharo conditus in quibusdam stomachi vitiis cum successu adhibetur. Calycis florum pars carnea a squamis, & lanugine purgata in cibum assumitur. Species 1. folia Onopordi vulgaris forma, ac binos, ternosve flores

flores amplissimos, Cinaræ sativæ instar, profert. Abunde autem provenit in Montibus Clusentinatibus la Consuma dictis; in Monte quoque Scalaris in loco dicto la Casa al Monte germinantem inveni.

CARYOPHYLLO 2. subiunge.

Villi in centro floris fissi per microscopium observati, colorem florum *Amaranthoidis* exprimunt.

CARYOPHYLLO 5. subiunge.

Folia Graminea sunt, tenuissime serrata, & obtuse mucronata: Floris color ad roscum vergit. Petala lineas 14. longa sunt, septem lata, ad extremitatem rotundata, & altius serrata, & calyx inaequaliter dentatus, ac duobus foliolis per basin circumdatus. Caeterum Caryophylli florem non polypetalum, sed monopetalum, in quinque vel plures laciniis ad centrum usque divisum esse, Michelius afferet in schedis.

Pag. 23.

CARYOPHYLLO 8. subiunge.

Petalorum pars inferior viridis est.

CARYOPHYLLO 9. subiunge.

Speciem hanc Michelius in *Adversariis* ita descripsit.

Caryophyllus minimus, erectus, subasper, caulibus palmaribus, raris magis expansis, foliis tenuissimis, floribus purpurascens, solitariis, petalis cordatis integris tres lineas longis & unam latis, calyce costulato. *Betonica Coronaria*, sive *Tunica minima* I. B. 3. 337. *descript.* Caryophyllus Gramineo folio minimus Rati Hist. T. 2. 1002. num. 4. Syll. 89. In moenibus Florentinae Urbis sponte germinat.

CARYOPHYLLO 10. subiunge.

Repens est, & Polygoni folia perexigua habet. Petala quatuor sunt, circa umbilicum exalbida, lineas quatuor longa, & unam lata: cornicula brevissima sunt: calyces vero costulati, & duobus tantum foliolis per basin circumdati.

11. Caryophyllus Sinenis supinus, Leucos folio, flore vario Tournef. in *Adis Ac. Sc. A.* 1705. Boerch. *Ind. Alt. H. Lugd. Bat. Part. 1.* 219.

12. Idem flore pleno Eiusd.

13. Caryophyllus, qui *Tunica* ramosior, flore candido cum corolla purpurea H. Eltham. 401.

CASSIDAE 5. subiunge.

6. Cassida palustris, vulgaris (repens, angustis folia, glabra) flore caeruleo *Inst. R. H.* 182.

7. Cassida palustris minima (repens, foliis angustis acutis & bisauritis) flore purpurascens *Inst. R. H.* 182. Mich. *Rar. E Palustribus Blentinensibus*, & *Pisanis attuli*.

CATARIAE subiunge

2. Cataria Lusitanica erecta, *Betonicae* folio, tuberosa radice *Inst. R. H.* 202.

3. Cata-

3. *Cataria* maior foliis oblongis, pyramidatis, acutis, ad petiolum aequalibus, spicis brevibus, floribus albis. *Mentha Cataria* J. B. 3. 225. *sed descript.* *Herba Gatta* Cast. 212. *Cattaria* five *Mentha Catti* Lob. Ic. 511. *Herba Felis Matthioli* Lugd. 908. Mich. Rar.

CEDRO subiunge.

An Juniperus Bermudiana H. L. 345. Boerh. Ind. Alt. H. Lugd. Bat. Part. 2. 208. *cuius elegantissima Icon. vivis coloribus expressa exhibetur Tab. 1. Catalogi Plantarum tum exoticarum tum Domesticarum, quae in Hortis haud procul a Londino sitis in venditionem propagantur.*

Ad hoc Cedri genus revocandae sunt Sabinae species in hoc ipso Catalogo descriptae pag. 83.

CENTAURIUM MINUS annuum, glaucum, perfoliatum, foliis latioribus & brevioribus, acutis, floribus luteis polypetalis, calyce bilineari, denticulis angustissimis. *Centaurium luteum perfoliatum* C. B. Pin. 278. *Inst. R. H.* 123. *Centaurium minus perfoliatum luteum umbellatum* Bar. Icon. 515. n. 2. 1. *Centaurium luteum* Camer. Epit. 427. *Centaurium luteum alterum* Lugd. 12. 91. Mich. Cat. Plant. Agri Flor.

2. Idem foliis angustioribus. *Centaurium luteum perfoliatum angustifolium* C. B. Pin. 278. *Centaurium luteum prius* Lugd. 1290. Mich. Cat. Plant. A. Flor.

3. *Centaurium minus*, annuum, floribus purpureis in parvas rariores & minus compactas umbellas digestis. *Centaurium minus flore purpureo* I. B. 3. 353. *Centaurium minus* Matth. 692. Fuchf. Hist. 386. Mich. Ibid.

4. Idem floribus crebris, in parvas umbellas magis compactas digestis. *Centaurium minus* Dod. Pempt. 336. Ic. Cam. Epit. 426. *Centaurium primum* Lob. Icon. 401. Mich. Ibid.

De Centaurii maioris speciebus V. inferius adnotata ad Rhapontici species.

CERASO 2. subiunge.

Calyx florum conicus, seu cyathiformis est, margine repando, & in quinque dentes divisio, flaminulisque obvallato: petala inter dentium, seu laciniarum calycis divisiones nascuntur, oblonga, & in extremitate rotundata.

CERATOSPERMO subiunge.

CERINTHE maior annua, Glasti folio maculato & spinoso, flore maiore luteo vel flavo, cum ore denticulato, denticulis deorsum reflexis. *Cerintbe quorundam maior, spinoso folio, flavo flore* I. B. 3. 606. *Inst. R. H.* 80. *Cerintbe flavo flore, aspersior* C. B. Pin. 258. Raii Hist. T. 1. 506. *Cerintbe quorundam maior flavo flore* Clusf. Hist. CLXVIII. Mich. Rar.

2. Eadem flore ima parte rubro, summa vero luteo Ejusd.

CHAEROPHYLLO subiunge.

2. *Chaerophyllum sylvestre alterum*, geniculis tumentibus *Inst. R. H.* 314.

Pag. 24.

CHAMAECERASO 2. subiunge.

3. *Chamaecerasus Alpina* fructu gemino rubro, foliis longioribus acutis Mich. Rar.

De Chamaedry 4. vide sis adnotata ad Teucrium pag. 93.

CHA.

CHAMAEDRY 6. subiunge.

Ad Teucrii Genus revocavit Micheli^{us} Rav.

Superior foliorum facies villis rarioribus, ac brevioribus obsita est, inter quas plurimae exiguae glandulae sitae sunt, e quibus extillat Balsamum pellucidum: in inferna etiam parte, in adulta Planta, intra villos longiores & magis implicatos, glandulae similes latent, e quibus Balsamum odore acutiore praeditum extillat.

CHAMAEDRY 8. subiunge.

Annua est, & hirsuta: folia oblonga serrata profert, & flores albos. Notari meretur Plantam hanc singulis octo, vel decem annis sponte per Horti solum variis locis nasci. Idem contingit Ricinoidi ex qua paratur Tournesol Gallorum Inst. R. H. 655. & Tithymalo argenteo maritimo leptophyllo Lael. Triumpheti. Sexdecim sane annorum spatio Chamaedrym hanc, & Tithymalum semel tantum, Ricinoidem vero ter renatam vidi. Talis miraeque seminum incorruptibilitas Physicis, & Agriculis opportuna corollaria ministrabit.

9. Chamaedrys palustris, canescens, fruticosa, Cretica, flore purpureo, quam Micheli^{us} ex ultimo suo itinere advexit, sibi a Cl. Leonardo Sessler, ut puto, communicatam.

CHENOPODIO 1. subiunge.

Planta ad trium spithamarum mensuram attollitur. Flores in spicis ramosis digesti sunt, quique spicae summitatem occupant, primitus expanduntur. Calyx in quinque subrotundas partes sectus est, coelearis instar excavatas, intus candicantes, extus in medio virides, margine foliaceo candicante auctas. Stamina quinque sunt, pellucida, calycis squamis duplo longiora, apices citrinos didymos, & Malvae Moschatas similes sublinantia. Centrum floris occupat Placenta orbicularis, depressa, viridis, in summitate filo rubro bipartito brevi instructa, & mucro quodam glutinoso per totam superficiem illita. Flare nondum expanso singularum staminum apices glutine isto implicati placenta firmiter adhaerent, & calycis squamis invicem appressis integuntur; affluente vero apicibus, staminibusque novo nutrimento, sensim ipsi turgescunt adeo intra calycis squamas latere amplius non possint; quinimmo eas ab invicem distrabunt, & hiare cogunt. Recluso igitur, expansoque flore, Solis calore gluten, quo, ut diximus, Placenta, seu Embryonis calyptra inscitur, enervat, aut exsiccatur, fibrasque staminum rigidiores ita efficit, ut stamina ipsa a glutinis vinculis soluta elateris vi quadam erigantur, expandantur, & calycis squamas superpositas deorsum distrabant. Idem ferme accidit scilicet apices a glutinis nexu liberaveris. Placenta, seu Embryo abit in fructum involacro rubro, punctulis seu alaculis pellucidis affabre distincta, tectum, & unico semine nigro splendente fetum. Barrellerii Icon rudis admodum est, nec plantae faciem exprimit.

CHENOPODIO 2. subiunge.

Flos, seu Calyx ad medium usque sectus est in quinque partes tenuissime in summitate laciniatas. Stamina quinque habet brevissima, apicem biocentrem sublinentia, & embryonem stipantia, qui pyramidalis est, trigonus, basi, vel parte ampliore sursum elevata, tribusque capillamentis in summitate donatus, ac unico semine nigro splendente reniformi, seu in basi rostrato, fetus: Calyx fructum non vestit.

CHE-

CHENOPODIO 3. subiunge.

Flores a prima specie non abludunt, si filamenta, seu stilos embryonis longiusculos rubros excipias. Pulvisculus albus, quo universa Plantae superficies vestitur tamquam si cinere adpersa esset, ut adnotavit Caesalpinus, per microscopium visus, nil aliud apparet esse, quam vesiculae minimae, oviformes pellucidae, plantae cuti adfixae.

CHENOPODIO 6. subiunge.

Planta haec Mexicana climati nostro aden adsuevit, ut sponte, & frigoribus invicta in Arni ripis, & salictis molesta copia nascatur. Ceterum haec, & superior semen proferunt nudum, seu mavis calyptra non involutum; easque ad Botryos Genus revocavit Michelius Rar.

CHENOPODIO 8. subiunge.

Folia glauca, obtusa, & carinata profert, semenque rostratum. Hoc & sequens Michelius Rar. ad Kali genus revocavit.

CHENOPODIO 10. subiunge.

Flores herbaceos profert, semenque cochleatum; proindeque Michelius ad Kali Genus revocavit Rarior.

11. Chenopodium altissimum Botryoides Amman Rarior. 165.**Pag. 26.****CHRISTOPHORIANAE subiunge.**

Calyx floris nondum expansi sphaericus est, constatque quinque foliolis; duobus nempe exterioribus subviridibus, & admodum cucullatis, quae tria folia pariter cucullata, sed masculula, & candida includunt. Petala quatuor tantummodo sunt, lineas duas longa, & tertiam lineae partem lata, candida, e quorum centro surgit pistillus facie vitis semen referens, obtusus, 44. staminibus ad basin stipatus, quae apices lanceatos & biventres substinent.

CHRYSANTHEMO 3. subiunge.

4. Chrysanthemum foliis Matricariae C. B. Pin. 134. Boerh. Ind. Alt. H. Lugd. Bat. p. 1. 105.

5. Chrysanthemum folio Matricariae, flore luteo pleno Eiusd.

6. Chrysanthemum flore partim candido, partim luteo C. B. Pin. Eiusd.

7. Chrysanthemum folio Matricariae, flore albo pleno H. C. Eiusd.

8. Chrysanthemum folio Matricariae, floris radiis sulphureis, disco aureo Eiusd.

9. Chrysanthemum folio Matricariae, flore magno bullato fere nudo Eiusd.

CHRYSOCOME subiunge.

Est Conyza Linariae folio Vaill. in Act. Acad. R. Sc. A. 1719. pag. 397. num. 3. A Conyzae tamen Genere seiunxit Michelius Rar. & Chrysocome restituit, eo quod flores e foliis flosculis hermaphroditis constent, non autem semiflosculis quoque, ut Conyzae maiori vulgari C. B. contingit. Thalamus praeterea, cui flosculi insident, cellulatus est, Onopordi instar, eiusque cellularum

rum anguli in limbum angulosum eleuantur, nullis tamen foliolis, seu squamis munitur, quibus flosculi ab invicem distinguantur, quemadmodum in eadem Conyza maiore. Semina longo pappo instructa sunt. Calyx coni inversi figura squamis longis constat, acuminatis, & in summitate reflexis.

2. Eadem minor. In collibus argillofis secus viam Regiam Pisanam, praefertim di San Romano, & della Rotta dictis, nec non in Ericetis Aquae Tettuccianae prope Montem Catinum Vallis Nebulae copiosam inveni. Licet autem humilior, & gracilior superiori specie sit, flores profert maiusculos, & amplioribus flosculis ornatos. Quidam ex his per senectutem colorem mellinum, vel rubentem elegantissimum assumunt.

CICHORIO 3. subiunge.

4. Cichorium silvestre, folio angusto simpliciter laciniato, flore caeruleo maiore Mich. Rar.

5. Cichorium silvestre, Erysimi folio, flore caeruleo. An Cichorium silvestre, Picris Dod. Pempt. 635. Seris Picris silvestre Fuchf. 679. Mich. Rar.

6. Idem flore minore. Cichorium silvestre angustifolium Lugd. 577. Cichorium folio valde angusto Caesalp. 507. Cicorea Salvatica Matth. 532. Mich. Cat. Plant. Agri Flor.

CICUTAE subiunge.

2. Cicuta minor Petroselinum similis C. B. Pin. 160. Inst. R. H. 306.

CINARAE 5. subiunge.

In collibus argillofis secus viam quae ab Urbe Volaterrana Salinas ducit, le Moie di San Giovanni, detorto a Muria nomine, vocatas, Octobri Mense germinantem inveni Cinarae silvestris speciem, quae folia angustissima, multifariam laciniata, Acanthi aculeati quodadmodum similia, & aculeis flavescentibus in loborum summitate instructa profert. Caules effeti, aridique pedales erant, calycemque sustinebant oblongum, cuius squamae in validum aculeum desinebant. In Hortum translata caulem floriferum nondum emisit: num igitur est Cinnara silvestris spinosa Raii Syllog. 289 vulgo Sgalera? quam Michellius Rar. per planitiem Crassetanam abunde nasci testatur?

CIRSIO 6. subiunge.

7. Cirsium Creticum altissimum, Cardui lanceolati folio Coroll. Inst. R. H. 32. Vaill. in Act. Acad. R. Sc. A. 1718. pag. 201. num. 1.

8. Cirsium Acanthoides in foliorum ambitu spinis mollibus creberrimis hirtum, flore flavescente. Carduus alpinus Carlinae folio & facie, flore flavescente D. Michaeli Vaill. in Act. Acad. R. Sc. A. 1718. pag. 203 numer. 21. Mich. Rar.

9. Cirsium Asphodeli radice, foliis magnis iocanis. An Cirsium maximum Asphodeli radice Inst. R. H. 447. Mich. in Advers.

10. Cirsium tuberosum capitulis squarrosis H. Eltham. Semina ab ipso D. Dillenio accepti.

Pag. 27.

CITREO 3. subiunge.

4. Citreum, quod Malum Citreum flore pleno, & fructu prolifero Flor. Norimb. 117. Cedro di Fiore, e Frutto doppio.

R

CLE-

CLEMATITI 1. subiunge.

Petala florum lineas quinque longa sunt, sesquilineam lata, utrinque acuminata; apices autem pallefcunt.

CLEMATITI 2. subiunge.

Floribus tum onusta apparet, quum sequentis speciei flores omnes deciderunt; petala autem profert angustissima.

CLEMATITI 4. subiunge.

Petala plerumque quatuor gerit, quandoque autem quinque, semuncialia, sesquilineam longa, utrinque acuminata; stamina vero alba, & apices pallidos.

CLEMATITI 8. subiunge.

Ad singulos nodos polyphylla est, & geminis capreolis donata. Flores albos solitarios profert, calyce monophylo mitrato instructos.

CLEMATITI 11. subiunge.

Hanc & sequentem speciem ad Vixicellae genus cum Dillenae revocavit Michellius Rarior.

CLINOPODIO 2. subiunge.

3. Clinopodium perenne Pulegii odore, Maioranae folio, Patavinum Boet. Mus. part. 1. pag. 60. Tab. 45.

4. Clinopodium Canadense fistulosum, foliis dilate virentibus & hirsutis Boerb. Ind. Alt. H. Lugd. Bart. part. 1. 158.

Pag. 28.**COMELINAE subiunge.**

Est Comelina procumbens annua, Saponariae folio H. Eltham. 92. Tab. 78.

In CONVOLVULI 2. nomine pro nigris & angulatis scribe magis angulatis.

CONYZAE 1. subiunge.

Huius Plantae flores, quemadmodum adnotavit etiam Michellius, non e foliis flosculis componuntur; verum & veris quoque semiflosculis simplici tuba instructis, qui perispermiam corymborum occupant, & flosculorum numerum excedunt. Praeterea thalamus, qua parte semiflosculi ipsi siti sunt, foliolis quibusdam angustissimis ornatur, quae semiflosculos ab invicem distinguunt. Talis autem character nulli e ceteris Conyzae speciebus hactenus notis communis est.

CONYZAE 2. subiunge.

Ad Eupatorii Genus revocavit Michellius Rarior. Corymbos cylindratoos profert, quorum calyx non squamosus est, sed paucis simplicibusque foliolis aequalibus, unaque serie digestis constat. Intra calycem siti sunt flosculi unius omnes formae, hermaphroditi nempe Semina pappo instructa oblonga sunt, compressa, angulosa, seu costulata, & in acumen terminata, quod nervus brevissimus ope adnectitur foramini papillarum quibus thalamus nudus scatur.

Pag. 29.

CORIARIAE subiunge.

Flos femininus petala quinque gerit, quae conspicua potissimum sunt in flore effeto; tunc enim duplo ferme maiora calycis squamis adparent. Mich. Advers.

CORONAE SOLIS 4. subiunge.

Caules lignosos profert; folia autem aspera & coniugata. Semiflosculi ovati sunt, lineas novem longi, quatuor lati, tubo nigra, nulla tamen tuba instructi: flosculi autem tuba bifida, & vagina, tubaque purpurea muniuntur, ac squamulis quibusdam ab invicem separantur. Semina nuda sunt, seu duabus tantummodo squamulis in summitate ornata.

CORONOPO 3. subiunge.

4. *Coronopus silvestris, perennis, hirsutus, foliis humistratis, modo latis, modo angustis, cum appendicibus modo magis, modo minus laciniatis. Coronopus, seu Herba stella silvestris, foliis profunde laciniatis Erucac similitudine Caesalp. 329. An Coronopus silvestris hirsutus laciniatior H. Cathol. Rar. T. 3. pag. 434. Mich. Rar. Per Viam Regiam Pisanam, in sabuloso colle circa veterem Arcem Montis Lupi germinantem inventi.*

COTINO subiunge.

Siccissima Asbat, Augusto exente, e minimis corticis fissuris extillabant guttulae Terebinthinae cuiusdam pellucidae, lentae, quae odore & sapore Lagnam adamussim referebat.

2. *Cotinus floribus, fructibus, & capillamentis ex albo flavescentibus. Scatanum vulgo Caesalp. 79. Mich. Cat. Plant. Agri Flor. In caeduis sylvis per Montem Maurillum Florentiae proximum sponte provenit.*

CRAMBI subiunge.

Florem profert luteum in spicas digestum; petala autem cordata, fructusque asperos, non ita facile per se debiscentes, & in tria inaequalia loculamenta divisos, in quorum singulis unicum semen nigrum nidulatur.

Pag. 30.

CRATAEGO 2. subiunge.

3. *Crataegus folio oblongo, ferrato, utrinque virente Inst. R. H. 633.*

CROCO 3. subiunge.

Flos sativo minor, inodorus est, dilute carneus, tantillo livore infectus, nisi quod tria petala exteriora, atque ampliora, lineis quibusdam purpureoceruleis ornantur. Filamenta lutea sunt, breviora, & inutilia. A. 1743. dum lustrarem vestigia veteris Pisani Portus prope Liburnum, Croci huius plantas aliquot ipso Ianuario Mense floridas repperi: Plurimas autem obvias habui Mense Martio A. 1745. dum Aluminis fodinas in Agro Montis Rotundi Orae Maritimae Senensis inspicerem.

CRUCIATAE 2. *subiunge.*

Viticuli ab imo ad medium hirsuti sunt, superiori parte glabri.

CRUCIATAE 3. *subiunge.*

Est Cruciatra palustris alba, foliis glaucis in eadem planta nunc binis, nunc quaternis, modo latis, modo angustis, interdum brevibus, interdum longioribus, floribus exiguis paniculatim nascentibus, fructu Coriandri forma Mich. Cat. Plant. Agri Flor.

CUCUMERI 2. *subiunge.*

CUMINOIDES vulgare Inst. R. H. 300.

Pag. 31.

CYANO 3. *subiunge.*

Haec & sequentes species a Vaillantio in Act. Acad. R. Sc. A. 1718. pag. 230. ad Amberboi Genus revocatae fuere, primaque appellata Amberboi flore incarnato odorato. 2. Idem flore albo 3. Idem flore luteo odorato.

CYANO 5. *subiunge.*

6. Cyanus montanus angustifolius purpureus Barr. Obs. 964. Sc. 1323. Vaill. in Act. Acad. R. Sc. 1718. pag. 234. num. 9.

7. Cyanus alpinus capite pennato Inst. R. H. 445. Vaill. Ibid. num. 10.

CYTISO 1. *subiunge.*

Est Cytisus glaber, viridis, foliis in roanditate acuminatis, cauli immediate adhaerentibus, floribus luteis spicatis, calyce brevissimo, filiquis latis nitidis Mich. Rar.

CYTISO 2. *subiunge.*

Folia inferna villosa sunt.

CYTISO 8. *subiunge.*

Est Cytisus spicatus flore purpureo Inst. R. H. 648. Cytisus praecox spicatus, rubello flore, caule rubro. Bocc. Mus. Part. 2. 31. Tab. 19. ex Mich. Rar.

Pag. 33.

DENTI LEONIS 1. *subiunge.*

Folia cubitalia, inaequaliter laciniata, & subhirsuta proferre.

DIGITALI 6. *subiunge.*

7. Digitalis peregrina glabra, foliis coniugatis non serratis, floribus villosis dilute purpureis. *Draccephalus latifolius glaber Lysimachiae luteae foliis Mor. Hist. Oxon. part. 3. 417. Selt. 11. Tab. 21. fig. 2. Mich. Rar. Quod proinde Morisonii synonymon pag. 34. huius Catalogi delendum est.*

DIMOR-

DIMORPHOTHECA foliis incis, ovariis minoribus. *Caltha Africana* flore intus alba, foris violaceo Inst. R. H. 499. Vaill. in Act. Acad. R. Sc. A. 1720 pag. 361. num. 3.

DISPACO subiunge.

Folia, caulis, & foliola circa capitula spinosa sunt.

2. Dispacus silvestris non perfoliatus, foliis serratis per basim in duas lacinas plerumque divis, capitulis rotundis exiguis albis, squamis latis ad oras aculeatis.

3. Dispacus silvestris capitulo minori, vel Virga Pastoris minor Boerh. Ind. Alt. H. Lugd. Bat. part. 1. 133. Mich. Rar.

DORIAE 3. subiunge.

Hanc ad Solidaginis Genus revocavit Micheli Rarior.

Pag. 34.

De DRACOCEPHALO vide sic superius adnotata ad Digitalem.

ECHIO 5. subiunge.

6. Echium lato Plantaginis folio, Italicum (annuum, flore magno purpureo) Barr. Obs. 16. num. 143. *Lycopsis Plantaginis folia Italica Eiusd.* Icon. 1026. Echium annuum latis Buglossi foliis H. Pis. Echium Alcibiadis maximum, foliis Buglossae maioribus & asperis, floribus caeruleis magnis Mentz. Pag. Echium latissimo folio, Lycopsis dictum, flore dilute purpurascens H. Lugd. Bat. Echium purpureo campanulato flore, folia subrotunda H. Catbol. App. 3. Anchusa maior. Caesalp. 435. Lycopsis C. B. Pin. 255. Lycopsis Dioscoridis quibusdam I. B. 3. 584. Cynoglossa vera Matt. 1248. Mich. Rar. In ipsa Pisarum Urbe, in Prato inter Primatiam Basilicam, & splendidissimum Coemeterium sita nascitur.

ELICHRYSO 7. subiunge.

Capitula, seu corymbos profert cylindricos, lineas quinque longos, in diametro duas cum dimidia latos, qui squamis pluribus circumvallantur angustis, foliaceis, acuminatis, subinde decrecentibus, non splendentibus, & e viridi albicantibus. Flosculi duplicis formae sunt, qui enim circa floris peripheriam siti sunt, unico cylindro coronato, & tuba munito constant; qui vero interiori floris partem occupant, lineas tres cum dimidia longi sunt, tubulati, angustissimi, circa medium nonnihil ampliati, vagina flaminea, & tuba bifida praediti, ore in quinque exilissimos dentes dilute aureos, & complanatos scisso. Insident hi summitati seminum vix semilinearium, angustorum, cinereorum, quae pappis longitudine flosculos aequantibus instruuntur. Tbalamus nudus est, & favi, vel Onopordi florum Tbalami instar cellulatus. Non autem haec tantum Elichrysi species flosculis duplicis naturae praedita est, sed & aliae omnes hic descriptae.

8. Elichrysium obtusifolium capitulis argenteis conglobatis, H. Eltham.

9. Elichrysium silvestre angustifolium capitulis conglobatis C. B. Pin. 264. Inst. R. H. 453. Chrysocome in Moenii Pisanis, foliis Elichrysi rarioribus, capi-

capitulo singulari in ramulorum cacumine Caesalp. 485. Mich. Rar. Non solum in Moenibus Pisanæ Urbis inter Aquaeductus Castellum, & Portam Calcentem vulgo delle Piagge dictam, ubi Vigna in Theophr. nasci asserit, sed & in Montibus Pisanis, præsertim prope Balnea D. Iuliani, & prope Lasomias Olivæti in rupium fissuris inveni.

10. Elichrysium spicatum Inst. R. H. 453. Chrysocome alia in montibus, pluribus capitulis in unum aggregatis Caesalp. 485. Mich. Rar.

ELMINTHOTHECA hispida perennis & vulgaris Vaill. in A& Acad. R. Sc. A. 1721. pag. 269. num. 6. Hieracium asperum maiori flore in limitibus agrorum Inst. R. H. 469.

2. Elminthotheca hispida, vulgaris, annua Vaill. ibid. Hieracium Echiodes capitulis Cardus Benedicti Inst. R. H. 471.

3. Elminthotheca Alpina, perennis, aspera, Buglossi folio Mich. Rar. Tres hæc Plantæ in hoc ipsa Catalogo inter Hieracii species descriptæ fuerant sub num. 9. 10. 11.

EPHEDRAE 1. subiunge.

Masculina Planta est; flores siquidem tantummodo steriles profert Mense Maio e nodis ramuscularum, quales Cl. Linnaeus describit Gen. 766. sequens autem species flores femininos tantummodo gerit.

ERICAE 2. subiunge.

Est Scopa floribus albis Caesalp. 104. Flores odorati sunt.

ERICAE 3. subiunge.

Incunte Autumno florum rudimenta profert herbacea, quæ non nisi Februario Mense expandi incipiunt, ac per totum Maium durant. Bilineares hi sunt, canici, seu ampullæformes, coriacei, dilute purpurei, ore in quatuor dentes scisso. Stamina gerunt quinque candida, apices atropurpureos subistentia. Stylus oblongus est, flori item concolor. Calyx quadrifariam divisus flori item concolor, & albicantibus maculis infectus, petiolo bilineari appenditur, cui circa medium parvulae duæ laminulae adnascuntur albicantes, quæ florem tenellum amplectuntur.

4. Erica alpina, procumbens, prorsus glabra; foliis Juniperinis ex adverso quaternis, longioribus, angustioribus, & veluti marginatis, ac costa donatis, floribus dilute purpureis, bilinearibus, uno versu dispositis, calyce longiori Mich. Rar. In Alpibus Petrae Apuanæ secus viam quæ Barga Stazzemam ducit, inter Furnum Volastrum & Stazzemam, in rupium marmoris Lunensis fissuris abunde provenit.

5. Erica foliis Coriis multiflora I. B. 1. 356. Inst. R. H. 602. Erica 2. Matth. 170. An Scopa flosculis purpurascens Caesalp. 104. Mich. Rar. In Montibus Liburnensibus sponte provenit.

Pag. 36.

ERIOCEPHALO 6. subiunge.

7. Eriocephalus capite oblongo maximo, flore albo Vaill. in A& Acad. R. Sc. A. 1718. pag. 204. num. 3. Carduus tomentosus capite maiore C. B. Pin. 382. Cnicus lanceolatus validissimis aculeis munitus Inst. R. H. 450.

8. Erio-

8. *Eriocephalus parvus lanceatus*, capitulis exiguis pyriformibus purpureis Mich. Rar.

ERUCAE 3. subiunge.

Glabra est, foliis latis in amplas lacinias usque ad costam divisis, lobis Cornu Cervi divisuras aemulantibus, & plerumque alternis, siliquis planis, semine subrotundo cinereo-rufo.

ERUCAE 4. subiunge.

Est Eruca silvestris, fruticosa, perennis, glabra, foliis latis in amplas lacinias divisis, lobis longis, angustis, non serratis, & quasi invicem oppositis, flore luteo, siliquis strictioribus, semine ovato Mich. Cat. Plant. Agri Flor.

ERUCAE 5. subiunge.

Ramulos subasperos gerit.

ERYNGIO 4. subiunge.

5. *Eryngium maritimum rotundifolium caeruleum Mich. Rar. In Arenoso litore ad ostium Caecinae fluvii, prope Castrum ab Ampl. Viro D. Carolo Ginorio recens extructum, simul cum superiori nascitur.*

6. *Eryngium montanum Amethystinum C. B. Pin. 386. Inst. R. H. 327.*

EVONYMO subiunge.

2. *Evonymus latifolius C. B. Pin. 428. Inst. R. H. 617.*

Pag. 37.

FAGOPYRO 2. subiunge.

3. *Fagopyrum erectum, fructu aspero Amman. Rarior. 168. cuius semina ipse D. Amman. mecum perhumaniter communicavit A. 1737. nomine Fagopyri Sibirici, erecti, semine aspero, floribus parvis: climati autem nostro adeo illud adsuevit, ut non solum laete germinaverit, sed fructus fecundos protulerit.*

FAGO subiunge.

Duas huius varietates in Horto colimus, quas Michelius Rar. ita distinxit.

1. *Fagus fructu rotundo. Fagus Latinorum, Oxya Graecorum I. B. 1. 117.*

2. *Fagus fructu oblongo. Fagus Lob. Icon. 160.*

FICOIDI 1. subiunge.

Est Mesembryanthemum crystallinum, Plantaginis folio undulato H. Eltham. 231. Tab. 180. Aeri nostro adeo se accomodavit, ut vivatissima sit, & importuna ferme evaserit.

FICOIDI 2. subiunge.

Foliis perbelle refert Mesembryanthemum acinaciforme, flore amplissimo purpureo H. Eltham. 282. Tab. 211. fig. 270. & Tab. 212. fig. 271. Flores autem nondum protulit.

FILICULAE 1. subiunge.

Huius Plantae flores die 6. Maii observavit Michelius: hi autem, quem-
admo-

admodum in *Adversariis* adnotavit, nil aliud sunt, quam filamenta exigua alba, seu pellucida, globulis quatuor, vel quinque invicem superpositis constantia, sitaque in superficie caulium, seu pediculorum foliorum e terra erumpentium, ac nondum expansorum, inter squamulas plures reticulatas. Polytrichi flores similes hisce sunt, & inter pinnularum divisiones nascuntur. Similes quoque sunt flores Linguae Cervinae, & Polypodii; verum ramosi sunt.

FILIPENDULAE subiunge.

Petala florum ovata sunt & integra, quandoque tamen in summitate cordata; staminaque lutea.

2. Filipendula maior foliorum tarsis angustis, & usque ad costam divisis Mich. Rar.

Pag. 38.

FOENUI GRAECO subiunge.

2. Foenum Graecum silvestre, Meliloti facie Corol. Inst. R. H. 28.

3. Foenum Graecum silvestre alterum polyceration C. B. Pin. 348. Inst. R. H. 409.

FRAGARIAE 7. subiunge.

Planta humilis est, cespitosa, perennis, cuius folia trilobata, & argute dentata, glauca lanugine pubescunt. Flores Mense Februario erumpunt circa radicem ex alis foliorum, & e sinu laminarum trium villosarum, albescensium, tenuium, bilinearum, e lata basi in acumen productarum, quibus alae foliorum undique vestiuntur. Terni autem plerumque flores communi, hirsuto, brevique pediculo subsistentantur, carneique primum sunt, praesertim circa petalorum angues, & costulas; tractu autem temporis candidi evadunt, brevique marcescunt. Calyx externe hirsutus est, scutellatus, ferme pentagonus, fundo utrinque rubente, oreque in lacinias decem aequales, acutas, petalis longiores scisso, & ferme repando. Margini calycis adnascuntur, brevi tamen intervallo seiuncta, petala quinque bilinearia, ex angusto principio dilatata, & in summitate leviter cordata. Singula Cyati pentagoni latera tribus linearibus staminulis candidis, anguli vero uno tantummodo ac minori staminulo obvallantur. Stamina autem haec omnia apices parvos luteos subsistentia embryoni ita apprimuntur, ut ipsum foventia pyramidem quodadmodum basi pentagona constituent. Embryo abit in fructum Ranunculi pratensis, aut Quinquefolii fructus imitantem, pluribus seminulis fetum compressis, rugosis, tuba brevissima candida instructis, ad basin villosis, confertis, & placentae cuidam virenti ac pulposae adfixis. Ad Comaroidis proinde genus a Cl. Pontaderio *Anthol* 290. institutum revocanda videtur haec Fragariae species, quam sponte germinantem inveni in maceriis prope Butium Oppidum Montium Pisanorum, & prope Stazzemam Pagum Alpium Apuanarum.

Pag. 40.

Est Gallium Alpinum saxatile, pumilum, caule semipalmari, erectum, foliis latiusculis a medio ad summum tenuissime denticulatis, floribus albis, sectio-

sectionibus in praetenuem pilum abeuntibus. *Rubeola Alpina saxatilis* Bocc. Mus. Part. 2. 145. Tab. 101. Mich. Rar.

GALLIO 4. subiunge.

Est Gallium Alpinum, saxatile, pumilum, erectum, ima parte villosum, foliis angustis, floribus albis, sectionibus in longiusculum pilum abeuntibus Mich. Rar.

GALLIO 6. subiunge.

Caulis, anguli, & foliorum margines denticulis tenuissimis, & vix apparentibus exasperantur. Flores solitarii sunt, & in ramusculorum summitate uno versu dispositi: variant autem colore saturatiore, vel dilutiore. In alpinis Petrae Apuanae, praesertim a Furno Volastro eundo Stazzemam, copiosum inveni.

GENISTAE 2. subiunge.

Folia margine, seu fimbria quadam diaphana ornantur.

GENISTAE 6. subiunge.

Est Genista tinctoria Florentina maior, siliquis villosis Mich. Cat. Plant. Agri Flor.

GENISTAE SPARTIO 2. subiunge:

3. *Genista Spartium Italicum*, minus, Linifolium, floribus luteis, siliquis brevissimis, villosis, & obtusis, seu frontatis Mich. Rar.

4. *Genista Spartium Italicum*, non spinosum, iunceum & triphyllum, foliis & ramis coniugatis, floribus luteis in capitulum congestis, siliquis brevioribus hirsutis. *Genista radiata*, sive *stellaris* I. B. 1. 399. Inſt. R. H. 643. *Genista lloensis* Lugd. 174. *Spartium triphyllum* C. B. Pin. 396. *Spartium montanum triphyllum* Col. part. 1. 295. Mich. Rar. quod proinde a Genistae speciebus, inter quas num. 7. descriptum fuerat seiungendum est.

GERANIO 4. subiunge.

Est Geranium Alpinum radice longa, foliis coniugatis ad Saniculam accedentibus, flore odorato purpuroviolaceo, petalis integris, calyce globoso rubente, fructu brevi &c. Mich. Rar. *Flos patulus est, petalis cinctis.*

GERANIO 5. subiunge.

Flores uno versu dispositi sunt, petalisque donantur angustis, utrinque acuminatis, externe albidis, interne purpureis.

GERANIO 7. subiunge.

Radice tuberosam profert; folia coniugata, tenuiter & eleganter divisa, florem purpureum ampliorem, petalis semunciam longis, lineas quatuor latis, cordatis & altius incisis, fructumque brevem. Ex Mich. Rar.

GERANIO 8. subiunge.

Perenne est; folia parva profert usque ad centrum in tenuissimas lacinias divisa; floremque purpureum, petalis cordatis, lineas quinque longis, & quatuor latis. Ex Mich. Rar.

GERANIO 9. subiunge.

De hac, & duabus insequentibus speciebus V. H. Eltham.

Pag. 44.

GERANIO 12. subiunge.

Folia crebro & eleganter divisa profert.

GERANIO 14. subiunge.

Annuum est: folia gerit coniugata, circinata, tenuiter divisa; flores pediculis longis insidentes, purpurorubentes, petalis tres lineas longis, unam latis; calycem amplum; semenque reticulatum. Ex Mich. Rar.

GERANIO 15. subiunge.

Differt a superiori, eo quod maior sit, petala florum cordata gerat, lineas duas longa, fructumque brevem.

GERANIO 16. subiunge.

Petala florum profert trilinearum, lineamque lata, linguaeformia, ex angusto principio sensim dilatata, & in apice rotundata. Calycis folia in brevem arisam abeunt.

GERANIO 18. subiunge.

Flores umbellati sunt, ex incarnato rubentes, petalisque inaequalibus Violae instar praediti. Haec autem florum structura obtinet etiam in Geraniis 17. 19. 20. 21. & 22.

GERANIO 24. subiunge.

Petala florum rhomboidalia sunt, obtuse mucronata, quinque lineas longa, tres lata.

GERANIO 25. subiunge.

Flores petala purpurea gerunt, ferme ovalia, & in extremitate complanata.

GERANIO 26. subiunge.

Est Geranium annuum, foliis coniugatis quinquepartitis, sectionibus altius divisus, floribus rubris, petalis integris, fructu brevi, semine rugoso, &c. Mich. Rar.

GERANIO 27. subiunge.

Annuum est; Coriandri folia profert; flores autem umbellatos, purpureo-laceos, petalis angustis integris, lineas quatuor longis; fructumque triuncialem: ex Mich. Rar.

GERANIO 28. subiunge.

Planta annua est, folia inferiora Sii familia gerens, flores autem umbellatos, purpureocaeruleos, petalis integris: eius quoque varietatem colimus, quae e glandulis in superficie foliorum fitis Balsamum fundit Moschi odorem spirans

spirans; estque Geranium Cicutae folio Moscatum C. B. Pin. 319. Inst. R. H. 268.

GERANIO 29. subiunge.

Annuum est: folia inferiora Pimpinellae similia gerit, lobis acutis, altius dissectis; flores purpureoaceruleos in umbellas longissimo petiolo fultas digestos, petalis integris; fructumque sesquiunciale; ex Mich. Rar.

GERANIO 30. subiunge.

31. *Geranium Batrachioides Bohemicum, capsulis nigris hirsutis H. Eltham. 159. Tab. 133. Florem violaceum parvum profert.*

32. *Geranium Chium vernum, Cariophyllatae folio Coroll. Inst. R. H. 20.*

33. *Geranium Columbinum Carolinum, capsulis nigris hirsutis H. Eltham.*

GEO subiunge.

Est potius Geum rotundifolium maius, foliis ad petiolum magis sinuatis, floribus albis, petalis angustis, punctulis rubris notatis Mich. Rar. e nostris enim Alpibus in Hortum transfudit Michelius, in quibus numquam observavit Geum rotundifolium maius Inst. R. H. quod folia ad petiolum minus excavata profert, & in Germania oritur.

GLAUCIO 1. subiunge.

Petala per basin externe dumtaxat nigro ungue, seu macula notantur, ac circa centrum floris striis pellucidis ornatur.

GLAUCIO 3. subiunge.

Duas huius varietates in Horto colimus, quarum una petala profert exiguo ungue nigro in externa dumtaxat parte notata; altera vero ungibus nigris saturatioribus intus & extra conspicuis.

GLOBULARIAE 2. subiunge.

In fissuris rupium Marmoris Lunensis per Alpes Apuanas lactissime germinat.

3. *Globularia fruticosa semper virens, folio Myrthi tridentato, capitulis globosis, flosculis caeruleis oblongis ad extremitatem tripartitis. Bellis montana fruticosa in Ilva Caesalp. 494. Mich. Rar.*

GLYCYRRHIZAE 2. subiunge.

Flores in spicis, erectis digesti sunt, quatuor lineas longi, vexillo albo tantillo violaceo perfuso, alis & carina prorsus violaceis. Siliquae rubrae sunt, glutino, seu therebintbina quadam scatentes, qua tota plantae superficies illata est. In collibus argillofis Certaldensibus sponte natam observavi; in magna autem copia germinat circa Campiliam oppidum Orae maritimae Volaterranae, quo loci e radicum contusarum decoctione succus inspissatur in usum medicum. Vires potissimas succo isti conciliat Balsamum, seu Therebintbina, qua planta universa scatet.

Pag. 42.

GRAMINUM speciebus praefige.

Graminis has species Michelius distribuit, plerumque iuxta methodum a Vail-

Vallantio sorvatum in Bot. Paris. pag. 80. non vero iuxta eam, quam ipse excogitavit, & in altera parte Novorum Generum Plantarum anecdota fusius exposuit. Quum igitur plura hic immutanda essent, satius fore putavi nihil ex eis attingere, nec crebris adnotationibus Lectori tardium creare.

Pag. 46.

GRAMINI *Dasilo Indico* esculento, &c. subiunge.

Est *Dasylroides Indica* pereennis, spica articulata Ponce. Anthol. 196.

Pag. 47.

GRANADILLAE 1. descriptioni subiunge.

Foliola duo, & eorum sinu capreolos, & folia prodire dixeram, lunata quidem sunt, sed uno latere productiora, & in mollem aculeum abeuntia, ac praeterea in ambitu variusculis dentata. Adde folia non omnia prorsus e sinu foliorum istorum erumpere, sed in quibusdam ramulis nuda, & solitaria prodire. Folia similia sunt foliorum *Clematidis Passionalis pentaphyllae* *Phytanozae*. Tab. 395. Flores autem magnitudine aequant flores *Clematidis Passionalis pentaphyllae* foliis angustioribus *Eiusd.* Tab. 396. nisi quod filamenta albocerulea non totam floris aream occupant, sed dimidiam tantummodo. Petala costulis virentibus externa parte distinguuntur. Acetabuli calycis os triplici, non autem duplici, ut adnotaveram, corolla, seu sepe obvallatur. Illarum extrema constat duplici serie mollium filamentorum lineas novam longorum, in basi atrorubentium, in medio alborum, a medio ad extremitatem usque caeruleorum: interior vero unico, quandoque duobus vel tribus ordinibus filamentorum semilinearium alborum, capitulo crassiusculo ferrugineo, vel nigricante, exiguos clavos aliquatenus repraesentantium: intima tandem unica serie filamentorum ciliis instar, ac dense digestorum, non teretium, sed in basi latiorum, & compressorum, adeo ut ex duobus in unum coaluisse videantur. Ad exortum candida haec sunt, in summitate vero nigropurpureo colora perfusa: semper autem columnae clavos & apices subnatis appressa sunt, eoque pacto abscondunt patinam, quam eadem columna efficit, & e cuius limbo eleganter intorto, ac quandoque rubente prodeunt. Mel quod intra acetabulum patina clausum larga copia stagnat ab Insectis mellivoris tutum, assidue extillat & vasis excretoriis quibusdam per limbi memorati superficiem, & per acetabuli fundum sparsis. Elegantem huiusce floris figuram non ita pridem observavi in Richard Bradley new Improvements of Planting and Gardening, &c. sec. Edition. London. 1718. Part. II. pag. 53. Tab. 2. Passion Flower & fruit.

GRANDILLAE 2. subiunge.

Ramusculi, & pediculi foliorum hirsuti sunt. Fructus uvaeformes, semina sex plerumque rugosa, & calyptra non obvoluta continent.

GROSSULARIAE 2. subiunge.

Folia brevissimis villis pellucidis pubescunt.

GUAIA-

GUAIACANAE subiunge.

Folia semipedem longa, lineas 33. lata sunt, in acumen desinentia, superne saturoviridia, inferne dilutiora.

Pag. 48.
HELIANTHEMO 2. subiunge.

Ex Insulis Venetis An. 1722. Michelius attulit, ab eoque tempore cultum in fictili, iuxta Helianthemum vulgare, constanter diversum ab hoc apparuit, ob caules nonnihil crassiores, validiores, & erectos; ob folia nonnihil hirsuta, quae Ledi, vel Rorismarini folia perbelle referunt, & ob florem, qui non aureus, sed luteus est, & petala profert angustiora ac breviora; stamina item pauciora ac breviora. Tale prorsus est & illud quod Michelius An. 1736. ex iisdem Insulis rursus advexit. Vulgare Helianthemum N. I. descriptum, cui Venetum hoc comparui, in Italia, ac praesertim in Agro Florentino frequentius occurrit: ceterum qualis nam sit vera Chamaecistus vulgaris C. B. Pin. 465. non ita facile decerni potest, quum Baubinus plures Helianthemum diversas species sub eodem capite comprehendat, quemadmodum Michelius observat Rarior. V. H. Eltham. Tab. 145.

HELIANTHEMO 3. subiunge.

Petala florum candida sunt, bilinearia, in summitate nonnihil cordata, circa unguem tantillo aureo infecta. Calyx triphyllus est, stamina autem, & apices lutei sunt.

4. Helianthemum Salicis folio Inst. R. H. 249.

5. Helianthemum Ledi folio Inst. R. H. 249. Flor. exigua est & pallida, petalis sesquilinearibus, ex angusto principio sensim dilatatis. Ex seminibus a D. Dillenio mecum perhumaniter communicatis simul cum superiori crevit An. 1738.

6. Helianthemum Plantaginis folio perenne Inst. R. H. 250. Tuberaria nostras I. B. 2. 12. Tuberaria maior Myconi Eiusd. ibid. Cistus folio Plantaginis C. B. Pin. 465. Chironiae alterum genus Caesalp. 397. Mich. Rur. E Montibus Pisanis attuli An. 1742. in quibus frequens occurrit, ac praesertim in Orientali facie prope dirutam S. Agathae Arcem, & Ecclesiam Sancti Christophori de Lupeta, inter plantas Stoebeadis purpureae; in ipsis nempe locis in quibus D. Rentzius collectam Io. Bauhino communicavit.

7. Helianthemum saxatile perenne, foliis & caule incanis, oblongis, floribus albis Apennini Montis Mentz. Pug. Tab. 8. Inst. R. H. 249. In cacumine Montium Pisanorum, qua parte Butensem Vallem respiciunt inventi An. 1742.

8. Helianthemum perenne, erectum, luteum, prorsus glabrum, foliis Coridos alternis, longioribus, surrectis, & quasi ad caulem contractis. An Helianthemum tenuifolium, glabrum, erectum, luteo flore I. B. 2. 18. Inst. R. H. 249 Chamaecistus Eritae folio, luteus, elatior C. B. Pin. 466. Mich. Rur. In Montibus Pisanis prope Aescianum, ad Fontium Pisanorum originem lacte provenit.

HELLEBORO 1. subiunge.

Folia palmata sunt, ad petiolum sinuata Dracunculi maioris polyphylli instar. Rami floriferi mollissima lanugine pubescunt. Flores quos plurimos gerunt, cerui sunt & globosi, prodeuntque ex alis foliorum singularium, albicantium, mol-

molliorum, in extremitate nonnihil incisurum, ac a primariis plantae aberrantium. Petala quinque sunt ferme trigona, in summitate rotundata, crassiuscula, lineas 7. vel 8. ampla, cochlearis instar excavata, interne viridia, externe dilutiora. Petala inter staminaque observantur rotatim disposita octo circiter nectaria, seu cornicula virescentia, per senectutem nigropurpurea, petiolo brevissimo adnexa, duas cum dimidia lineas longa, unam lata, curva, facie qua stamina respiciunt compressa, adversa vero gibba, ore non scisso, sed tenuissime denticulato, unoque latere excavato. Microscopii auxilio nectaria eadem per longitudinem striata apparent, diaphragmatis, lacunisque pellucidis reticulata, & interne succum melleum continentia. Adde floris effecti limbum colore atrorubente infici, nullumque odorem in eo depræhendi, nisi il- lum toti Plantae communem, qui ad Anagryridem foetidam quodammodo accedit.

HELLEBORO 3. subiunge.

Ad pedalem altitudinem plerumque assurgit, & statim ex ipsa radice emit- tit ramulos, seu caules plures perennantes, qui ad semipedis altitudinem diva- ricantur, uno latere emittentes folia, pauloque superius rursus & tertium di- varicantur. Flores paucos gerit pentapetalos, qui solitarii ex adverso foliorum quinque lobatorum secundae & tertiae divaricationis, eorumque ex alis prodeunt, ac ex bilineari pediculo pendent. Petala crassiuscula sunt, lineas 14. longa, 11. lata, ex rotunditate nonnihil acuminata, seu rhomboidalia, ipsi pediculo non adfixa, sed continuata, proindeque non decidua, ochroleuca, exius dilutiora, intus saturatiora, venis pellucidis per longitudinem distincta, & in margine pallidiora. Stamina viridia sunt, & apicibus pallidis suaviter odoratis Mu- scari instar prædita. Ad Pistilli basin rotatim sita sunt Nectaria 9. vel 10. florum labiatorum familia, trilinearia, petiolo lineari appensa, viridia, in duo labia conniventia ad medium usque scissa, extimo longiore, curva, qua parte semina respiciunt cava, qua vero petala gibbosa: substantia constant cras- siuscula, guttulamque mellis inspidi Olei Olivæ colore in sinu claudunt: brevi item marcescunt, & ante stamina decidunt.

HELLEBORO 5. subiunge.

Folia, ramulosque plures tenellos ex ipsa radice emittit. E summitate horum ramulorum, & e sinu duarum tenuium laminarum prodeunt flores speciosi supra foliorum comam sese attolentes. Petalis hi constant quinque, initio mollissimis, intus albis vel candidis, extus roseis, ferme ovalibus, lineas 10. longis, sex autem latis. Senescente flore petala eadem ampliantur nonnihil, & crassescunt, album roseumque colorem amittunt, ac viridem induunt, nec unquam decidunt. Pistilli basi adnascuntur nectaria 9. vel 10. trilinearia, viridia, brevissimo petiolo adnexa, conica, & incurvata, rarius sulcata, ore, cuius diameter li- nearis est, inaequaliter lacero, & qua parte petala respicit, productiore.

6. Helleborus niger tuberosus Ranunculi folio, flore luteo Inst. R. H. 272. Piè di Gallo vulgo. Flos sex petalis ornatur luteis, lineas 8. longis, duas cum dimidia latis, & ex rotunditate acuminatis. Pistilli basi rotatim adna- scuntur nectaria sex lutea, cyathiformia, ad medium usque in duo labia divi- sa, quorum exterius linguatum & bifurcatum, interius eleganter cordatum est.

HERNIARIAE 2. subiunge.

Folia minutissima sunt.

HESPERIDI 9. subiunge.

Hieracioides (pratensis, annua) vesicaria, Cichorei folio Vaill. in *Act. Acad. R. Sc. An.* 1721. pag. 246. num. 3. *Hieracium Cichoroides vesicarium* *Inft. R. H.* 471.

2. Hieracioides vulgaris (annua, hirsuta, foliis laciniatis) foetida Vaill. *ibid.* pag. 247. num. 5. *Hieracium Amygdalas amaras olens, seu odore Apuli suaverubentis* *Inft. R. H.* 469.

3. Hieracioides minor, annua, Endiviae folio leviter inciso, flore minimo Vaill. *ibid.* pag. 250. num. 26. *Hieracium annuum folis leviter incisis, floribus luteis exiguis, initio pendulis, deinde erectis* Micheli H. *Pif.*

HIERACIO 9. subiunge.

Hanc, cum duobus insequentibus speciebus superius ad Helminthothecae genus revocavi.

HIERACIO 12. subiunge.

13. Hieracium Alpinum pratense, Cichorei folio, hirsutum, & perennans, caule fistuloso, flore aureo, calyce nigricante ventricoso Micheli H. *Pif.*

HIPPOCASTANO subiunge.

Petala circa basin luteis maculis inficiuntur: capropter esse possit Hippocastanum vulgare, flore maculis flavis picto Boerh. *Ind. Alt. H. Lugd. B.* part. 2. 230.

HORMINO 2. subiunge.

3. Horminum Orientale, amplo Bugulae folio, flore dilute caeruleo. A Cl. Leonardo Sesler Medico & Botanico Venetq, in cuius Horto colchatur, accepit Michellius. Planta universa varis villis inficitur. Folia inferiora laciniata sunt, eaque simul cum superioribus colore rubente Bugulae instar inficiuntur. Verticilli florum variis ab invicem distant.

HYACINTHO 1. subiunge.

Hyacinthum hunc Cl. Heisterus Boerhaavium secutus in *Indice Plantarum Horti Helmsladensis* ad Tuberosae genus revocavit.

Pag. 50.

HYDROCOTYLI subiunge.

Hydrocotyle Italica Ranunculi folio, floribus in capitulum sphaericum congestis Micheli H. *Pif.* *Ranunculus aquaticus umbilicato folio* Col. *Part. 1.* 315. *Ranunculus repens, Coryledonis folio* Vaill. in *Act. Acad. R. Sc. An.* 1719. pag. 48. num. 2. Mich. *Rar.* Larga copia germinantem inveni in fovea quae secus radices Montis D. Iuliani a Latoniis Marmoris albi Pisani, Caldaccolin usque protenditur. In foveam hanc influunt aquae Thermarum D. Iuliani, pluresque e fundo ipsius foveae erumpunt aquarum calidarum venae, praesertim versus Caldaccolin, cuius loci nomen corruptum ab antiquo Calidae Aquae suspicari licet. Certum quippe est Latinos Thermas naturales Aquas per autonomaean, vel Calidas Aquas appellare consuevisse, adiecto vel regionis, vel inven-

inventoris, aut instauratoris nomine, ut ab invicem distinguerentur. Pisana-
rum Aquarum mentio fit apud Plinium Hist. Nat. L. 2. cap. 103. his verbis
Patavinorum Aquis calidis herbae virentes innascuntur, Pisanorum Ranae.
Phenomenon tamen hoc, quod memoratu dignum Plinio visum est, in omnibus
Aquis Thermalibus, quas Annis 1742. & 1743. observavi, & quae 60. circi-
ter sunt, obtinet, praeter quam in Lacunis per Agrum Volaterranum sparsis
& horribili fragore ebullientibus. Quinimmo incolis compertum est Ranas in
calidis Aquis viventes, ceteris pinguiiores, & suavioris esse. Nomen autem
Aquarum calidarum Pisanarum aptari non potest Thermis, quae in Collibus
Cascianae sunt, vulgoque appellantur il Bagno a Acqua, eo quod nimium a Pi-
sarum Urbe distent, & ad Volaterranae Coloniae Agrum fortasse antiquitus
pertinerent; nec praeterea antiquorum aedificiorum reliquiae circa eas supersint,
quae magnificae circa Caldaccolin observantur, veluti rudera Aquaeductus,
ut de coeteris taceam.

HYOSCYAMO 3. subiunge.

4. Hyosciamus albus, vulgaris, annuus, latifolius, flore ochroleuco lineis
purpurascentibus reticulatis infecto, semine cinereo. *Hyoscyamus vulgaris*,
vel niger & annuus, semine cinereo H. Pif. Micheli Rar.

HYPERICO 4. subiunge.

Ramosissimum est, floremque parvum pallidum profert. Universa harum spe-
cierum superficies utriculis pellucido Balsamo plenis referta est. Petala floris,
& squamae calycis praeter hosce utriculos, alios habent Balsamo purpureo ple-
nos: sequentis autem speciei flores his carent.

HYPERICO 5. subiunge.

Est Hypericum foetidum frutescens minus H. Eltham. 182. Tab. 151.

HYPERICO 7. subiunge.

Est Hypericum Alpinum, humile, latifolium, non perforatum, caule ro-
tundo duabus appendicibus vix apparentibus armato, flore magno punctato.
Androsæmum Caesalp. H. Sicc. pag. 228. num. 636. Mich. Rar.

HYSSOPO 1. subiunge.

Flores uno versu dispositos; folia autem lata profert. Eius varietatem etiam
colimus, quae folia gerit angusta.

Pag. 51.

IACEAE 1. subiunge.

Flosculos duplicis naturae profert, marginales scilicet in tres angustissimas
lacinias divisos, tuba & vagina destitutos, insidentes semini tribus quatuorve
brevissimis villis in summitate munito. Qui vero centrum floris occupant, in
quinque lacinias divisi sunt, tuba & vagina instructi, insidentque semini prae-
longis villis seu pappis instructo. Thalamus villis confertis obvallatur. Ca-
lycis squamae integrae sunt, & quandoque in aculeum tenuissimum desinunt.

IACEAE 4. subiunge.

Est Iacea montana, lupina, purpurea, incana, & tomentosa, foliis tenui-
ter

ter disse&is, squamarum capitulorum aciebus pennatis, & nigricantibus (semine brevissime coronato) Micheli H. Pis.

IACEAE 7. subiunge.

Hanc & sequentem Vaillantius in *Act. Acad. R. Sc. An. 1718. ad Serratulae genus revocavit.*

IACEAE 11. subiunge.

Flosculos marginales albidos profert, eos vero qui centrum floris occupant, purpureos: semen brevi pappo instructum est. Calycis squamae non striatae, neque pyramidate sunt, sed in extremitate tantillum dilatatae, & nigricantes.

IACEAE 14. subiunge.

Folia tenuiter laciniata sunt; capitula purpurea parva; calycis squamae ad extremitatem acutae, nigricantes, & leviter dentatae; semen tandem brevissimum barbatum. Fortasse est Papaver spumcum Caesalp. 539.

IACEAE 23. subiunge.

24. *Iacea candidissima, laciniata (lobis integris) flore luteo magno Vaill. in Act. Acad. R. Sc. An. 1718. pag. 233. num. 25. Iacea Epidaurica candidissima & tomentosa Inst. R. H. 445.*

Ceterum de his Iaceae speciebus consule inferius adnotata ad Rhaponticoidis, & Rhapontici species.

Pag. 52.

IACOBAEAE 7. subiunge.

Ad Solidaginis Genus revocavit Michellius Rar.

8. *Iacobaea Africana, laciniata, angustifolia, flore purpureo Olden. Inst. R. H. 487. Iacobaea annua Senecionis folio, floribus suaverubentibus Flor. Norimb. 215. Aster Africanus annuus, Senecionis folio H. Amst. 259. Vaill. in Act. Acad. R. Sc. An. 1720. pag. 385 num. 28.*

9. *Iacobaea maritima, sive Cineraria latifolia C. B. Pin. 131. Inst. R. H. 486. Item Iacobaea Graeca maritima, foliis superne virentibus, incanis Coroll. Inst. R. H. 36. Vaill. ibid. 386. num. 40.*

10. *Iacobaea foliis amplioribus incanis Mor. H. R. Blef. Inst. R. Herb. 486. Vaill. ibid.*

IALAPAE 2. subiunge.

3. *Ialapa flore ex albo & purpureo dimidiatim commixtis notato Inst. R. H. 129.*

IASMINO 3. subiunge.

Flores, quos Autumno profert, odorem Lili convallium spirant. Nonnulli ex his fructum perficiunt, baccam nempe viridem cerasiformem, quae per totam hiemem persistit, ac per maturitatem mollis & nigropurpurea fit, clauditque semen unicum, vel duo Coffeae familia. Non autem haec tantummodo Iasmina species apud nos fructus procreat; sed & septima quoque, & octava. Prioris sunt baccae nigropurpureae olivaeformes; posterioris autem baccae nigrae Piperis granorum magnitudine.

IASMINO 6. subiunge.

Est Gelseminum Indicum arborescens semper virens, flore luteo ac suavissime odorato, descriptum a Ferrario, Gasendi in Vita Peiresobis pag. 234. Iasminum semper virens Americanum Munting. Phytogr. 55. Flores odorem florum Genistae linceae aemulantur; eorumque tubus decem lineas longus est, sectiones vero lineas quatuor longae sunt. Notari meretur huius Iasmini varietatem in Horto coli, quae flores prorsus inodoros gerit.

IRIDI 3. subiunge.

Haec vera est Iris Florentina Officinarum, quae in moenibus Urbis nostrae larga satis copia olim germinabat, & fortasse Lilio (Fleur de Lis) albo vetusto Florentiae insigni originem dedit. Modo autem rarior ibidem observatur, & in eius locum succedere species 1. & 2. quarum radices mundatae, & siccatae promiscue usurpantur, & extra Etruriam deferuntur pro Irio, vel Iride Officinarum.

Pag. 53.

IUNCOIDI 3. subiunge.

4. Iuncoides Montanum, nemorosum, villosum, latifolium elatius, capitulis florum candidis & splendentibus Micheli N. P. G. P. I. 42.

IUNIPERO 1. subiunge.

Frugifera est, a Michelio e Collibus Imprunetanis allata. Plurimas ego ex his Iuniperis observavi in Montibus Camporenae, seu S. Vivaldi, & secus viam quae a Salinis Volaterranis Quercetum ducit, ubi ad mediocris arboris altitudinem assurgunt. Individua masculina, seu quae Amentis floriferos tantummodo gerunt, facile a femininis distinguuntur: in ampliorem siquidem, globosamque comam sese spargunt, ramis longioribus, gracilioribus, ac propendentibus; folia item proferunt longiuscula, minus conferta, & molliora. Individua autem feminina caudice crassiore fulciuntur, comamque in conum collectam proferant, constantem ramis validioribus, ternis e quolibet nodo prodeuntibus, & erectis, qui, simul cum ramustulis secundariis brevissimis, vestiuntur foliis rigidioribus, confertis, baccisque plurimis e sinu foliorum prodeuntibus onerantur; tandem Resinam, seu Sandracem e corticis fissuris in magna copia fundunt. Baccarum figura admodum variant, vel enim rotundae sunt, vel compressae, vel ovales: plurimum item variant figura & numero squamarum, seu appendicum, quibus externe ornantur. Veris initio prodeunt, nec nisi anno insequenti ad maturitatem perveniunt, quod & in Sabinae, aliarumque nonnullarum resinifarum arborum fructibus observatur. Dum maturescere incipiunt e viridi in flavum colorem degenerant (ex quo deceptus est Caesalpinus fructum flavum huic Plantae tribuens) ac ultimo prorsus rubrae evadunt, & mollescent. Pulpa ipsarum gustui suavissima est, e dulci, acidulo, ac balsamico odore permixta. In femineum superficiem deprehendi vesiculas oblongas Therebinthina quadam peculiari plenas. Memini tandem Patrem meum optimum An 1737. peculiare Rob, seu Sapam suavissimam Baccarum huius Iuniperi confecisse. Selegit quippe maturiores ac saniores, decoxit in Aqua fontana, pulpam per setaceum transmisit, ac dein lento igne inspissatam in peculiaribus vasis reposuit.

suit. Paucarum hebdomadam spatio massa haec concrevit, Conservae alicuius Officinarum formam assumens, eiusque superficiei accrevit crusta saccharum purum putum referens. Talis Rob eximii usus esse posset in Medicina; suavior siquidem Rob Iuniperi vulgaris est, odore minus acuto, proindeque minus excitulans nervos.

KALI 1. subiunge.

Flores in foliorum alis siti sunt. Calyx constat foliis quinque cucullatis, & calcari in summitate donatis: centrum occupat embryo cepaeformis, stilo bifido munitus, & staminulis quinque stipatus. Semen cochleatum duplici involucri vestitur.

KALI 3. subiunge.

Quamvis species haec maritima semen cochleatum, seu serpentis instar convolutum non proferat; facies tamen Plantae, & forma calycis, inter Kali species annumerari eam sinunt. Flores in alis foliorum nascuntur plures simul iuncti, constantque foliis vel quinque vel sex, tribus scilicet maioribus & acuminatis, tribus vero minoribus & rotundatis, omnibus tamen cucullatis, & trianguli in formam dispositis. In eorum sinu inter 5. stamina iacet embryo ovalis figurae, sacco membranaceo inclusus, qui fructu maturo decidente perforatus apparet qua parte calyci adhaerebat, & ea sola porta exitum permittit semini ferri equini figuram mentienti.

Pag. 54.

KETMIAE 6. subiunge.

Per caulem & petiolos foliorum observantur verrucae minimae, & quarum summitate erumpunt tres quatuorve spinulae, seu villi rigidiusculi, pellucidi, stellae instar, seu radiatim dispositi, qui plantam tactu asperam reddunt. E costis item calycis, seu vesicae, erumpunt verrucae rubentes, quae tribus quatuorve similibus villis, at longioribus, & gracilioribus in summitate ornantur, & quorum centro guttulae liquoris cuiusdam pellucidi erumpunt.

7. Ketmia Syrorum flore albo Boer. Ind. Alt. H. Lugd. Bat. P. 1. 271.

8. Ketmia Aegyptiaca semine moschato Inst. R. H. 100.

9. Ketmia Indica folio hastato, fructu duro Inst. R. H. 100.

LACTUCAE 3. subiunge.

Est Lactuca silvestris Sonchi folio multum laciniato, flore luteo pallecente Mich. Rar.

LACTUCAE 2. subiunge.

5. Lactuca silvestris Italica, costa spinosa, sanguineis maculis adpersa Pan. Bat. Inst. R. H. 413.

Pag. 55.

LAMIO 9. subiunge.

LAMPSANA foliis crispis Petiv. AD. Amman semina accepi. Floris diameter linearis est: flosculi in summitate complanati, & levissime incisus sunt, tubasque virentes habent.

LAPATHO 9. subiunge.

10. Lapathum Chalepense folio acuto, seminum involucris profunde dentatis H. Pis. 93.

11. Lapathum Aegyptium annuum Parietariae folio, capsula seminis longius barbata H. Pis. 93.

Pag. 56.

LAVANDULAE 4. subiunge.

5. Lavandula foliis crenatis Inst. R. H. 198.

LEONTOPEFALO subiunge.

LEONURUS perennis Africanus Sideritidis folio, flore phoeniceo maiore Brein. Prodr. 2. Inst. R. H. 187.

LENTICULAE 2. subiunge.

Flos, seu fructus, quem unum, & una tantum vice observare mihi contigit, die scilicet 20. Februarii An. 1732. inter prima Rei Herbariae tyrocinia, Michelio plaudente, a Lenticulae Genere plantam hanc excludit. Summitati plantae is adhaerebat, & ni male memini, unum ex foliis ipsis erat, sed absolute virens, fructuum Orni, vel Fraxini simile, nempe ad medium usque ventricosum, ac in summitate linguatum & retusum, intus cavum, includensque racemum vesicularum minimarum pellucidarum 5. vel 6. communibus petiolis ap-
pensarum, eo fere pacto, quo Dactyli in Palmae spatha nidulantur. Nusquam alias autem similes seu flores, seu fructus, reperire contigit, licet Michelius egoque avidissime ipsos conquissiverimus.

LENTICULAE 3. subiunge.

Haec quoque a Lenticulae genere excludenda est, & ad novum peculiare revocanda, ob floris fructusque formam a Mappo accuratissime descriptam in Historia Plantarum Alsaticarum pag. 166. Copiose germinantem inveni in ampla fovea Agri Pisani, a Capucinatorum Coenobio eundo Castagnolum.

Pag. 57.

LIGUSTICO subiunge.

2. Ligusticum alpinum multifido longoque folio Inst. R. H. 324. Daucus alpinus multifido longoque folio, umbella candida, qui in Baldo nascitur, si-
ve foliis brevioribus compactioribus C. B. Pin. 150. Daucus Creticus Camer. Epit. Matt. 536. Daucus Creticus verus Eiusd. Hort. Daucus alpinus Cretico similis Park. Theat. 896. Daucus Creticus Caesalp. 286. (non vero Daucus montanum Eiusd. ut credidit C. B. Pin. semen etenim lanuginosum est) an legitimus Daucus Clus. R. Hist. CXXVII. & Daucus Creticus Eiusd. Pann. 700. Mich. Rar. E Monte Baldo attulit Michelius. Caulos, radii umbellae, & se-
mina lanugine incana pubescunt: semina autem lineas tres cum dimidia longa sunt, & in ventre diametrum habent ferme linearem.

Pag.

LIMONIO 1. subiunge.

Flores Autumno profert digestos in spicas, seu radios Heliotropii formae umbellam laxam & amplam constituentes, & in summitate ramulorum supra foliorum comam sese altius attolentes. Numerantur autem 22. circiter flores in unaqualiber spica, & bini ac bini prodeunt e sinu squamarum quarundam minutarum herbacearum, quarum externa brevis, intima longior, florumque unus ante alium. Calycem habent bilinearem membranaceum purpureum petalis dilutiorum, conicum, ore in quinque dentes laceros scissum, & in fundo subhisutum. Petala quinque sunt, lineas quatuor longa, extra calycem subrotunda, cochlearis instar excavata, & in summitate leviter cordata; nec vera ita facile decidunt, sed potius maturescente fructu corrugantur, & intra calycem conglobantur. Praeterea ad exortum, seu qua parte embryoni adhaerent, nectario exiguo & viridi rubente instruuntur. Stamina 5. pariter sunt altitudine petala aequantia, apicibusque bicapsularibus pallidis munita. Embryo in 5. capsulas filamento singulas albo praeditas dividitur.

In Limonii 2. synonymo I. B. pro maius, corrige minus, & subiunge.

Folia in extremitate rotundata profert, non vero acuminata, in quo differt a Limonio maritimo minore Oleae folio G. B. Pin. 192. Parvo Limonia Narbonense Oleae folio Lob. Icon. 295. Limonio minore Oleae folio Barr. Icon. 790. ex Mich. Rar. In Littore Liburnensi inter Urbem Montemque Nigrum abunde provenit, praesertim vero in cavernulis scopulorum prope valedudinarium D. Jacobi.

LIMONIO 3. subiunge.

Caules quandoque foliosos gerit.

LIMONIO 5. subiunge.

Convenit cum descriptione Bocconii Rar. 34. & Ic. 32. 33. Folia crassa sunt, sapore austero praedita. Universa Plantae superficies saccharo propinquum in crustata adparet, seu punctulis quibusdam candidis extuberantibus exasperatur, quae per microscopium massulae chrysellinae sunt sub dentibus stridentes, sapore salso. Iulio exeunte flores e sinu foliorum erumpunt pluribus calycibus muniti: exterius nempe foliolum est brevissimum complicatum; huic insidet foliolum aliud trilineare tubi ad instar complicatum, & ventricosum; crassitie, & duritie folia plantae aequans, ac punctulis iisdem albis variegatam. Huic rursus insidet calyx proprie nuncupandus, conicus, lineas 5. longus, substantia tenuissima pellucida, qua parte e secundo foliolo emergit tantillum rubens, oreque in quinque dentes scisso. E calyce hoc erumpit flos speciosus, monopetalus fig. Q. R. S. Tab. 117. Inst. R. H. similis, lineas 11. longus, infundibuliformis, seu hypocrateriformis, & scissus in quinque lacinas ad extremitatem complanatas ac lineas quatuor longas, duas circiter latas. Initio hic lacte rubet, nec saturatiore utrinque in segmentorum medio apparante, effusus vero ad violaceum colorem vergit. Stamina quinque sunt floris tubo adnata, quorum apices, pulvisculum luteum fundentes vix e tubo egrediuntur. Embryo capillamentis 5. brevibus candidis instructus, ad basin munitur coralla, vel tubo membranaeo striato, constante nectariis 5. seu corpusculis semilinearibus oblongis. melleum succum

succum fundentibus, & in summitate abeuntibus in laciniam, seu linguam linearem albopellucidam tubo floris adnatam. Gallas apud nos numquam protulit; nec mirum, siquidem, uti animadvertit Raius Hist. T. I. 396. proprius huius plantae fetus non sunt, sed Insectorum quorundam nidi, uti Salviae quoque Creticae bacciferae contingit.

6 Limonium peregrinum foliis Asplenii C. B. Pin. 192. Inst. R. H. 342. Flores primo quidem aspectu monopetali apparent; verum pentapetali sunt, petalis angustis in extremitate nonnihil rotundatis, insidentque calycibus elegantibus caeruleis chartilagineis.

7. Limonium minus annuum, bullatis foliis, vel Echioides Bot. Monsp. Inst. R. H. 342. Flores minimi sunt, dilute caerulei, petalis in extremitate complanatis.

8. Limonium maritimum maius, folio longo, angusto, acutoque, costa in apicem seu aculeum inermem prolongata. Ex Insulis Venetis transmisit Michelius.

9. Limonium maius, angustifolium, geniculatum, rigidum, flore maiore caeruleo Zannich. Inst. 164.

LINARIAE 3. subiunge.

Elatior insequenti specie est: folia profert angusta, glauca, in ima caulis parte quaterna. Flores in praelonga spica digesti violacei sunt, labelli inferioris interna parte pilosa, & inodori. Fructus rotundus, exiguus, semen angulosum asperum claudit.

LINARIAE 4. subiunge.

Folia profert Antirrhini, flores inodoros, fructus rotundos, semenque triquetrum & rugosum.

LINGUAE CERVINAE 2. subiunge.

3. Lingua Cervina foliis costae innascentibus Inst. R. H. 545. In faucibus ingentium cuniculorum, antiquitus ad Ferri venam excavandam actorum, prope Stazzemam Pagum Alpium Apuanarum lacte germinantem inveni An. 1743. & in Hortum transtuli.

Pag. 59.

LINO subiunge.

2. Linum silvestre annuum, gracillimum, non asperum, valde ramosum, flosculis luteis ramulorum geniculis quasi immediate adhaerentibus. Linum silvestre flosculis luteis Caesalp. 536. Mich. Cat. Plant. Agri Flor.

3. Linum silvestre annuum, foliis longis, angustis, acutissimis & asperis, floribus exiguis luteis umbellatim compactis Mich. ibid.

4. Linum silvestre angustifolium, floribus dilute purpurascens, vel carnis C. B. Pin. 214. Inst. R. H. 340.

5. Linum sacivum latifolium Africanum, fructu maiori Inst. R. H. 339.

LINARIAE 1. subiunge.

Folia profert Urticae forma, sed ampliora; flores autem violaceos, vel subcaeruleos.

LUNA-

LUNARIAE 2. subiunge.

3. Lunaria Leucoides folio (incano , floribus luteis exiguis in spicam dispositis) siliqua oblonga maiori Inst. R. H. 218.

LUTEOLAE 2. nomen ita corrige.

2. Luteola sativa (atque spontanea) Salicis folio crispo , minor Mich. H. Pis. An Luteola minima Polygalae folio Rasi Syn. Ed. 3. 367. An Luteola Lusitanica pumila crispa Inst. R. H. 424. ? Ex Mich. Rar.

Pag. 60.

LYCHNIDI 1. subiunge.

Variat Flore simplici, & plenissimo, quod & speciebus 2. 6. ac 7 contingit.

LYCHNIDI 6. subiunge.

Aliam habemus flore minore ex albo pallescente.

LYCHNIDI 13. subiunge.

Petala bifida sunt, in extremitate denticulata, duabusque appendicibus circa umbilicum donata.

LYCHNIDI 24. subiunge.

Flos purpurascens est, petalis integris constans.

LYCHNIDI 26. subiunge.

Dantur huius speciei individua, quae flores tantummodo masculinos, seu steriles; alia vero, quae hermaphroditos, seu frugiferos ferunt. Hermaphroditorum calyx viridis est, conicus, in basi laevis, & crassior, superne tardus, & costulatus, ore denticulato. Petala quinque sunt bilinearia, intra calycem alba, & trientem lineae lata, extra calycem vero e luteo virescentia, & dimidio angustiora, reflexa, nullisque appendicibus instructa. Embryo filamentis tribus vel quatuor longiusculis albis munitur. Stamina nulla, ni male memini, extra calycem apparent. Masculini flores e contra calyce angustissimo, seu tubulato constans, petalisque angustioribus; praeterea staminulis albis decem donantur, duplici serie digestis; quinque siquidem interiora sunt petalis duplo longiora, & citius erumpunt; cetera autem quinque exteriora breviora e floris calathio non egrediuntur, apicesque crassiores substinent. Apicum omnium color primum luteus, deinde viridis est.

LYCHNIDI 28. subiunge.

29. Lychnis (annua) segetum rubra, foliis Perfoliatae (petalis florum angustis, pene cordatis, calyce vesicario alato) C. B. Pin. 204. Inst. R. H. 335.

30. Lychnis silvestris noctiflora alba simplex, calyce amplissimo ventricoso & striato D. Micheli H. Pis.

31. Lychnis Coronaria Dioscoridis sativa, floribus albis, lineis vel punctis rubris variegatis C. B. Pin. 203. Boerh. Ind. Alt. H. Lugd. Bat. part. 1. 210.

LYSIMACHIAE 1. subiunge.

Huius speciei flos lineas decem latus est; insequentis vero sex, vel 7. tantummodo.

LYSIMACHIAE 4. subiunge.

Flos totus luteus est, lineas 13. in diametro habens, sectionibus lineas tres latis, ac minus quam in insequenti specie acuminatis.

LYSIMACHIAE 5. subiunge.

Flos lineas 11. in diametro habet, eiusque sectiones lineas 2. cum dimidia latae sunt.

LYSIMACHIAE 6. subiunge.

Flores in cauliculorum summitate spicati digesti sunt, carnei, bilineares, Cynoglossae potius quam Lysimachiae florum figuram aemulantes, nempe infundibuliformes, vel hypocrateriformes quinquefariam scissi, sectionibus sesquilineam longis, ex angusto principio sensim dilatatis, ac in extremitate complatis. Stamina quinque sunt concoloria, tubo breviora, singulis sectionibus adnata, pulverem album ex apicibus fundentia.

LYSIMACHIAE 7. subiunge.

MAIORANA hortensis incana, & veluti sericea, valde odorata, foliis subrotundis non dentatis, floribus albis, capitulis oblongis compactis, squamis rotundis. *Maiorana Gentile Matib. 766. Mich. Advers.*

2. *Maiorana hortensis minus incana, & minus odora, foliis oblongis pediculis insidentibus, capitulis ferme uncialibus Eiusd.*

MALVAE 2. subiunge.

Fructus nonnihil rugosus est, & subbirsutus.

MALVAE 6. subiunge.

Est Althaea frutescens Lusitanica, folio rotundiori undulato Boerh. Ind. Alt. H. Lugd. Bat. part. 1. 269. Plantae superficies universa, nudo oculo, tomentosa apparet, tactui vero aspera; praeterea manus lentore quodam moschum olente inficit. Si autem microscopio examines, comperies superficiem universam excepta floris corolla, conspersam esse stellulis minimis crystallinis, villisque solitariis stellarum intervalia occupantibus. Stellulae constant cylindro, seu columella brevissima, quae in summitate sex vel septem rigidis villis pellucidis rosatim dispositis coronatur. In eadem summitate columellae, seu mavis in centro ipsorum radiorum stellulae sita est Glandula minima, e qua die 16. Iulii horis matutinis extillare guttatim vidi humorem pellucidum quemdam, ac lentum, ea copia ut manus & vestes madefaceret, plantaeque superficies veluti rore conspersa appareret. Liquor iste Moschum cum Zibetho permixtum olet, adeoque gravis est, ut si prope plantam a Sole meridiano excalescentem tantillum consistas, caput laedi sentias. Observavi praeterea hac illac sparsas per plantae superficiem massulas quasdam cereas, sulphureas vel lutescentes, & moschum

scum pariter olentes. Eas autem nil aliud esse suspicor, quam liquidi superius descripti partes terreas ac crassiores, quae Solis vi aquearum & tenuiorum partium consortio orbatae in talem resnam concreverint. Flores terni, vel quaterni petiolis lineas 14. longis fultæ, prodeunt ex alis foliolorum duorum acutorum, duplicique calyce muniuntur, quorum uterque sensim ampliatur. Exterior calyx interiore minor trifariam sectus est, sectionibus ex rotunditate acuminatis, lineas novem longis, octo autem latis; ast interior, & amplior quinquefariam ad medium usque scissus est in acutas lacinias unciales. Florum sectiones unciales pariter sunt, in summitate complanatae, & trifariam cordatae, purpurascens vel roseae, nervis rubris per longitudinem excurrentibus, & circa umbilicum numerosis villis pellucidis obvallantur. Stamina purpurascens ad originem coalita corymbum elegantissimum formant, ramusculis seu pedunculis bilinearibus subistentia apices albos reniformes inodoros. Apicum autem istorum structura per microscopium talis apparet. Superficie laevi nitente constant, lineaque alba per dorsum longitudinem notantur: iuxta lineam banc debescunt; tuncque volva, seu tunica ipsorum apicum elateris vi repanditur, ac multifariam corrugata in conspectum praebet plurimos exilissimos globulos crystallinos, qui pedunculi tenuissimi opæ eidem membranae seu tunicae adnectuntur; brevi dein tempore, arescente pedunculo, decidunt inter villas pistilli basin obvallantes. His delapsis volvae apicum exarescunt, vestigiaque ostendunt cellularum quibus globuli ipsi clauderantur. Globuli autem duriusculi sunt, & diffracti guttulam fundunt liquoris pellucidi, utriculi tunica seu acino vacuo remanente. Embryo abest in semina 15 vel 17. reniformia, nigra, munita membrana cinerea elastica, qua divulsa profiliunt. Superficii seminum & Thalami, margini item calycum villi simplices teretesque innascuntur, e quorum summitate guttulae liquoris pariter odorati extillant. Apices Kerimiae Sincensis fructu subrotundo, flore pleno Inst. R. H. 100. hisce similes sunt, sed maiores.

MALVAE 8. subiunge.

Apicum seu testiculorum pulvisculus per microscopium nil aliud apparet esse, quam globuli crystallini, albicantes, muricati quorundam Lycoperdis specierum ad instar.

Pag. 62.

MALVAE 23. subiunge.

Planta perennis est, caule procero fungoso in arbusculam sese attollens. Folia habent ampla mollissimis villis holoferici instar vestita. Inter hos autem observantur verrucae minimae tribus birtis villis in summitate instructae, nec ullum liquorem fundentes. Floris calyx interior quinquefidus est; exterior vero trifidus. Floris purpurascens sectiones lineas 9. longae sunt, sex autem latae, & in extremitate cordatae. Plures ex his Malvae speciebus Boerhaavius alique ad Altheae genus revocarunt.

De MALVIDA vide adnotata superius ad Abutilon.

MANDRAGORAE 1. subiunge.

Folia atrovirentia sunt, costis albicantibus. Fructus sphaeroides in diametro perpendiculari lineas 14. in horizontali vero sesquunciam habens, intus & extra aureus est, pulpa mollissima, odore tamen adeo gravi & viroso, ut caput laedat.

laedat. Folia floresque v. terra erumpunt Mense Martio vel Aprilis; fructus nam ad maturitatem perveniunt exeunte Iunio.

MANDRAGORAE 3. subiunge.

Fructus aureus est. An Mandragora flore subcaeruleo, foliis undulatis non asperis, fructu ovato Boerb. Ind. Alt. Hort. Lugd. Bat. Part. 1. 270. Mandragora femina flore caeruleo Barr. Obs. 1. Icon. 24. Mandragora foliis asperis, fructu parvo ovato & acuminato, floribus violaceis Coroll. Inst. R. H. 1. ex Mich. Rar.

MANDRAGORAE 4. subiunge.

Fructus ovalis est, in maiori diametro decem, in minori sex lineas habens, coloris buxus, odore gravi & viroso. Calyx in quinque acutas lacinias ad medium usque divisus fructum fere dimidium vestit. Novembri Mense incutit folia, & flores e terra erumpunt; flores autem novi subinde semper ad Martiū usque initium pullulant: fructus Iunio Mense maturitatem adsequuntur, quo tempore folia pereunt. Antiqua huius, & Pisani Horti planta est, ut adnotavit Mischelinus Rar. qui eandem esse suspicabatur cum Mandragora foliis asperis, fructu parvo ovato & acuminato, floribus subalbidis Coroll. Inst. R. H. 1.

Pag. 63.

MARRUBIO 2. subiunge.

Flor candidus est, tubo tres lineas longo, lineam lato; labio superiori erecto, bifido, lineas tres longo, sesquilineam lato; inferiori vero trifido, lineas duas longo. Stamina virascunt, & e tubo floris non egrediuntur: apicum palvisculus aureus est. Calycis os in quinque tantum segmenta acuminata divisum est, non vero in 10. vel 12. quod Marrubio albo vulgari contingit.

MARRUBIO 3. subiunge.

Planta tota hirsuta est. Radice nititur capillari, ramosque tripedales emittit graciles & humi procumbentes, folia Melissae similia, serrata, rugosa, lineas 15. longa, 12. lata. E verticillis foliosis prodeunt flores, quorum tubus lineas 3. longus est; labium superius quatuor lineas longum, album, & bifidum sectionibus intortis; inferius vero tres cum dimidia lineas longum, tripartitum, sectione intermedia ampliore, cordata, in fine lutescente, supra medium alba, & punctulis purpureis variegata. Stamina quatuor sunt, rubra, apices rubentes subfimentia. Calyx concitus patulus, ore in quinque aculeos albos desinente, semina quatuor nigra & lacvia fovet: Marrublastri Generi potius adscribendum est.

MATRICARIAE 3. subiunge.

4. Matricaria hortensis flore simplici prorsus albo. Mich. Adv. Semisflosculi coroneales (qui 10. vel 12. sunt) flosculi item discoides prorsus albi sunt.

MEDICAE subiunge.

2. Medica maritima Lob. Icon. 38. Inst. R. H. 410. In Littore Liburnensi, & in ipsi moenibus Urbis Pisarum inter Aqueductus Castellam, & Portam abbe Piagge dictam inveni.

MEDI-

MEDICAGINI 2. *subiunge.*

Est Medicago silvestris floribus croceis Inst. R. H. 410.

MELILOTO 7. *subiunge.*

Est Medicago perennis humifusa trifoliata, floribus luteis perexiguis in capitulum congestis, filiquis minimis nigricantibus rugosis & monospermis Mich. Rar.

Pag. 64.

MELISSAE 5. *subiunge.*

Flos semuncialis est, purpureus, extus saturatior, interne dilutior, & lineis saturatioribus distinctus. Os in quatuor partes scissum est, quarum superior & inferior cordatae sunt, laterales vero alatae.

Pag. 65.

MILLEFOLIO 3. *subiunge.*

Ad Achilleae genus revocavit Michelius Rar. appellavitque Achillaea Alpina maxima Millefolii folio, pinnulis latiusculis eleganter incis, floribus albis.

MILLEFOLIO 4. *subiunge.*

In Bocconii nomine pro maritimum scribe montanum. Hoc pariter ad Achilleam revocavit Mich. nampe Achillaea Absinthii Pontici folio, subhirsuta, floribus albis.

MIMOSAE *subiunge.*

Huius descriptionem accuratissimam vide sis in Zanonii Historia Rariorum Stirpium a Cl. Caietano Montio digesta, & locupletata pag. 162. cui pauca haec subiungere liceat, quae in commentaria retuli An. 1739.

Folia non expanduntur nisi quando a Sole irradiansunt; eo enim occidente, vel nubibus obvelato, statim clauduntur. Petiolis ipsorum foliorum adhaeret glandula acetabuliformis, oblonga, rubra, liquidum quoddam pellucidum aestivo tempore fundens, quod Formicae avidae exsugunt, & quo propemodum inebriantur, adeo ut immotae diu maneant, ac veluti confopitae. Flor non monopetalus est, sed rotatus, vel potius caryophyllaeus: calycem habet campaniformem, margine in quinque dentes diviso, Punicae calycis instar. Haec insident petala quinque, figura ad folia Plantaginellae Mentzelii accedentia, & ad basin invicem coalita, quemadmodum in Caryophylli hortensis floribus accidit. In sinu horum petalorum sita sunt decem praelonga stamina, e quorum medio surgit pistillus in siliquam abiens.

MOLDAVICA Betonicae folio, flore caeruleo Inst. R. H. 184.

2. Moldavica Orientalis Betonicae folio, flore magno albedo Coroll. Inst. R. H. 11.

3. Moldavica Betonicae folio, floribus minimis pallide caeruleis Amman. Rar. 46.

4. Moldavica Orientalis Salicis folio, flore parvo purpureo Inst. R. H. 11.
5. Moldavica minor canescens, Chamaedryos folio Amman. Rar. 48.

MOLUCCA spinosa Dod. Pempt. 92. Inst. R. H. 187.

MOMORDICAE 2. subiunge.

MORSUS RANAE foliis circinatis, floribus albis Tournef. in Aët. Acad. R. Sc. An. 1705. pag. 512. Tab. 4. fig. 1. *Nymphaea alba minima* C. B. Pin. 193. *Nymphaea minor*, five *Morsus Ranae* I. B. 3. 773. *Morsus Ranae* Dod. Pempt. 583. *Microleuconymphaea* Boerb. Ind. Alt. H. Lugd. Bat. part. 1. 282. In palustribus Agri Pisani, & Lucensis frequens.

MUSCARI 2. subiunge.

Est *Hyacinthus comosus* albus cum staminibus caeruleis I. B. 2. 584. Bulbi fibrosi, alterum genus Caesalp. 402. ex Mich. Rar.

Pag. 66.

MYRRHIDI 2. subiunge.

Caulis villosus est, maculatus, & ad genicula ventricosus.

NARCISSO 9. subiunge.

Est *Narcissus* alter copioso flore Caesalp. 417. Mich. Rar. Flos ex albo pallescit. Molestia plerumque copia Agros circa Pisarum Urbem infestat, praesertim Portam Lucensem inter, & Gattensem alle Piagge nuncupatam. Odor florum admodum gravis est, ut caput laedet: propterea vulgus Giracapo nomen Plantae huic tribuit, quasi vertigines excitare potis sit.

Pag. 67.

NICOTIANAE 3. subiunge.

4. *Nicotiana* minor foliis amplioribus, rugosioribus Boerb. Ind. Alt. H. Lugd. Bat. part. 1. 230. Floris tubus lineas 8. longus est, tres cum dimidia latus; sectionibus sesquilineam longis & viridi lutescentibus. Embryo ad basin minimè calata inficitur. Huius & superiorum specierum universa superficies villis mollissimis pellucidis obvallatur, quae vase excretoria sunt, & e summitate fundunt Resinam, seu Balsamum quod folia viridia unctuosae efficit, sicis autem odorem coarctat, & pituitariam membranam irritat: hoc item Chimica artefacto secretum veneficis vires assumit.

NIGELLAE 3. subiunge.

An *Melanthium*. *Dracontium* flore pleno Eyß. acß. O. 2. f. 10. Folia profert *Foeniculacea*; floremque multiplici petalorum serie ornatum, quae rhomboidalia ferme sunt, candida, plerumque in summitate laciniata, & caeruleo colore distincta.

NYMPHAEAE subiunge.

In Paludibus Blentianis sponte provenit; in Lacum autem Horti nostri translata lactissime germinat, & flores multos venustissimos Tulipaeformes profert.
2. Nym-

2. *Nymphaea lutea* maior C. B. Pin. 193. Inst. R. H. 261. Boerh. Ind. Alc. H. Lugd. Bat. part. 1. 281. In paludibus Ficeclensibus ac Blentinsibus abunde provenit, inque Lacu Horti nostri simul cum superiori germinat, sed flores nondum protulit; eos tamen ex ipsis Paludibus Blentinsibus obtinui, & in Museo Cl. Antonii Cocchii Praeceptoris Amicique summopere colendi examinavi. Folia quinque exteriora ovata, & in summitate nonnihil cordata, calycis vicem praestantia, colore aureo primum fulgent, maturescens autem fructu ampliantur, crassescunt, & e lutea virescunt. Fructus ficiformis minus turbinatus est quam Tab. 128. Inst. R. H. repraesentat. Eius cortex multifariam & irregulariter scinditur, ac in frusta per aquam dispergitur, adeo ut vinculis soluta pulpa, in 10. vel 12. segmenta peculiari membrana alba inclusa, loculamentorum Mali Aurantii similia, dividatur, & aquae innatet. Plena haec sunt mucos quodam insipido nullis versiculis, cum in Mala Limonia, incluso, quod saponis vicem praestare posset in ablucendis pannis, & Oleo Olivarum facile admiscetur. Semina tali mucos immersa, Tritici granorum acmula, pulpa claudunt Anguriae seminum saporem referentem.

NYMPHOIDI subiunge.

Foliorum superficies inferior vesiculis aere plenis contexta est, quarum auxilia aquae innatare possunt.

Pag. 68.

OLEAE subiunge.

Folia utrinque acuminata sunt, lineas 30. longa, quinque cum dimidia lata. Fructus octo ferme lineas longus est, quatuor vero in diametro habet, intectus, niger, pulpa tenui aridiuscula, & succo oleoso ferme destituta.

Duas alias Oleae silvestris, sive spontaneae species in Hortum transtuli, repperas Ann. 1742. in Montibus Pisanis, praesertim prope Agnanum: sunt autem.

2. Olea silvestris, an minimo racemato fructu coracino H. Cathol. 155.?

3. Olea silvestris fructu racemoso grani Piperis magnitudine & forma Mich. Cat. Plant. Agri Flor.

OMPHALODES Lusitanica Lini folio Inst. R. H. 140.

ONAGRAE 3. subiunge.

4. Onagra Bonatiensis villosa, flore mutabili H. Ekham 297. fig. 186.

ONOBRYCHIDI subiunge.

2. Onobrychis Florentina perennis elatior & erectior, foliis Vilcae, flore rubello stris saturationibus distincto, fructu compresso aculeato & vix exstato Micheli H. Pis.

ONOPORDO 1. subiunge.

Flosculos unius omnes formae profert, nempe hermaphroditos, tuba non bifida, & vagina instructos. Semina papposa sunt, insidensia Thalamo cellulato favi instar. Calyx constat squamis simplicibus validisque.

ONOPORDO 2. subiunge.

3. Onopordon spinosissimum incanum longius radicatum, foliis angustis usque ad costam in acutas lacinias assidue divisus, caule praealto decem crispatis & angustis alis aucto, flore purpureo viscoso odore, calyce Cinarae. *An Ritro, o Ritro Ang. 142. Polyacantha Theophrasti Tabern. Icon. 701. Mich. Rar. squamae calycis amethystinae sunt.*

OPULO 2. subiunge.

In petiolis foliorum observavi appendices duas longas claviformes, & octo vel novem glandulas acetabuliformes, e quibus incunte Aestate liquor pellucidus extillat.

OPUNTIAE 3. subiunge.

Humifusa, seu pendula est, foliis seu ramis oblongis, compressis, spinisque raris & longis exasperatis. Flos luteus est, monopetalus, Malvae instar ad centrum usque scissus, & totus simul decidens. Fructus ruber vinoso viscosoque succo turgel. Quamvis autem exotica planta sit, aeri nostro adeo assuevit, ut sponte oriatur variis in locis, praesertim in Collibus Imprunetae. Figura Ficus Indicae Matth. 311. Plantae huic aptari posset, nisi quod erecta exprimitur. De duabus superioribus Opuntiae speciebus. V. H. Elsbam. pag. 397. Tab. 295.

OREOSELINO 2. subiunge.

Est Sefeli Creticum in maritimis, & Collibus arenosis Caesalp. 295. Semina gerit quasi circinata ex Mich. Rar.

OREOSELINO 3. subiunge.

Est Sefeli Peloponense alterum Caesalp. H. sic. pag. 39. num. 98. Sefeli Creticum alterum in montibus, pluribus ab una radice caulibus Eiusd. in Op. 295. Mich. Rar.

ORNITHOGALO 4. subiunge.

Petala lineas 4. longa sunt, unam lata.

ORNITHOGALO 5. subiunge.

Folia bina e radice exeunt ferme palmaria, sesquilineam lata, & canaliculata, Amygdalarum sapore. Caulis inter haec erumpens Mense Februario, palmaris, rubens, in summitate folia duo gerit, quorum unum minus, lineas duas latum, ex adverso maioris quinque lineas lati prodit. E sinu istorum foliorum surgunt petioli duo nonnihil compressa, quorum unum altero longius, biunciale nempe, sustinentia flores quinque vel sex umbellatim dispositos, constantes petalis sex acuminatis, externe viridibus, interne e viridi lutescentibus, lineas septem longis, ac sesquilineam latis. Pistillus trigonus, glaber, tuba

tuba hirsuta munitur, staminibusque sex luteis stipatur. Folia superiora, petiolo florum, ac pars petalorum inferior, praeterquam in margine, alba mollique lanugine pubescunt.

OSMUNDAE subiunge.

Flores, quemadmodum Michelius in Adversariis adnotavit, ad calcem ramulorum fructus subsistentium rotati nascuntur. Sunt autem filamenta ramosa, fistulosa, & nodosa Conseruae instar, nodis rubris, interodiis vero albis. Copiose germinantem, & ad humanam ferme staturam elatam inveni circa vetustas Vitrioli fodinas prope Stazzemam, focus torrentem il Canale delle Mulina dictum.

OXYDIS 2. nomen ita corrigendum.

Oxys lutea erecta, seu capillifera, nostras, &c. V. H. Eltham. Tab. 221.

Planta annua est, & radice nititur capillari. Caulis unicus hirsutus, ad exortum rubens, superne viridis, ad sesquipedis altitudinem assurgit. Ex eius nodis inferioribus folia solitaria, e superioribus vero terna prodeunt simul cum petiolo flores subsistente. Folia Oxidis vulgaris similia sunt, nempe trilobata, cordata, & reflexa, margine & costis pilosis, petiolo item piloso, sensimque angustato. Petiolo flores subsistentia triuncialia sunt, in summitate trifariam divisa, adeo ut ramulus intermedius florem unum subsineat, laterales autem binos. Calyx florum sesquilinearis in quinque foliola acuminata ad centrum usque scinditur. Petalum campaniforme, patens, luteum est, interne saturatus, & splendens, lineas duas cum dimidia altum, ore in sectiones quinque oblique cordatas, & convolutas diviso: adnectitur autem fundo calycis ope unguum quinque. Stamina duplici serie distribuuntur; quinque enim exteriora linearia, quinque vero interiora & ex adverso sita sesquilinearia sunt. Embryo tubis quinque instruitur, & punctulis rubris circa basin ornatur: ab ita autem per maturitatem in siliquas quinquangulares nonnihil incurvas, villis horizontaliter sitis indutas, lineam ferme in diametro habentes, sexque lineas altas. Semina rubentia & rugosa, calyptra crassiuscula alba elastica muniuntur. Sapor totius Plantae valde acidus est.

Pag. 71.

PAEONIAE 1. subiunge.

Est Paeonia mas flore purpureo Eyst. vern. O. 6. f. 10. Folia superne atro-viridia, & splendentia sunt, lobis amplioribus inferne pubescentibus. Flores purpurei sunt, ampli, benneapetali. Ex Mich. Rar.

PAEONIAE 2. subiunge.

Foliorum lobi angustiores sunt, & nonnihil incis: Flores autem minores quam superioris, rubri, & octapetali.

PAEONIAE 3. subiunge.

Est Paeonia polyanthos flore rubra Eyst. Vern. O. 6. f. 8.

PALMAE 2. subiunge.

Est Chamaeriphes tricarpos, spinosa, folio flabelliformi, Ponted. Anthol. 147. Per Montem Argentarium, & in Insulis Maris Tyrrheni, seu Urgone, Platanusa,

naſia, *Igilio*, & *Monte Chriſti* ſponte naſcitur. In *Horto noſtro* ſpatbas floriferas tres vel quatuor ſingulis annis profert verno tempore, quales a *Cl. Pontaderio* deſcribuntur. *Spadicem* autem, ſeu racemum fructuum obſervare ſemel contingit inter *Maris repurgamenta* collectum, qui figura ad *Viſis Botrum* quodadmodo accedebat, proindeque *Uva Marina* a poſſeſſore nuncupabatur. *Spadix* erat colore buxco, compreſſus, validus, fibris, longitudinalibus conſtans, in ramos plures diviſus, quorum ſummitati adhaerebant fructus e rotunditate acuminati, fructuum *Lauroceraſi* *Tbal. Tab. XIII.* aemuli, duri, laeves, nigri. In baſi muniebantur tribus cartilaginibus brevibus obtuſis, quae, ni fallor, calyx floris fuerant.

PANICO 2. ſubiunge.

PAPAVER hortenſe ſemine albo, ſativum *Dioſcoridis*, album *Plinio C. B. Pin. 170. Inſt. R. H. 237.* Papaver album *Offic.*

2. Papaver hortenſe nigro ſemine, ſilveſtre *Dioſcoridi*, nigrum *Plinio C. B. Pin. 170. Inſt. R. H. 237.* Papaver nigrum *Offic.*

PARNASSIAE ſubiunge.

PARONYCHIA *Hiſpanica Cluſ. Hiſp. 478. Inſt. R. H. 507.* Calyx linearis eſt, monophyllos, quinqueſariam ad centrum uſque diviſus, ſectionibus oblongis in extremitate cucullatis, gibbo in aculeum abeunte, extus hirsutis & viridibus, in margine & intus albis. Stamina quinque breviffima, alba, apices aureos ſubſtinent.

PASTINACAE ſubiungo.

PEDICULARIS *Alpida altera, Aſphodeli radice Inſt. R. H. 173.*

Pag. 72.

PERIPLOCAE 3. ſubiunge.

Calyx floris quinquefidus, & viridis eſt. Flos rotatus in quinque partes ad centrum uſque dividitur, utrinque e luteo virescentes, ſuperne autem lineis tribus purpureis ad umbilicum diſtinctas. Nectarium dentibus quinque acuminatis coronatum, album eſt, ac deſillat ſuccum quemdam lentum, cui pedibus implicatas, & veluti conſopitas haerere obſervavi innumeras exiguas Muſcas ex *ανδροπών* bipennium non faviſcantium claſſe, unam plerumque in quolibet flore. Haud aliter *Cornutus* aſſerit florem *Apocyni ſui maioris Syriaci* recti lentore quodam extrinſecus obduci, quo fiat ut pedibus implicatae Muſcae haereant, quae & odoris, & ſaporis gratia alleſtae frequenter advolant. Tale quidem *Apocynum* fournit un ſuc dont on fait du ſucre en Canada: on ramaiſſe la roſée qui ſe trouve dans le fond des fleurs, quemadmodum legitur in *Memo-rabilibus Academiae Regiae Sc. An. 1730. pag. 90.* Ita quoque *Mel Aſclepiadis Creticae ſuae Muſcis pernicioſum eſſe deprebendit Cluſus Rar. CCLV.* quandoquidem illas floribus inſidentes enecatas repperit. Tandem florum quorundam *Mel Apibus* noxium eſſe ſatis conſtat.

PERVINCAE. 2. ſubiunge.

Eſt *Herba Vinca in Etruria Marcelli Virgilii in Dioſcoridem L. 4. cap. 140.* an *Pervinca Orientalis, villoſa, flore magno violaceo Coroll. Inſt. R. H. Mich. Rar.*

Pag.

Pag. 73.

PHALANGIO subiunge.

Petala florum lactea sunt, striis pellucidis distincta: tria tamen exteriora ceteris angustiora sunt.

2. Phalangium alpinum palustre, Iridis folio Inst. R. H. 368.

PHASEOLO subiunge.

2. Phaseolus puniceo flore Corn. 184. Boerh. Ind. Alt. H. Lugd. Bat. part. 2. 28.

3. Phaseolus Aegyptiacus nigro semine C. B. Pin. 341. Inst. R. H. 414. *Siliquae chartilagineae, ventricosae, buxuae, & semina nigra bilo amplo nivo praedita, figurae Phaseoli peregrini XIV. Leblab Clusii Rar. CCXXII. respondent: Planta tamen aborea non est, sed herbacea, & sarmentosa, Phaseoli hortensis in morem. Ad topiaria opera floribus elegantissimis sese commendat; qui Pisi, vel Latbyri flores magnitudine aequant, inque specieis erectis dispositi sunt. Duas huius Plantae varietates in Horto colimus, quarum una flores niveos, altera purpureos, aliis tamen saturatioribus gerit.*

PELLANDRIO subiunge.

Est Phellandrium palustre, tenuifolium, caule crasso, assidue ramoso, & ad nodos veluti umbellifero, umbellis parvis albis nudis, &c. Mich. Rar. Epaludibus Blentnenfibus rursus attuli.

PHLOMIDI 3. subiunge.

Folia ceteris minora sunt, rugosiora, ad basin complanata, vel tantillum acuminata. Flos superioribus minor est, calyculorum angulis quodammodo barbatis.

PHYTOLACCAE subiunge.

Floris corolla, seu calyx persistens, & fructum maturentem amplectens, uno tantummodo, non autem quinque foliolis constat: scinditur enim in quinque partes, quae petala aliis, aliis Calycis sectiones visae sunt. Quamvis exotica Planta sit, aeri tamen nostro ita assuevit, ut in plerisque locis sponte proveniat, praesertim in saliculis Arni fluvii.

2. Pytolacca Mexicana baccis sessilibus H. Eltham.

PILOSELLAE 2. subiunge.

Repens est.

Pag. 74.

PIMPINELLAE 8. subiunge.

9. Pimpinella Canadensis spica longa rubente H. R. Par. Inst. R. H. 157.

PINO 2. subiunge.

Est potius Pinus silvestris, montana, & maritima, procerior, foliis palmatis, crassis, peramaris, fructu angusto, pyramidato, spithamam longo, deorsum

sum reflexo, cum squamis elevatis & cuspidatis. *Pinus maritima* altera Matth. Ic. 112. I. B. 1. 258. *Pinus maritima* II. Tabern. Icon. 937. Lugd. 45. *Pinus silvestris* in maritimis Senensibus, fructu palmari pyramidato firmiter adhaerente Matth. Descr. 115. num. 20. & 30. *Pinus silvestris maritima* conis firmiter ramis adhaerentibus I. B. 1. 257. sed Descr. *Pinaster* I. Caesalp. 130. Figura quam Matthiolus exhibet omnium optima est. Mich. Rar. In Montibus Pisanis abunde provenit.

PINO 3. subiunge.

Ex Alpibus Latobricis attulit Michelius.

4. *Pinus sativa* fructu pyramidato acuto, squamis protensis acutioribus, officulis fragilibus, & veluti deustis, calyptra seminum albicante. *Pinus Tarentina* Plinii Libr. 15. cap. 10. Mich. Rar. Pino Siacciamane vulgo.

PLUMBAGINI subiunge.

Caulium & calycularum superficies vasculis excretoriis villiformibus vestitur; e quorum summitate extillat liquor quidam lentus. Dum ramulos huius Plantae scelerorum conficiendorum gratia exsiccarem, observavi eos chartam rubro colore infecisse. Varietatem tandem colimus flore dilutiore, eamque in paludibus Liburnensibus secus Stagni Pontis & Cauponam magna in copia repperi.

Pag. 75.

POLIO 2. subiunge.

Folia latiuscula profert a medio ad summum serrata. Est Hyssopus Apulus Dioscoridis, & Serapionis Col. part. 1. 67. Polium montanum ramulis dodranzalibus humi sparsis, foliis oblongis, angustis, leviter circum denticulatis, molli lanugine hirsutis, flosculis candidis Caesalp. 457. Polium montanum Eiusd. in H. Sic. pag. 129. num. 345. an Polium montanum album serratum latifolium erectum maius Barr. Obs. 34. num. 325. Icon. 1079. an & Polium montanum album serratum latifolium supinum maius Eiusd. 326. Icon. 1074. ? Mich. Rar.

POLIO 3. subiunge.

Folia angustiora quam superioris sunt.

POLYACANTHAE 1. subiunge.

Speciem hanc Michelius Rar. ita descripsit. Polyacantha maior annua, foliis Acanthi venis lacteis notatis, capitulis purpureis pluribus simul iunctis. An Carduus leucographis purpureus, capitulis acutissimis, ac ferocissimis spinis eminentibus subcircumdatis. H. Cathol. An Polyacantha maior lanceolato folio, flore purpureo Vaill. in Act. Acad. R. Sc. An. 1718. pag. 199. num. 5. ? Eandem quoque habemus flore albo Mich. Rar.

POLYGONATO 1. subiunge.

Est Polygonatum maius, caule anguloso crassiore & minus procero, foliis amplioribus subrotundis, floribus albis maioribus, odoris, in perbrevis pediculo binis plerumque enascentibus. Mich. Rar. Fructus rotundus est, lineas quinque in diametro habens.

POLY.

POLYGONATO 3. subiunge.

Fructus pyriformis est, lineas 4. longus.

POLYPODIO 3. subiunge.

Est Polypodium maius, pinnulis longis ad oras undulatis & serratis. Polypodium maius serrato folio Barr. Obs. 116. num. 1264. Icon. 38. Mich. Rar.

POLYPODIO 5. subiunge.

POLYPODIOIDES vulgaris, foliis angustis partim ad terram reclinatis & sterilibus, partim erectis & seminiferis. *Polypodium angustifolium folio vario Inst. R. H. 540. Lonchitis minor C. B. Pin. 359. Lonchitis altera folio Polypodii I. B. 3. 744. Lonchitis aspera Dod. Pempt. 469. Mich. Rar. A Polypodii speciebus, inter quas n. 5. In hoc Catalogo relatum fuerat, seunxit Michelius, & ad novum genus revocavit, eo quod in ramulis, seu foliis frugiferis pinnularum pars inferior unica seminali capsula oneretur. In Montibus Pisanis, ac praesertim in Valle Butensi inter aquarum stillicidia in ripa quadam secus viam quae Butium ducit abunde provenit.*

Pag. 76.

POPULAGINI 1. subiunge.

An Farfarugio Matth. 895. Populago maior Tabern. Icon. 750. ex Mich. Rar. Flores a dimidio Martio Mense, ad dimidium usque Aprilem profert.

POPULO 3. subiunge.

4. *Populus tremula foliis minoribus, & magis angulosis, marginulis ciliis instar pilosis, pediculis brevibus appensis. Populus folio leviter serrato, inferne subbirsuto Caesalp. 121. Mich. Rar.*

PRUNO subiunge.

PSEUDOACACIA vulgaris Inst. R. H. 649.

PSEUDODICTAMNO 4. subiunge

Tomentum quo Plantae superficies universa vestitur, constat villis ramosis, nempe villulis alterne & rotatim in spiram dispositis, ac in summitate in stellulam terminatis, e cuius centro guttula Balsami pellucidi extillat: aliud item Balsamum extillat e glandulis ad basim villarum istorum sitis. Stellulae memoratae si plantam naribus appresseris, facile divelluntur, membranamque olfactoriam vellicantes sternutamenta cient.

5. *Pseudodictamnus amplissimo Melissae folio crenato villosa & subincano, flore purpureo, calyce angusto infundibuliformi, Mich. Rar.*

PSEUDOSPONGIAE subiunge.

Plantae haec referenda est ad Badiagae Genus ab I. C. Buxbaum institutum in T. 2. Comment. Academiae Scient. Imper. Petropolit. An. 1727. Diversa tamen est a tribus speciebus quas Buxbaumius ibidem recenset.

Pag. 77.

PSEUDOSTACHYDI subiunge.

2. Pseudostachys Alpina nigra maxima, foliis amplissimis ad Viburnum accedentibus, flore ex albo purpurascente nonnihil variegato. An *Salvia Alpina* Tabern. Icon. 372.? Mich. Rar. quae in hoc ipso Catalogo pag. 92. inter *Stachydis* species relata fuerat.

3. Pseudostachys montana nigra maior, *Betonicae* folio, flore variegato: *Galeopsis montana* *Betonicae* folio angustiore, flore variegato Michx. H. Pif. *Salvia silvestris* altera nigricans Caesalp. 441. Mich. Rar. Haec item inter *Stachydis* species num. 11. descripta fuerat.

Ad Pseudostachydis genus revocavit Michxelinus eas plantas, quae *Stachydis* quidem faciem praeferebant, at calyces florum campanulatos, non vero tubulatos gerunt.

PTARMICAE 1. subiunge.

Flosculi insident seminibus nudis, & ab invicem distinguuntur foliolis quibusdam oblongis, cilia instar pilosis, Thalamo adfixis.

PTARMICAE 7. subiunge.

8. *Ptarmica*, quae *Achillea tomentosa* & *incana*, pinnulis cristatis, flore ochroleuco Vaill. in Act. Acad. R. Sc. An. 1720. pag. 418. speciei 6. varietas.

PULMONARIAE 8. subiunge.

PULSATILLA flore clauso obsoleto Helwingii Florae Campana pag. 65. Tab. 11.

Pag. 78.

QUINQUEFOLIO 1. subiunge.

An *Quinquefolium minus* flore pallide luteo Inst. R. H. 297.?

QUINQUEFOLIO 6. subiunge.

Est *Quinquefolium minus* erectum incanum & tomentosum, foliis tenuiter divisis superne viridibus, flore luteo parvo, petalis obtusis Mich. Rar.

QUINQUEFOLIO 11. subiunge.

Folia subius incana sunt, & semina lanuginosa.

RANUNCULO 6. subiunge.

Folia subrotunda sunt, in basi dentata, vel sinuata. Petala lineas decem longa, tres cum dimidia lata, superne aurea & splendentia, ac in ungue nervario oblongo instructa sunt. Calyx tribus foliolis oblongis constat cochlearis instar excavatis, & ad exortum caudatis, foliorum Sedi vermiculati instar.

RANUNCULO 7. subiunge.

Folia superne secundum nervos profunde sulcata sunt. Petala florum unciam longa, lineas autem quatuor lata sunt.

RANUN-

RANUNCULO 8. subiunge.

Petala lineas novem longa sunt, tres autem lata.

RANUNCULO 14. subiunge.

Est Ranunculus Lusitanicus Autumnalis, Asphodeli radice, foliis subrotundis ferratis, caule simplici nudo hirsuto, flore parvo luteo odorato, &c. Mich. Rar.

RANUNCULO 46. subiunge.

Hanc & sequentem ad Alismae Genus revocavit Michelius Rar. primamque appellavit: Alisma aquatica maior, Plantaginis folio ampliore, floribus paniculatis ex albo purpurascens, fructu umbilicato, &c. Alteram vero: Alisma aquatica media, longo angusto Plantaginis folio, floribus paniculatis ex albo purpurascens, fructu umbilicato, &c.

Pag. 80.

RANUNCULO 48. subiunge.

49 *Ranunculus Phragmites albus verus I. B. 3. 412. Inst. R. H. 885. Anemonoides vulgaris monanthos, flore albo Vaill. in Act. Acad. R. Sc. An. 1719. pag. 39. num. 1.*

50. *Ranunculus arvensis annuus hirsutus, flore omnium minimo luteo Mor. Hist. Oxon. part. 2. 440. Inst. R. H. 290.*

RAPISTRO subiunge

Semen globosum infidet basi conicae fungosae.

2. *Rapistrum Pannonicum maius, Panacis Heraclei foliis, radice maxima esculenta D. Bassand. Tataria Hungarica Clus. Hist. CXCI. Cl Vir lo. Bapt. L. B. De Bassand S. C. M. Augustissimi Romanorum Imperatoris Magnique Ducis Nostri Archiatrorum Comes An. 1738. Plantarum ferme omnium Pannonicarum & Austriacarum a Clasio descriptarum semina, sed vetusta nimis, & plerumque evanida, mecum perhumaniter communicavit, a se ante multos annos summo labore conquesta in gratiam Magni Boerhaavii. In his erant semina Tatariae Hungaricae collecta An. 1734 quae magnitudinem, colore, & figura semina Coriandri Officinarum quodadmodo referebant; sed utrinque acuminata erant, costulis quatuor per longitudinem distincta, lacunis intermediis rugosis, Piperis granorum instar; nucleumque fovebant unicum, rotundum, acre, oleosum, cute nigricante tectum. Haec autem in Horto nostro terrae commissa germinarunt Maio Mense, quatuorque tantummodo folia e radice protulerunt ampla, qualia Clavius describit: adolescente vero aestate prorsus perierunt, antequam caulem floresque exererent.*

RANUNCULO 2. subiunge.

Est Scabiosa Caesalp. H. Sic. pag. 31. num. 355. Folia graminea sunt & serrata; spica autem florum longa caerulea: ex Mich. Rar.

RESEDAE subiunge.

Est Reseda perennis glabra, foliis pinnatis, pinnulis densioribus crispis, floribus albis pentapetalis, staminibus luteis, capsulis quadrangulis. Reseda

Pli.

Phinii Hist. Nat. Lib. 17. cap. 12. Reseda candida Lugd. 1119. sed Descr. Reseda crispa Gallica Bocc. Rar. 77. Reseda Massiliensis, foliis latoribus crispis Pluk. Phytogr. Tab. 55. fig. 4. Raii Hist. tom. 3. 511. Mich. Rar. In montibus & Agro Urbis Ariminensis sponte provenit, quemadmodum Plinius adnotavit.

2. *Reseda minor annua, Bellidis folio, floribus tripetalis albis, petalis bifidis, sectionibus digitatis, fructu crassiore trigono cernuo, semine granulato. An Reseda minor vulgaris, foliis integris Inst. R. H. 423? Mich. Rar.*

RHAMNOIDI subiunge.

Species quae in Horto colebatur, at superiori hyeme perit, quemadmodum ex floribus, quos semel tantum protulit, cognovi, erat potius Rhamnoides florifera. Salicis folio Coroll. Inst. R. H. 53. Flores ad basim ramusculorum foliorum erumpebant mitrati, seu foliolo unico cinereo duplicato & connivente, mitrae, vel Atriplicis fructuum instar: singulis sectionibus duo brevissima stamina adhaerebant apicibus oblongis instructa.

RHAMNO subiunge.

Michelius Rar. Florem non in hac tantum, sed & in aliis Rhamni speciebus non monopetalum, sed rosaceum observavit.

RHAPONTICOIDASTRUM altissimum, caule non alato, Salicis folio amplo serrato, subtus incano & tomentoso, capitulis rotundis purpureis parvis umbellatis, calyculorum squamis in latiore & tenuissimum apicem desinentibus Mich. Rar. Est *Serratula Virginica Persicae folio subtus incano H. Eltham. pag. 356. Tab. 264. Rhaponticoidastri genus a cognatis differt, eo quod thalamus florum nudus sit, villis nempe prorsus destitutus.*

RHAPONTICOIDES maxima alato caule, foliis amplissimis Cichorii instar divisis, glaucis, & glabris, floribus luteis. *Iaceae Babylonicae similis maximae, floribus paniculatis D. Sberard Raii Hist. T. 3. 207. Mich. Rar. quae proinde ab Iaceae speciebus inter quas superius pag. 51. primo loco descripta fuerat seungenda est.*

2. *Rhaponticoides maior, folio in amplas lacinias diviso Vaill. in A& Acad. R. Sc. An. 1718. pag. 227. num. 11. Centaurium maius, folio in lacinias plures diviso C. B. Pin. 117.*

3. *Rhaponticoides annua, foliis Cichoriaceis villosis, altissima, flore purpureo Vaill. ibid. pag. 228. num. 20. Iacea satis in hoc Catalogo pag. 51. num. 15. descripta.*

4. *Rhaponticoides frutescens, Helichrysi folio, calyce cylindraceo Vaill. ibid. pag. 227. num. 10. Iacea capitata Rorismarini folio Inst. R. H. 455. Cbrysocome alia in montibus, pluribus capitulis in unum aggregatis Caesalp. 539.*

RHAPONTICUM humile, capite magno Strobili Vaill. in A& Acad. R. Sc. An. 1718. pag. 224. num. 3. *Centaurium maius incanum humile, capite Pini Inst. R. H. 449.*

2. *Rhaponticum folio Helenii incano C. B. Pin. 117. Vaill. ibid. num. 1. Centaurium maius, folio Helenii subtus incano Inst. R. H. superius in hoc Catalogo pag. 23. num. 2. descriptum.*

3. *Rhaponticum luteum*, *Isatidis folio*, *alato caule* Vaill. *ibid.* num. 4. *Centaureum minus Orientale erectum*, *Glaſti folio*, *flora lusse* Coroll. *Inst. R. H.* 32. *primo loco in hoc ipſo Catalogo recensitum.*

4. *Rhaponticum tenuifolium laciniatum*, *calyculis argenteis*, *minus* Vaill. *ibid.* n. 5. *Iacea calyculis argenteis minor* *Inst. R. H.* 444. *Planta annua eſt*, *ſubſpera*, *caule anguloſo*, *foliorum lobis plerumque integris*, *floribus purpureis.*

Præterea ad hoc genus referendæ ſunt Plantæ in hoc Catalogo pag. 51. inter Iaceæ ſpecies deſcriptæ, ſub numeris 9. 10. 11. 12. 13. 16. 17. 18. 19. 20. 21. & 23.

RICINOIDI ſubiungo.

*Semina per plures annos in terra deliteſcunt, & bis tantummodo, quod me-
mini, pluribus interiectis annis ſponte germinarunt, ea copia ut arcam Horti
infeſtarint. In ſuperficie foliorum obſervavi plures villos ſtettæformet, ſimiles
iis quos in Malva 6. ſuſius deſcripſi.*

ROSAE 5. ſubiunge.

*Spinis crebris munitur. Folia ſubrotunda ſunt, ſimpliciter dentata, ſuperne
glabra, inferne ſubhiſuta. Flos odoratus petalis conſtat plurimis, lineas 10.
plerumque longis, & cordatis: ſtaminum locum occupant petala quædam mi-
nora, reflexa, & convoluta. Calyx, & fructus hiſpidi ſunt.*

Eius varietatem colimus foliis acutis præditam.

ROSAE 6. ſubiunge.

*Pumila eſt, ſpinis tenuiſſimis armata. Folia habet oblonga, acuta, utrin-
que glabra, ſerrata, & ad petiolum cordata. Flos ſaturorubens, intus bolo-
ſericeus, petalis octo uſque ad ſeſquiunciam dilatatis, & unciam longis con-
ſtans, ſtamina & apices nuceos habet. Fructus rotundus ſimul cum calyce &
pediculo hiſpidus eſt.*

Eius varietatem colimus flore purpureo.

Pag. 81.

ROSAE 7. ſubiunge.

*Pumila eſt, ſpinis raris tamquam villis exaſperata. Folia acuta ſunt, non,
vel vix crenata, ſuperne glabra, inferne ſubhiſuta. Flos ſemiplenus, odora-
tus, petala habet lata, cordata, ex purpureo albo & rubro variegata, ca-
lycem vero & fructum ſubhiſpidum.*

ROSAE 11. ſubiunge.

*Erecta eſt, in arbuſculam plerumque aſurgit, & validis variſque ſpinis
armatur. Folia Myrti præſertim inferne nonnihil hiſuta, leviter & ſimpliciter
dentata. Flores ſuaviter odorati pluribus petalis albis ſemuncialibus & cor-
datis conſtant. Fructus exiguus eſt, oblongus, & lævis.*

ROSAE 12. ſubiunge.

*Huius, & quarundam aliarum Roſæ ſilveſtris ſpecierum folia Balſamo quo-
dam illita ſunt, Glycyrrhizæ foliorum inſtar.*

RORIMARINO 2. subiunge.

Est Rosmarinus coronarius spontaneus in Ilva Caesalp. 458. An Rosmarino Coronario Matth. ed. Valgrif. in fol. An. 1585. pag. 833. Mich. Rar.

RUBEOLAE 4. subiunge.

Planta sarmentosa est, viticulis quadrangularibus procumbentibus. Folia quae ad singulos nodos rotatim nascuntur, rigidiuscula sunt, lineas 7. longa, semilineam lata. Flores sesquiunciam longi, Lilac instar quadrifariam scissi, extus carnei, intus albi sunt, sectionibus in extremitate eleganter cucullatis. Apices quatuor rubri sunt; semina vero bina, Bupleuri perfoliati similia.

RUBEOLAE 6. subiunge.

Est Gallium arvense flore caeruleo Inst. R. H. 113. Rubia caerulea erectior, & elatior I. B. 3. 719. Ex Mich. Rar. Planta annua est.

Pag. 82.

RUBIAE 1. subiunge.

Ramuli, seu viticuli quotannis pereunt (secus ac insequenti specie) radice vivida rubraque remanente. Flores herbacei sunt, quinquefariam scissi, sectionibus acuminatis, lineam longis, staminibus praediti quinque brevissimis, apices lutescentes sabstinentibus. Embryo tuba alba instructus abit in baccam pisiformem compressam.

RUBO 7. subiunge.

Sarmenta crassiora pentagona sunt, aculeis longis aduncis munita. Folia Corylacea, superne glabra & virentia, inferne incana & pubescentia, ad oras nonnihil undulata, & varie crenata sunt. Petala subrotunda, lineas septem longa, quinque lata, interne rosea sunt, externe albescent.

RUBO 8. subiunge.

9. Rubus Idaeus spinosus C. B. Pin. 479. Inst. R. H. 614. Calycis squamae repandae sunt; Petala vero alba, lineas tres longa, sesquilineam lata simul cum staminibus erecta sunt, & Embryoni appressa. Fructus dulcacidi Lamponi vulgo vocantur, & ad Iulapia conficienda expetuntur ex Alpibus Pistoriensibus adlata.

In 5. & 6. Rusci speciebus Auctorum nomina Typographorum vitio permixta sunt. Prius itaque est. Micheli H. Pif. Posterius vero Inst. R. H. 79.

RUTAE 2. subiunge.

3. Ruta silvestris foliis tenuiter laciniatis, lobis rarioribus & brevioribus, flore luteo, petalis angustis, ad marginem villis longioribus praeditis Mich. Rar. In rupibus prope Stazzemam collegi, inque Hortum transtuli An. 1743.

4. Ruta silvestris maior, foliorum lobis ad extremitatem dilatatis, & interdum cordatis, flore luteo, petalis cordatis D. Cocchi Mich. Rar. Hanc Michelius olim accepit a Gl. Viro Anton. Cocchio Amico praecipuo, in praediis suis baud procul a Burgo S. Laurentii repertam: in Hortum autem nuper transtulit D. Manettius M. D. & Rei Herbariae Professor, qui Societatis Bota-

Botanicae iussu iter per Alpes Mugellanas instituit plantarum colligendarum gratia.

Pag. 83.

SABINAE 3. subiunge.

Ad Cedri Genus revocandae sunt hae Plantae, quemadmodum superius animadverti. Secundae speciei fructus baccas Juniperi primo loco descripti aemulatur, sed duriusculus est, odoremque spirat magis resinofum; interne autem in tria loculamenta dividitur, in quorum singulis semina bina hospitantur.

SALICORNIAE 2. subiunge.

Quamvis hae duae Salicorniae species in Maris tantummodo littore nasci solitae sint, eas tamen simul cum aliquot aliis littoreis plantis An. 1743. repperi laete germinantes in alveo Rivuli il Saltero nuncupati, qui falsas aquas Balnearum Montis Catini in Nebulam fluvium derivat, quamvis ea loca triginta passuum millibus ad minus a Mari distent. Eae quidem Aquae marinas sapore aemulantur, si nauteam demas, rivulique memorati alveus Sale marino simili saturus est. Sed quo nam pacto e Mari tanto intervallo seiuncto Salicorniae, Asterum in hoc Catalogo pag. 12. num. 9. & 11. descriptorum, & Alines 10. pag. 5. semina antiquitus hac delata esse credendum est? Et cur nam in pluribus rivulis haud absimilibus, qui Aquas falsas Salinarum per Agrum Volaterranum obviarum excipiunt, nullae plantae maritimae vegetant? quemadmodum in Itinere An. 1742. comperi.

SALVIAE 3. subiunge.

Inferna foliorum pars glandulis numerosis instructa est, e quibus Balsamum, seu Resina lutescens guttatim extillat, quae plantam tactui viscosam reddit. In speciebus 4. & 8. resina albida est.

Pag. 84.

SALVIAE 14. subiunge.

Flos quandoque violaceus, quandoque dilute caeruleus est, labio inferiori ex albo variegato. In utraque foliorum parte, inter nervos, lacunae seu alveoli plurimi observantur, superne convexi, inferne cavi, villis procumbentibus undique obstiti. Spatia intermedia glandulis minimis semiglobosis instructa sunt, e quibus guttatim extillat Balsamum fragrantissimum & viscosum, quod in globulos colligitur, & plerumque villis adhaeret, plantam tactui glutinosam reddens, & per senectutem ad luteum colorem vergit. Balsamum hoc unice plantam usui medico aptissimam facit, praesertim in capitis, ventriculi, & nervorum affectionibus nonnullis, in quibus decoctiones Theaeformes foliorum mirifice prosunt. Aqua enim fervens foliis affusa Balsamum memoratum eliquat, sibi-que admiscet, adeo ut in minima corporis nostri vascula penetrare queat. Ser. Cosmus III. M. D. Etr. An. 1718. e Malacae Hispaniae Urbis Agro in Hortos Pisunum Florentinumque transferri curavit, quum prius folia tantummodo exsiccata ex Aragoniae maritimis in usus medicos expeterentur.

SAMBUCO 4. subiunge.

5. Sambucus humilis, sive Ebulus, foliis in longos & acutos lobos divisus, fructu maiore ovato. Magna copia germinantem inveni in Olivetis Petrasan-
tanis cundo vallem Castelli dictam.

SANTOLINAE 3. subiunge.

Flosculorum tuba bifida est, ipsi autem flosculi insident seminibus nudis, in-
vicemque separantur foliis seu squamis quibusdam. In Alpibus Petrae Apua-
nae sponte nascitur in fissuris rupium marmorearum, quemadmodum observavi
in editissimo iugo. le Bocchette del Forno Volastro dicto.

Pag. 85.

SATUREIAE subiunge.

2. Satureia spicata foliis tenuissimis (spica densissima) C. B. Pin. 218.
variet. Satureia foliis tenuibus, sive tenuifolia Sancti Iuliani quorundam I.
B. 3. 275. Thymsa Sancti Iuliani, sive Satureia vera Lob. Icon. 425. Inst.
R. H. 198. Clinopodium Caesalp. 454. Mich. Rar. In Monte D. Iuliani, in quo
Montibus Oliveti, Avanae, & Filettuli prope Pisas in saxorum crepidinibus
nascitur.

SAXIFRAGAE subiunge.

Saxifraga Sedi folio angustiore serrato Inst. R. H. 252.

SCABIOSAE 11. subiunge.

Apices rubri sunt.

Huius varietatem colimus flosculis ex albo & nigropurpureo variegatis.

SCABIOSAE 13. subiunge.

14. Scabiosa stellata, folio laciniato, maior C. B. Pin. 271. Inst. R. H. 465.

Pag. 86.

SCLAREAE 1. subiunge.

Figura huius Plantae quam Rivinus exhibet T. I. Hormini nomine, optima
est. Universa Plantae superficies innumeris glandulis Balsamum extillantibus
referta est.

SCLAREAE 4. subiunge.

Est Horminum silvestre, maius, haematode, glabrum, flore caeruleo, Itali-
cum Barr. Obs. 25. Icon. 185. ex Mich. Rar.

SCLAREAE 14. subiunge.

Flos parvus est, labia superiori violaceo vix bifido, inferiori cochlearis in-
star excavato, & simul cum tubo dilute caeruleo, ac circa faucem lineis qua-
tuor nigropurpureis distincto. Pistillus, stamina, & apices violacei sunt, pul-
visculumque luteum fundunt.

15. *Sclarea Pratenfis minor*, foliis longis, angustioribus, usque ad costam divisis, flore subcaeruleo. *Varietas* Hormini *Verbenae* laciniis angustifolii *Triumf.* 166. Mich. Rar. In Agro Pisano, praesertim secus Viam Regiam Florentinam, & Liburnensem inveni.

SCOLYMO 1. subiunge.

Semiflosculi tuba, & *vagina instructi sunt*, insidentque seminibus, quae arsis 5. vel 6. coronantur, sitaque sunt in folliculis, seu squamis thalamum totum occupantibus, marginatisque: squamae calycis interiores seminibus contiguis vaginae vicem praestant.

Pag. 87.

SCOLYMO 5. subiunge.

SCORPIUS maior arborefcens, longioribus & validioribus aculeis munitus, foliis Iuniperi subtus nervosis, seu striatis, floribus luteis, florum calycibus, & semuncialibus siliquis villosis. *Genistaspantium maior*, longioribus aculeis *Inst. R. H.* 646. *Bot. Par.* 78. *Genistella spinosa maior*, longioribus aculeis *C. B. Pin.* 294. *Genistellae spinosae affinis*; *Nepa quibusdam* *L. B. I.* 400. *Scorpius* *I. Clus. Hist.* 116. *Spina Christi Caesalp.* 117. Mich. Rar. quae in hoc Catalogo pag. 40. inter *Genistae Spartii species primo loco descripta fuerat*.

SCROPHULARIAE 2. subiunge.

Est *Scrophularia Matth.* 1188. *Cast.* 406. *Dod. Pempt.* 50. *Scrophularia maior Ger. Emac.* 716. *Lob. Icon.* 533. *Scrophularia maior Matthioli Lugd.* 1085. ex Mich. Rar.

SCROPHULARIAE 3. subiunge.

Respondet figurae & descriptioni *Scrophulariae maioris Brunf. T. I.* 213. *Orimaesti alterius Trag.* 184. ex Mich. Rar. *Varietas superioris est: Ambae autem folia gerunt tenuissime serrata, floremque rubrum labio inferiori viridi.*

SCROPHULARIAE 4. subiunge.

An *Scrophularia Marilandica*, longo, profunde serrato *Urticae folio Raii Hist. Tom. 3.* 396. num. 14. ? ex Mich. Rar. *Montana est: Flores profert lineas 4. longos, atro & sordide purpureos, labello inferiori viridi, fructumque crassiore acuminatum.*

SCROPHULARIAE 7. subiunge.

Folia nitida sunt, leviter incisa incisuris denticulatis. Flores lineas tres longi sunt: calycis sectiones margine chartilagineo decorantur.

SCROPHULARIAE 12. subiunge.

Est *Scrophularia maior*, hirsuta, foliis lobatis, crassis, ad *Raphanum & Sinapi accedentibus*, flore rubro octo lineas longo, cum labello inferiori viridi, fructu crasso, pyramidato, peracuto. An *Scrophularia latifolia*, laciniata *C. B. Prodr.* 113. *Scrophularia foliis laciniatis Ejusd. Pin.* 236. *Raii Hist.* 7663. Mich. Rar.

SCROPHULARIAE 13. subiunge.

Est Scrophularia maior, glabra, foliis crassis, lobatis, ad Raphanum accedentibus, flore maximo rubro, cum labello inferiori sulphureo pendulo, capsula obesa, pyramidata, & mucronata. An Scrophularia peregrina altera Rark. Theat. 611. ? Mich. Rar. Flor octo lineas longior est.

SCROPHULARIAE 14. subiunge.

Est Scrophularia minor, perennis, glabra, foliis imis ad Atriplicem accedentibus, ceteris lobatis, flore trilineari ex rubro nigricante, cum labello inferiori viridi, fructu brevi acuminato Mich. Rar.

Pag. 88.

SEDO 2. subiunge.

Petala florum 11 circiter sunt, acuminata, inferne & in margine hirsuta, superne glabra, & purpureo & albo variegata: Stamina 22. sunt, purpurea, apices substinentia purpureos, pulvisculo luteo fetos.

SEDO 3. subiunge.

Calyx florum scissus est in 10. squamas bilineares, angustas, hirsutasque. Petala decem sunt semuncialia, intra calycem angusta, dein ad sesquilineam dilatata, rursusque in acumen abeuntia, gibba, seu squamarum cavitati sese accomodantia, hirsuta, extus carnea, ac inferiore parte virescentia, intus rubra. Stamina lineas tres longa, rubra, apices rubros substinent. Embryo capsulis 10. constat.

SEDO 4. subiunge.

Caules pedales, glabri; glauci, seu pallentes, foliolis brevioribus subinde vestiti, in summitate in quatuor radios scinduntur, qui bifariam subditi vix umbellas constituunt Sedi vulgaris maioris in morem. Folia lineas 8. longa sunt, duas lata, cylindracea compressa, acuminata, glauca, succosa, sapore adstringenti. Flores petalis sex constant albis; duas circiter lineas longis, semilineam latis, in acumen desinentibus, cochlearis instar excavatis. Calyx viridis, crassiusculus, in sex partes subrotundas ad medium usque eleganter scinditur, quae intervallis petalorum respondent. Stamina alba sunt apices luteos substinentia, eorumque sex exteriora singulis petalis respondent, & in ipsorum curvitate hospitantur; sex autem alia interiora prodeunt ex intervallis petalorum, & calycis sectionibus respondent. Embryo capsulis sex corniculatis viridibus constat, quae petalis respondent, & primum unitae sunt, deinde vero expanduntur.

SEDO 12. subiunge.

Flores petala sesquilinearia gerunt, alba, costa subrubente donata; Stamina autem decem alba. Fructus subhirsutus est, quinquecapsularis, capsulis in macronem linearem desinentibus,

Pag. 89.

SERPILLO 8. subiunge.

Florum spicae subhirsutae sunt, flores autem bilineares.

9. Serpillum foliis Citri odore C. B. Pin. 220. Inst. R. H. 197. In pratis Alpium Apuanarum late se spargit, suavisimumque Citrei Florentini odorem conculcatus spirat, quemadmodum die 20. Octobris. An. 1743. licet pluviosa, & frigidissima observavi. Odor autem hic promanat a Balsamo peculiari, qui e minimis glandulis in foliorum superficie sitis extillat. Notari meretur Plantam hanc ex Alpibus in Hortos translatam, talem odorem amittere.

SHERARDIAE subiunge.

Est Sherardia repens nodiflora Vaill. in Aët. Acad. R. Sc.

SIDERITIDI 1. subiunge.

Planta perennis est, procera, Pblomidis facie, villosa, glutinosa, graveolens. Flores gerit parvos, initio albos, lineis purpureis notatos, mox ex albo pallentes, tandem obsoletos.

SIDERITIDI 5. subiunge.

Spica florum interrupta est: floris tubus lineas 4. longus, unam circiter in diametro habet. Labium superius trilinare est, cochlearis instar excavatum, in summitate tantillum scissum, pallidum, lineisque duabus purpureis circa faucem distinctum, externe simul cum tubo hirsutum: Inferius vero quinque lineas longum, reflexum, trifidum, cordatum, linea purpurea per medium punctulisque purpureis notatum. Stamina quatuor sunt, punctis rubris adspersa, apiceque citrinos substinent. Calyculorum radii angusti sunt, & in spiciam terminati.

SISYMBRIO 1. subiunge.

Foliorum lobos amplor, & rotundas genit; flores albos, filiquas crassas, incurvas, pediculo longo insidentes.

SISYMBRIO 2. subiunge.

Folia superiora non laciniata sunt, verum ferrata: filiquae autem crassiores, & nonnihil incurvae sunt.

Pag. 90.

SISYMBRIO 7. subiunge.

Minus superiori est.

De Sisymbrio 8. V. adnotata ad Barbarareae species.

SMILACI 2. subiunge.

Est Smilax aspera, spinosissima, aculeis latis deorsum tendentibus, foliis praelongis & acutis, maculatis, & ad petiolum magis excavatis, margine & tribus inferioribus costis spinosis, floribus albis, fructu rubro turbinato. An Smilax

Smilax aspera foliis maculatis, fructu rubente C. B. Pin. 296. *Smilax aspera* Cam. Epit. 931. Mich. Rar.

SMILACI 5. subiunge.

4. Flos, iuxta Michellii observationes, rosaceus est; calyce namque constat herbaceo, in sex oblonga & angusta foliola ad centrum usque scisso, intra quorum sunt petala sex albicantia, utrinque acuminata; stamina item sex crassiuscula embryonem stipantia, qui conoides est, sulcis tribus per longitudinem distinctus, abique in baccam trilocularem Asparagi instar.

SMILACI 5. subiunge.

Flos monopetalus est, candidus, in quatuor partes reflexas fectus, quarum singulis unum stamen respondet. Embryo initio candidus abit in baccam globosam rubentem.

Pag. 91.

SOLANO subiunge.

Est Solanum Africanum spinosum, folio canescente undulato H. Ekham. 270. ni male memini; nec enim amplius ad manus est Hortus Elthamensis Aureum Cl. Dillenii Opus, ex quo plura ad Catalogum hunc illustrandum desumere potuissim.

SOLANO 9. subiunge.

Est Solanum arboreescens Caesalp. 215. quod nomen per errorem superius pag. 61. Lycopersico fructu Cerasi rubro adscripseram.

SONCHO 5. subiunge.

6. Sonchus laevis, muralis, perennis, foliis inferioribus in lobos angulosos divis, superioribus Polypodium aemulantibus, flore luteo. An Sonchus laevis C. B. Pin. 124. Prodr. 61. Inst. R. H. 475. Vaill. in Act. Acad. R. Sc. An. 1721. pag. 257. num. 6. Mich. Cat. Plant. Agri Flor. In ipsi Urbis Florentinae moenibus laete germinat, praesertim prope Horreum publicum l'Uccello dictum, unde in Hortum transferri curavi.

7. Sonchus laevis, minor, paucioribus laciniis, C. B. Pin. 124. Inst. R. H. 475.

8. Idem flore intus pallido, extus albo. An Sonchus laevis laciniatus, flore albo Park. Theat. 806. Mich. Catal. Plant. Agri Flor.

SPIRAEAE subiunge.

Flos petalis quinque albis rotundis constat.

Pag. 92.

STACHYDI 7. subiunge.

Est Cochlea Italica Stachys facie, candidissima, & tomentosa, flore luteo, spica magis interrupta. Stachys minor Italica C. B. Pin. 236. Stachys flore subluteo Cam. Epit. 575. Stachys Dod. Pempt. 90. Stachys Lychnitis, inca-

incana, angustifolia, flore aureo, Italica Barr. Obs. 27. Icon. 1187. Stachi Matth. 877. Sideritis Cretica, tomentosa, candidissima, flore luteo Coroll. Inst. R. H. 12. Salvia silvestris tertia, candidior, lanuginosior, odorata, acrior Caesalp. 441. Mich. Rar. qui plantam banc a Stachyos & Sideritidis Generibus seiunxit, & ad novum revocavit, quod iure quidem optimo denominavit ab Amicissimo suo Antonio Cocchio Urbis nostrae ornamento praecipuo.

SYLIBO 2. subiunge.

3. Sylibum albis maculis notatum, flore albo Eiusd. Ibid.

Pag. 93.

SYRINGAE subiunge.

TAGETES maior, flore luteo pallescente Vaill. in Aët. Acad. R. Sc. An. 1720. pag. 407. num. 1.

2. Eadem flore monstroso Eiusd.
3. Eadem radiis florum fistulosis Eiusd.
4. Eadem radiis florum fistulosis, disco monstroso Eiusd.
5. Eadem flore aureo, varians non secus ac superior Eiusd.
6. Eadem flore melino, varians & ipsa quoque Eiusd.
7. Tagetes media, flore luteo pallescente Eiusd. Ibid. num. 2.
8. Eadem flore monstroso Eiusd.
9. Tagetes minor, flore luteo rubescente Eiusd. Ibid. num. 3.
10. Eadem flore monstroso Eiusd.
11. Eadem radiis florum fistulosis Eiusd. Puzzole vulgo vocantur, ob odorem ferme Castorei, quem folia spirant.

TEUCRIO subiunge.

Ad Chamaedryos genus revocavit Michellius Rar. Planta repens est, & radices e singulis fere nodis emittit. Quamvis autem glabra appareat, per hirsutitatem villos plurimos exerit. Folia coniugata sunt alterno situ. Florem unum ex ala cuiuslibet folii emittit, qui albus est, circa faucem & in superiori segmento maculis rubentibus notatus, staminulis albis, apicibusque rubris pulvere pallido fetis instructus. Calyx lineas duas cum dimidia longus, ore quinquefariam scisso, & patentissimo, semina quatuor continet, quae dum viridia sunt, vasculis plurimis excretoriis vesiculatis crystallinis repleta sunt.

2. Teucrium (folio subrotundo crenato) calyce tubulato, flore pallide luteolo Boerh. Ind. Alt. H. Lugd. Bat. part. 1. 181. Teucrium multis I. B. 2. 290. Teucrium verum H. Eyst. Chamaedrys assurgens Dod. Pempt. 44. Chamaedrys frutescens, Teucricum vulgo Inst. R. H. 205. forte idem cum Chamaedry Alpina frutescente, folio splendente Inst. R. H. 205. Chamaedry Alpina lucida H. R. Par. Chamaedry durior Alpina Broß. folia enim non raro splendentia profert. Mich. Rar. A. Chamaedryos speciebus proinde seiungendum est, inter quas num. 4. superius pag. 24. descriptum fuerat. In Montibus Pisanis frequenter obviam habui, praesertim inter Ascianum, & Balnea D. Iuliani, & observavi varietatem foliorum vel pallide virentium & hirsutorum, vel laevium obscure virentium, & splendentium, a soli & aetatis diversitate oriri.

TAPSIAE 2. subiunge.

Est Valdebonae nomine missa, Libanotidis secundae quorundam, seu Cervicariae nigrae species I. B. 3. part. 2. 167. Panax Rivin. Umbell. An. Ligusticum alterum in montibus, foliis latioribus, rotundioribus, caule crasso, proximo Ferulae, umbellis luteis, semine compresso, rotundo, candicante, Sphondylia minore Caesalp. 307. Mich. Rar.

THLASPIDIO 2. subiunge.

3. Thlaspidium montanum (annuum) hirsutum, angustiore folio, maius, calyce floris auriculato (fructu ampliore) capsulis oblongis Micheli H. Pis. Thlaspi quoddam genus in Monte S. Iuliani Caesalp. 366. Iondraba Alyssoides, spicata, lutea, maior Barr. Icon. 1219. Mich. Rar. In Monte D. Iuliani, & in rudibus Arcis Verruculae Montium Pisanorum semina collegi An. 1742.

THYMELAEAE subiunge.

2. Thymelaea Lauri folio deciduo, sive Laureola femina Inft. R. H. Ex Alpibus Mugellanis D. Manettius attulit Autumno An. 1745.

3. Thymelaea Alpina, saxatilis, serotina, Oleae (Taxi potius) utrinque glabro, & virenti folio, flore albo Micheli H. Pis. In Alpibus Apuanis a Furno Volastro eundo Stazzemam repperi.

4. Thymelaea foliis Lini C. B. Pin. 463. Inft. R. H. 594. Cam. Hort. 169. Thymelaea Monspeliaca I. B. 591. Thymelaea Clus. Hist. 87. Herba Mora Matib. 1318. Thymelaea Anguill. 297. Mich. Rar. In Montibus Pisanis frequens occurrit, praesertim supra S. Ioannem ad Venam, & Cucilianam. Erba Corfa vulgo appellatur, eiusque foliis contusis & aquae immixtis utuntur ad necandos Pisces.

5. Thymelaea Linariae folio, vulgaris Inft. R. H. 594. Lithospermum Linariae foliis, Germanicum C. B. Pin. 250. Passerina Tragi I. B. 3. 456. Linaria altera, botryoides, montana Col. part. 1. 82. Polygonum erectum Barr. obs. 104. Icon. 560. num. 2. Mich. Cat. Plant. Agri Flor.

THYMO 2. subiunge.

Sapore acris est.

THYMO 4. subiunge.

Planta quam Michellius olim e monte quodam prope Terracinam in Hortum nostrum transtulit, nullum modo Hirci odorem spirat, sed facie & odore speciem primam prorsus refert: Ex Mich. Rar.

TITHYMALO 2. subiunge.

Est Tithymalus fruticosus, semper virens, Salicis folio glauco, non serrato, & mollissima lanugine vestito, florum sectionibus quaternis, reniformibus, atrorubentibus, fructu pitoso. Tithymalus Characias Caesalp. 373. Ang. 297. Esula maxima Rivini: an Tithymalus characius lanuginosus. C. B. Pin. 290. Mich. Rar. In Montibus Pisanis frequens occurrit, seu inter Agnanum, & Ascianum; in aliis item Montibus maritimis videlicet Petraesantiae, Ma-
ciuc-

coli, &c. A Sole meridiano percussus odorem gravissimum, caputque laedentem spirat. Matutino tempore villi densissimi quibus folia vestiuntur, minimis roris guttulis onerantur. Tandem plantas nonnullas per senectutem lanugine destitutas esse animadverti.

TITHYMALO 4. subiunge.

Est Tithymalus palustris, maximus, latifolius, glaber, florum sectionibus quaternis reniformibus, fructu verrucoso. *Tithymalus palustris* Caesalp. 374. An *Tithymalus palustris fruticosus* C. B. Pin. 297. Forte *Tithymalus maximus* Tabern. Icon. 588. Mich. Rar. In palustribus Pisanis, praesertim extra Portam Lucensem, saepius observavi.

TITHYMALO 5. subiunge.

Est Tithymalus montanus, Italicus, semper virens, totus cinereus, Myrthi folio ampliori, peracuto, florum sectionibus rubris, lunatis, & in cuspidate rotundatis, fructu trigono, crassiori, laevi, semine non aspero. *Tithymalus Myrsinites latifolius* C. B. Pin. 290. Inst. R. H. 86. *Tithymalus Myrsinites* I. B. 3. 674. Camer. Epit. 961. Matth. 1312. Mich. Rar. qui e Montibus Aprutinis olim detulit.

TITHYMALO 6. subiunge.

Est Tithymalus arvensis, annuus, minimus, foliis Lini angustissimis, acutis, flore perexiguo, sectionibus quaternis ovatis, aut reniformibus, lutescentibus, barbula longa concolore auctis, fructu trigono ad angulos verrucoso, semine laevi, &c. Mich. Cat. Plant. Agri Flor.

TITHYMALO 7. subiunge.

Est Tithymalus nemorosus, dulcis, tuberosa radice, foliis longioribus, obtuse mucronatis, ac tenuissime serratis, floribus exiguis, sectionibus orbiculatis, atrorubentibus, fructu compresso trigono, ad angulos verrucoso, seminibus laevibus. *Tithymalus montanus non acris* C. B. Pin. 292. Inst. R. H. 86. Rati Hist. 870. *Tithymalus dulcis, tuberosa radice* Barr. Obs. 6. n. 45. Icon. 999. Bocc. Mus. part. 2. 50. *Tithymalus dulcis, tuberosa radice, Italicus* Eiusd. Tab. 44. *Tithymalus tuberosus Germanicus* C. B. Pin. 292. Mich. Rar.

TITHYMALO 8. subiunge.

Est Tithymalus repens, humilis, Cyparissias dictus, foliis Linariae, umbella florum rubente, florum sectionibus lunatis, fructu ad angulos verrucoso, semine laevi. *Tithymalus Cyparissias capitulo rubente* C. B. Pin. 291. Inst. R. H. 86. *Tithymalus strictophyllos* I. B. 3. 664. *Tithymalus flore atropurpureo* Mentz. Pag. Mich. Cat. Plant. Agri Flor.

TITHYMALO 9. subiunge.

Umbellam luteam profert, florum sectiones lunatas, fructumque ad angulos verrucosum, semine laevi fetum ex Mich. Cat. Plant. Agri Flor.

TITHYMALO 10. subiunge.

Est Tithymalus repens, humilis, Cyparissias dictus, foliis Linariae tenuissimis, umbella lutea, floribus concoloribus, sectionibus lunatis, fructu ad angulos verrucoso. *Tithymalus Cyparissias* Matth. 1315. Lugd. 1644. Mich. Cat. Plant. Agri Flor.

TITHYMALO 11. subiungo.

Elatior est: umbellam profert amplam viridem, flores sublateos exiguos, sectionibus quaternis lunatis, fructumque oblongum ad angulos verrucosum seminibus laevibus nigricantibus fetum, ex Mich. Rar.

TITHYMALO 12. subiungo.

Est Tithymalus repens (quandoque non repens, radice crassa) elatior, Oleae folio glauco non serrato, radiis umbellae florum praelongis, foliorum sectionibus lunatis, & breviter caudatis, fructu & semine laevi. Tithymalus repens, folio Esulae minoris Dodonaei, glauca tamen, & elatior Lact. Trinsf. apud Fratrem 65. Tithymalo Cyparissio affinis, lato Leucois folio, erecta, non ramosa, multicaulis Bocc. Mus. part. 2. 30. Tab. 15. An Esula minor Dod. Pempt. 374. Mich. Rar.

TITHYMALO 13. subiungo.

Flores exigui sunt, luteoli, sectionibus lunatis: fructus trigonus est, seminumque laevum. In Salictis prope Florentiam, & Pisas crescit.

TITHYMALO 14. subiungo.

Est Tithymalus fruticosus, semper virens, glaber, & glaucus, angusto Salicis non serrato folio, flore luteo, sectionibus quinis rotundis, fructu verrucoso Mich. Rar.

TITHYMALO 15. subiungo.

Est Tithymalus fruticosus, semper virens, glaber, & glaucus, Salicis angusto non serrato folio, flore luteo, sectionibus quinis rotundis, fructu verrucoso, &c. Mich. Rar.

TITHYMALO 16. subiungo.

Est Tithymalus semper virens, totus glaucus, foliis per basin caulem vaginae instar amplexantibus, florum sectionibus lunatis & reticulatis, fructu oblongo & semine laevibus. Tithymalus nemorosus, acutiore folio, dulcis Barr. Icon. 834. An Tithymalus marinus, latifolius, Italicus Einsd. Obs. 6. n. 42. Icon. 823. Mich. Rar. qui e Maritimis Castilionis Piscariae, & Crassetae olim detulit.

TITHYMALO 17. subiungo.

Est Tithymalus montanus, laxatilis, longius radicans, Polygoni folio glauco, floribus luteis, sectionibus semicircularibus in anteriori parte barbatis, & plerumque non serratis, fructu oblongo laevi, semine non rugosa. Erba di Gabbreto vulgo Mich. Cat. Plant. Agri Flor. In Collibus Imprunensis praesertim loco dicto il Gabbreto nascitur, eiusque radice incolae pro Esula Officinarum utuntur ad Aluum movendam; sed memini vidisse me Agricola, qui e tali Hydragogo intempestive, vel largius sumpto, Tenebris contumacissimo laboravit.

TITHYMALO 18. subiungo.

Est Tithymalus maritimus, semper virens, glaucus, foliis biancialibus ad Polygonum accedentibus, neque serratis, neque auriculatis, flore luteo, fructu

fructu nonnihil rugoso, semine laevi Mich. Rar. In arenoso Littore Volaterrano ad Ostium Cecinae, prope novum Castrum a Viro Ampliss. Carolo Ginorio Riparbellae, & adiacentium Castrorum Dynasta &c. An. 1739. exaedificatum, parte Orientali, lacte germinat, & ad bipedalem altitudinem assurgit.

TITHYMALO 19. subiunge.

An Pithyusa Ang. 294. ? ex Mich. Rar. Florum sectiones reniformes sunt, sive in anteriori parte leviter sinuatae. In Littore Liburnensi inter Urbem & Vada Volaterrana abunde oritur.

TITHYMALO 20. subiunge.

Est Tithymalus perennis, non repens, Linariae foliis creberrimis & angustioribus, umbella virescente, sectionibus florum lunatis atque bicornibus, fructu oblongo ad angulos subaspero, semine punctato, &c. Mich. Rar.

TITHYMALO 21. subiunge.

Est Tithymalus maritimus, annuus, admodum glaucus, & quasi argenteus, foliis crebris, tenuissimis, florum sectionibus lunatis & barbatis, fructu laevi, semine rugoso aut punctato. Tithymalus argenteus Leptophyllos Lact. Triumph. apud Fratrem 65. an Tithymalus Cyparissus Prosp. Alp. Exot. 64. ? Mich. Rar. Semina e Pineto Ravennate olim attulit Michelius, quae in Horto sata nonnisi plurium annorum intervallo vegetant, quemadmodum superius animadverti de Chamedry spinosa, & de Ricinoide agens.

TITHYMALO 22. subiunge.

Est Tithymalus arvensis, annuus, glaber, Bellidis folio serrato, umbella ampla, floribus virescentibus, sectionibus quaternis ovatis, fructu laevi, semine rugoso, &c. Mich. Catal. Plant. Agri Flor.

TITHYMALO 23. subiunge.

Est Tithymalus arvensis, annuus, foliis subrotundis non serratis, floribus herbaceis perexiguis, sectionibus lunatis & longius barbatis, fructu trigono glabro, ad angulos membranulis duabus angustissimis aucto, semine rugoso, &c. Mich. Cat. Plant. Agri Flor.

Pag. 96.

TITHYMALO 25. subiunge.

26. Tithymalus fruticosus semper virens, Salicis folio perangusto, acuto, & serrato, flore luteo, sectionibus quaternis longius barbatis, fructu laevi exquiritate triangulari, semine non rugoso Mich. Rar.

27. Tithymalus montanus, saxatilis, fruticosus, & cespitosus, humilis, caulibus lignosis, tenuiter & dense ramificatis, Hyperici folio glauco, florum sectionibus quinis, subrotundis, fructu verrucoso, semine laevi. Tithymalus Epithymi fructu Col. par. 2. 51. & Raii Hist. 872. Esula frutescens, seu Pityusa Romanorum Barr. Icon. 197. Esula minor frutescens, spinis longis horridis Mentz. Pug. Peplus altera species C. B. Pin. 292. Alypum Caesalp. 375. Alipo Matth. 1343. Mich. Rar. In Monte D. Iuliani prope Balnea Pisana, & in Monte Neo Agri Volaterrani secus viam quae Quercetum ducit, inveni. Mentzelius ramulos vetustos & aridos spinas esse credidit.

TORDYLII nomen ita emendandum est.

Tordylium maius vulgare, seminibus limbo quasi laevi Moris. Umbell. 66. *Tordylium Italicum minus* (maius potius) Micheli Hort. Pis. Sefeli Creticum maius C. B. Pin. 161. *Caucalis maior*, semine minus pulchro, hirsuto I. B. 3. part. 2. 85. *Pimpinellae Romanae* alterum genus silvestre Caesalp. 315. Mich. Rar.

2. *Tordylium Narbonense minus* Inst. R. H. 320.

TRACHELIO subiunge.

E Monte Baldo Michelius attulit. Figura quam proponit Barrellerius Icon. 683. nomine *Valerianae caeruleae Urticae folio*, omnium optima est. Flor lineas tres longus est, variatque colore intenso vel dilute caeruleo.

TRAGOPOGONO subiunge.

2. *Tragopogon purpureum*, angustifolium, flore amplo, calyce brevi Mich. Cat. Plant. Agri Flor.

TRAGOSELINO 2. subiunge.

Semen Anisi odorem & saporem refert.

TRAGOSELINO 3. subiunge.

Caulem glabrum gerit, folia inferiora *Pimpinellae minoris*, sed cristata, superiora vero multifida, seu in angustas lacinias divisa; umbellas autem albas, omnes nudas, & semen oblongum glabrum. An *Tragoselinum minus* Inst. R. H. 309. ? Ex Mich. Rar.

Pag. 97.

TRIFOLIO 10. subiunge.

11. *Trifolium semen sub terra condens* H. R. Par. Inst. R. H. 406. In *Argillofis Collibus Vallis Herae*, veluti inter *Palariam & Toianum*, semina collegi. Hirsutum est; folia gerit cordata, flores autem albos digestos in capitula circinata, longis pediculis nixa, quae dum semina maturescunt, intra terram se conduunt, adeo ut semina germinent, & radices agant.

TURRITIDI 3. subiunge.

In foliorum superficie verruculae minimae, tribus spinis stellatim positae in apice ornatae, observantur, quod *Malvae Moschatae*, & *Ricinoidi* quoque contingere adnotavi.

TUSSILAGINI subiunge.

Corona floris constat semiflosculis tenuissimis, qui in linguam ferme capillarem abeunt, insidentque seminibus pappo brevissima, nec nisi per microscopium apparente instructis: Flosculi autem discoidei insident seminibus ampliore pappo instructis. Thalamus favi instar cellulatus est.

VERA.

VERATRO 1. subiunge.

Folia lata, glabra, & viridia profert. Caulis florifer in 30. circiter ramulos dividitur, in quorum singulis viginti plerumque flores siti sunt, qui dimidio circiter Augusto Mense explicantur, & partim frugiferi, partim steriles sunt. Prodeunt autem e sinu squamæ, seu folioli viridis, cavi, & petiolo nituntur bilineari hirsuto. Petala sex sunt splendentia, bilinearia, sesquilineam lata, in acumen desinentia: stamina lineam longa nigropurpurea sunt, simul cum petalis, & apicibus pulverem aureum fundentibus.

VERATRO 2. subiunge.

Est Veratrum serotinum, foliis utrinque glabris, flore subviridi maiore, seu petalis lineis quatuor longis, unam circiter latis Mich. Rar.

VERATRO 3. subiunge.

Est Veratrum foliis subhirsutis, & inferne candicantibus, flosculis herbaceis circa fastigium caulis. Helleborum album, foliis subhirsutis inferne candicantibus, flosculis herbaceis circa summum caulem nascentibus, coherentibus Caesalp. 580. Mich. Rar.

VERBASCO 1. subiunge.

Est Verbasum vulgare, flore luteo magno, folio maximo I. B. 3. App. 871. Verbasum album. femina luteo flore Dod. Gall. 91. Verbasum Chabr. Sciagr. 493. Verbasum nigrum Fuchs. Hist. 848. Folia profert Helenii similia, rariora, rotunde crenata, imis per basim laciniatis, ceteris integris, & in duas alas secundum caulem breviter productas abeuntibus. Spica florum non stipata est, sed gracilis & foliosa. Flores biunciales sunt, in ambitu nonnihil crispis, lutei, staminibus & apicibus concoloribus, & lanugine albicante ad staminum basim praediti, ex Mich. Rar.

VERBASCO 2. subiunge.

Est Verbasum foliis incanis, mas, latifolium, floribus luteis arcte caulibus adhaerentibus, sine foliis angustis inter flores emanantibus Mor. Hist. Oxon. part. 2. 485. sect. 5. Tab. 9. fig. 1. Verbasum latius Dod. Pempt. 143. Verbasum, aut Phlomis vulgaris mas Dioscoridis, Thapsus barbatus Officinarum Lob. Icon. 561. Verbasum album vulgare, five Thapsus barbatus communis Park. Theat. 60. Verbasum 1. Matthioli Lugd. 1298. Thapsus barbatus Ger. Emac. 778. Verbasco 1. Matth. 1202. Verbasco Cast. 468. Tomentosum & incanum est, foliis Helenii serratis, per basim in binas alas secundum caulem longius productas vix divisis. Spica florum densa est, non foliosa, floribus onusta parvis luteis, staminibus & lanugine concolore, apicibus croceis.

VERBASCO 3. subiunge.

Est Verbasum Lychnite Matth. 1206. Ger. Emac. 775. Tabern. Icon. 566. Phlomis Lychnitis Matthioli Lugd. 1303. Phlomis mas alter, Verbasum Lychnite Matthioli Lob. Icon. 562. Verbasum femina Lob. Obs. 303. Lugd. 1300. ex Mich. Rar.

VERBASCO 5. subiunge.

An Verbasum nigrum Dioscoridis Lob. Icon. 502. Verbasum nigrum Ger. Emac. 707. Verbasum VII. Caesalp. 347. Ex Mich. Rar.

VERBASCO 6. subiunge.
Folia obtuse mucronata sunt.

VERBASCO 7. subiunge.
An Verbascum mas angustioribus foliis, floribus pallidis C. B. Pin. 239.
Ex Mich. Rar.

VERBASCO 9. subiunge.
10. Verbascum perenne, Conyzae folio leviter serrato, floribus violaceis parvis, plerumque solitariis, ac longo pediculo fulvis. An Blattaria flore nigrae Violae, colore eleganti nitente C. B. Pin. 241. Inst. R. H. 148. Mich. Rar. Circa Blentinam Ditionis Pisanae Oppidum inveni.

VERBENAE 2. subiunge.
Est Verbenaca Matib. 1107. Gam. Epit. 797. C. B. in Matt. 742. Mich. Rar.

Pag. 99.

VERONICAE 9. subiunge.
Caulis alba languine pubescit; flores autem caerulei sunt.

VERONICAE 13. subiunge.
Est Veronica spicata, erecta, & elatior, caulibus ramosis, glabris, rubentibus, foliis longis, angustis, peracutis, a medio ad summum altius & acute dentatis, floribus caeruleis Mich. Rar.

VERONICAE 14. subiunge.
15. Veronica spicata, subhirsuta, ramosa, erecta, foliis angustis, acutis, a medio ad summum argute dentatis, spica caerulea, longissima, tenuiore. Veronica spicata, caerulea, hirsuta, erecta, caulibus rubentibus, flore maiore Micheli H. Pis. an Veronica mas Ang. 244. Mich. Rar. In argilloso Colle secus Viam Regiam Pisanam, prope Cauponam la Rotta dictam, sponte crescit, indeque in Hortum transyli.

VIOLAE 1. subiunge.
In Hortis Pisanae Urbis vulgatissima est, floresque plurimos plenissimos dilute caeruleos, ac suaviter odoratos constanter profert; in Hortos vero Florentinos translata, brevi vel perit, vel flores simplices tantum gerit.

VIOLAE 4. subiunge.
Folia acuminata sunt, quaeque primum erumpunt, undique, caetera superne tantum pubescunt. Calyx foliolis quinque acuminatis constat. Petala nitida sunt, quandoque circa unguem lutea, & externa parte purpurascens, in summitate retusa, & tantillum cordata. Fructus crassior est, rotundus, & hirsutus.

VIOLAE 6. subiunge.
Viticulos palmares emittit, vestitus foliis latis, subrotundis, utrinque subhirsutis. Flores e sinu foliorum prodeunt petiolo sesquiunciali fulvi, dilute purpu-

purpurei, ferme inodori. Petalum inferius & repandum lineas quatuor cum dimidia longum est in basi albidum, lineis violaceis distinctum: reliqua lineas quatuor longa, duas lata; omnia vero retusa sunt, & in extremitate cordata. Ex his vero duo intermedia in basi lutescunt, & binis lineis violaceis notantur; duo alia & superiora in basi albescunt. Calyx quinque foliolis purpureis constat: Fructus globosus, trigonus, glaber, foliolis tribus circumscissis & excavatis tegitur.

VIOLOE 7. subiunge.

E radice repente sarmenta plura procumbentia emittit, cubitalia, angulosa, laevia, alternatim vestita foliis sesquunciam longis, semunciam latis; ad petiolum cordatis, in margine serratis, in acumen abeuntibus, superne subhirsutis, inferne glabris & nitidis. Petiolo haec fulciuntur unciali, prodeuntque e sinu duorum foliorum angustissimorum crenatorum. Ex eodem sinu prodeunt flores petiolo unciali, duobus angustis foliolis in summitate aucto. Petalis bi quinque constant violaceis, retusis, quorum inferius lineas tres cum dimidia longum, sex latum, a medio ad imum albescit, purpureis venis, maculaque violacea notatum; cetera quatuor paullo angustiora in basi albescunt, & lineis purpureis villisque albis decorantur. Stamina petiolo proxima crassa sunt, calcar viridi intra calyptram latente instructa. Calyx foliolis quatuor lunatis constat: tandem fructus trigonus est, angustus, & semuncialis.

Pag. 100.

VIRGAE AUREAE 2. subiunge.

Planta tota pallide virescit: folia minus serrata sunt, & complanata: semiflosculorum lingua lineas tres cum dimidia longa est, unam circiter lata, non sulcata, neque in extremitate scissa.

VIRGAE AUREAE 3. subiunge.

Planta tota atroviret: folia leviter serrata sunt: semiflosculorum lingua lineas duas circiter longa est, unam lata, & sulcata.

VIRGAE AUREAE 4. subiunge.

An Virga Aurea Alpina Laurinis rigidioribus foliis Boer. Mus. part. 2. 31. Tab. 16. Inst. R. H. 484. Ex Mich. Rar Flores in panicula sparsa digesti sunt: semiflosculos coroneales septem gerunt, lingua duas lineas cum dimidia longa, unam lata, utrinque acuminata.

VIRGAE AUREAE 6. subiunge.

Foliorum superficies alveolis quibusdam minimis excavatur, intra quae sunt glandulae liquidum quoddam fundentes, quod avide surgunt minime quaedam Muscae nigrae alis longis praeditae, quarum copiosum enamen aestivo tempore plantam obsidet.

VIRGAE AUREAE 9. subiunge.

Planta haec exotica, climati nostro adeo affuevit, ut in diversis Etruriae partibus, praesertim secus Arnum Fluvium in maxima copia sponte germinet.

VITI subiunge.

Flores huius Plantae non in botros, sed in umbellas dispositi sunt. Calyces donantur exiguo, obscure quinquesido, intra quem sita sunt petala quinque e viridi lutescentia, seu herbacea, sesquilineam longa, semilineam lata, eleganter reflexa, in summitate retusa, & cucullata. Stamina quinque iis respondent, erecta, alba, linearia, capillaria, apices biventres substinentia, qui pulvisculum citrinum fundunt. Embryo pyramidalis est, seu conicus, & nonnihil sulcatus, abitque in baccam nigram, globosam retusam, Pisi magnitudine, parum succulentam, ingrati saporis, duobus seminibus crassis fetam.

2. Vitis Caroliniana. Elegantissimam hanc speciem Micheli ex ultimo sub itinere redux attulit, eoque nomine indigitavit: necdum autem comperitum habeo cui nam dono accepta referenda sit, & an descripta adhuc dum fuerit. Pumila est, semper virens, sarmentosque emittit graciles. Folia non simplicia sunt, sed e pluribus composita, aut lobata, Aquilegrae, vel Apii dulcis instar, lobis ferratis & laciniosis, triplicique serie digestis. Flores in umbellas latiusculas, ex pluribus minoribus compositas dispositi sunt, & antequam expandantur globosi apparent. Eorum calyx exiguus in quinque obtusos dentes dividitur. Petala quinque sunt stellatim posita, externe viridia, interne e viridi lutescentia, linearia, e lato principio in acutum desinentia, in margine contracta, seu cochlearis instar excavata. Petalis respondent totidem breviora stamina curva, rubra, apices substinentia bicapsulares luteos, & stipantia Embryonem qui figura Ficum imitatur, estque viridis, lineam longus, limbo seu nectario per medium excurrente, e quo mel mucosum extillat. Delapsis petalis tuba in vertice Embryonis sita nonnihil prolongatur, Embryoque sensim crassescens abit in baccam superiori speciei similem, sed pyriformem.

ULMARIAE subiunge.

Petala florum candida sunt, linearia, rotunda, pedunculo donata; apices autem citrini.

URTICAE 3. subiunge.

Caulis striatus est; folia autem alterna, repanda, cava, & admodum rugosa sunt, spinulis praedita articulatis, tenuibus, non urentibus, pellucidis, intortis, & e verrucis quibusdam pellucidis erumpentibus. Ex alis foliorum trium inferiorum prodeunt singuli, vel bini florum masculinorum, seu steriliu racemi, qui in umbellam quodammodo tortuosam & repandam sparguntur inter folia latentem. Flores in facie superiore racemi prodeunt, e sinu foliolorum duorum acutorum, pentapetali, petalis externe viridibus, & in cornu, Paronychia petalorum instar, desinentibus: referantur autem vi & ope staminum quinque elasticorum apicibus albis didymis praeditorum, quemadmodum in Parietariae, Chepopodii, &c. floribus contingere diximus, nectariumque in centro fovent subrotundum ac viscosum. In summitate ramorum, & e sinu superiorum foliorum prodeunt ramusculi florum seminiferorum, haud absimilis iis, qui flores steriles tantummodo gerunt. Eorum extremitates abeunt in foliola plerumque linguiformia, costata, & cordata, e quorum incisura pendet calyx constans foliolis duobus exiguis amplexantibus Embryonem compressum semicirculare, munitum rostro incurvo & praelongo, qui tuba capillaris alba & cirrosa, sive pennata fuerat.

URTICAE 10. subiunge.

Flores femininos, & masculinos in una eademque spica gerit. Masculini, vel steriles, e summitate spicarum seu racemorum prodeunt singulares vel bini, petiolo exiguo donati, calyce constantes pelvisiformi in quatuor lacinias cucullatas secto: stamina quatuor foveant elastica, ferme articulata, ac Parietariae staminum prorsus similia, in quorum centro sedet nectarium columnatum, & in summitate concavum. Inferiorem spicae partem occupant 20. vel 25. flores feminini, seu Embryones ovati, compressi, tuba cirrosa instructi, clausi folliculo quodam mitrato constante foliolis duobus in basi cordatis, & calyci monophyllo naviculari adhaerentibus.

11. *Urtica* foliis profunde laciniatis, semine Lini, Amman Rarior. 173. Tab. 25. Semina ipse Cl. Ammanus mecum perhumaniter communicavit Ann. 1738. nomine *Urticae Davuricae* foliis laciniatis trifidis. Flores masculini similes florum *Urticae superioris* sunt, herbacei, pallidi, in spicas dispositi, quae e duobus tantummodo nodis, seu verticillis foliorum prodeunt in ima caulis parte, utrinque binae: e superioribus enim 12. nodis prodeunt spicae seminiferae tantum.

XANTHIO 1. subiunge.

Est *Xanthium* Dod. Pempt. 439. *Lappa minor*, *Xanthium Dioscoridis* C. B. Pin. 194. *Xanthium sive Lappa minor* I. B. 3. 572. *Xanthium* Fuchs. Hist. 579. *Xanthio* ovvero *Lappa minore* Matth. 1263. ex Mich. Rar. *Universa Plantae superficies albicans, vel dilute virescens est; sequentis autem rubra.*


In *Xanthii* 5. nomine pro subrotundo validioribus, scribe subrotundo, crassiore, validioribus, &c.

YUCAE 2. subiunge.


Tab. VII. Exhibet *Plantae* huius folia, flores, & fructus. Spica florifera venustissima, quam An. 1740. examinavimus 307. floribus onusta erat, in ramulos 33. distributis.

F I N I S.





TAB. II.




11811

1







TAB. IV.





TAB.V.



TAB. VI.







87. Kil



3 2044 102 804 549

